





M



PARTVS MEDICVS

multo labore à LEONE in lucem editus

TRACTATVS ^{seu} NOVISSIMVS

^{de}
VARIOLIS
^{ET}
MORBILLIS

Ex Veterum & Recentiorum, quotquot in
Bibliothecis celebrioribus, variarum Provinciarum
extant Voluminibus, fideliter, enucleate ac compendiose ex-
cerptus, multisque partim alienis, partim propriis Rationibus, Experi-
mentis & Consiliis, Remediis item Domesticis & Pharma-
ceuticis condecoratus

Discipulis, Docentibus, Practicantibus,
proficius, familiaris, necessarius.

Cui accessit

APODIXIS MEDICA

De Gennaro de Giannali

MORBIS INFANTVM

Auctore

JOANNE FRANCISCO LÖW

ab Erlsfeld, Phil. J. V. & Medicinæ Doctore; Sac.

Cæsareæ Regiæque Majest. Consiliario in Alma & antiquissima

Vniuersitate Carolo Ferdinanda Pragensi, ejusdemque Medicinæ Pra-

xeos Professore Regio Publico & Ordinario, Facultatis Medicæ Seniore


Sac. Lateranenſis Palatij Aulæq; Cæsareæ Comite ac Medico, neo

non præfatæ Vniuersit. p. r. Rectore Magnifico.

NORIMBERGÆ,

Sumpt. JOHANNIS ZIEGERI & GEORGII LEHMANNI,

ANNO M. DC. XCLX.



12.8.1925

EXHIBITION

1925

1925

1925

1925

1925

1925



1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925



AD LECTOREM

Amice & Benevole Lector!

EN! Partum meum Medicum, hilari quidem animo conceptum, & feliciter in sinu Praeaeos gestatum; sed tandem multo labore in Cathedra Professoria editum. Nomen sortitus est de Variolis & Morbillis; ut tanto aptius verificetur illud:

Conveniunt rebus nomina saepe suis.

Hi enim affectus, cum tam ab origine (Veteribus ignoti crediti) quam ab effectu (cum Neo-natos plerumque impetant) cognitu curatuque difficiles & laboriosi sint; proinde nemo miretur, quod *Traëatum* hunc de Variolis & Morbillis, Partum multo labore editum, insignire voluerim. Re enim vera multum laborem mihi peperit, quodd, cum fundatissima olim antiquitatis, tum etiam incomparabilis ingeniorum hujus facula sagacitatis argumenta, asserere, adstruere atque conciliare, omni nisu allaboraverim: id quod eo confidentius praestiti, quod certius scio, me in omnibus illius fundamenta nunquam deseruisse, hujus autem eruditionem ambabus semper manibus amplexum fuisse. Ne tamen inde arguar, me praeter

morum honestatem, utriusque Sectæ sententias in ambo-
bus ferre humeris, & mox unius placita adstruere, mox
eadem non sine turpitudinis labe destruere, id quod in-
scitiæ & confusio potius portam aperit, quam pro-
ficua referat januam eruditionis, ided nullam un-
quam unius ab altera separationem agnosco, quin potius
tantam utriusque molior combinationem, ut Vetera No-
vis, & Nova Veteribus sibi simillima, imo eadem in-
ter se, pauca verborum discrepantiâ excepta, cuique ob-
vio videri queant. Ex qua unitate, eam Benevole &
Amice Lector! reapse capies utilitatem, quam Titulus
hujus Opusculi, pauca quidem verborum serie, sed co-
piosa rerum contentarum suppellectili promittit. Ubi, si
quædam minus ornate prolata, aut simpliciori stylo exa-
rata Tibi videbuntur, scias, me hac vice non Oratorem,
sed Medicum egisse, adedque ad res magis quàm ad ver-
ba, vel ad nucleum magis quàm corticem, hoc est, ad
utile magis quàm jucundum respexisse; spe, gratiorem
fore hunc Tractatum, si, quod spondeo, multijugem po-
tius Experientiam cum Ratione conjunctam sapiat,
quàm si inanibus saltè & sesquipedalibus
Verbis tureret. Vale.



Aggra-

Aggratulatio,

De nuper edito fecundo LEONIS partu.

Nobilis indicium sobolis si vita parentum est,
 Si decus in sobolem fama paterna refert;
 Ut sua caligine sat pandit gloria nata
 Palladis, in terras dum Jove parta venit.
 Alcidesque tuum cum ducis germen olympo,
 Magnus si quamvis hinc habere plagâ:
 Sique decus reliquæ primum hinc super æthere turmæ
 Vobis, quod genitas ætheris aula ferat:
 Nec minùs in terris (sic arbor germina prodit)
 Gloria si primò sæpe paterna sat est:
 Summa profectò novo hoc si non vestigia partu
 Edita Czechiadis dixero, iniquus ero.
 Magnanimos equidem, vili quis prole *Leones*
 Natos esse putet? non finit ista *Leo*.
 Fortior infirmos nescit genuisse lacertos,
 Magnos magna decent, parva dedisse latet.
 Absit ut exiguum celsæ generasse columbam
 Obijcias aquilæ! celsior alta parit.
 Altior exiguis ut se *Leo* viribus æquet,
 Absit! nil isthic debile posse potest.
 Id satis una meæ retegat virtutis egestas
 Id sat debilitas roboris ima probet.
 Cui *Leo* nî summâ columen virtute tulisses
 Prospera fortunæ merfa carina foret.
 Postquam, quidquid opis, tua quidquid dextra vigoris
 Attulit in cunctis non nisi summa fuit.
 Sed quid plura meo rudis ausim prodere verbo
 Maxima dum satius publica fama canit.
 Malo perinde meas tacitus forbere loquelas
 Nè dum plus cupio dicere, plus fileam.

Unum Musa tamen liceat retulisse perenti!

Unum quod cupiunt dicere vota fave!

VIVe præCor sanVs Leo partV hoC CresCe beatVs

HoC VoVeO Vitas MILLe renatVs agas.

Hinc mihi præ reliquis quâ leniar una voluptas;

Cùm, donec vivum novero, vivus ero.

De eodem Medico LEONIS partu

Lusio Epigrammatica.

Ela novâ felix Leo Czechice prole triumphâ!

Noscitur hic equidem partus: *ab ungue patet.*

Alia.

Nôsse cupis Medicum, quid sit? sociato *Leoni.*

Est *Leo*, qui vigil est, sit *Leo*, qui Medicus.

Alia.

Maturus quàm sit partus dum fortè requiris?

Respice, ubi (*) *Leo Rex*, sidera, scire potes.

Alia.

Fecundus quàm sit, dubius nè quærito; summum

Nonne (**) *Leo* gravidus frugibus esse solet.

Alia.

Unde, petis celebrem simul hic deduxerit ortum?

Aspice sidereo qui sit in orbe *Leo.*

Alia.

Nescio quid Medica velit hunc exesse cohorte

Cum rutilante, magis (***) *Phæbe*, *Leone* faves.

Alia.

Optima sed tali de prole quis omnia nescit?

Dum simul hunc terræ, dum simul astra fauent.

Dant terræ Medicum, vigilem dant astra *Leonem*.

Hinc oculo, ut medicâ sublevet inde manu.

Ode.

(*) *Leo* signum cæleste, frugibus maturitatem dante Mense Julio regnat.

(**) idem signum cæleste. (***) *Phæbus* seu *Sol* à Poëtis Medicinæ repertor creditur.

Ode.

Jo! secundis pergito cursibus!

Jo! serenis pectora plausibus!

Fœcunda tanto Czechia ortu

Amixta cedere neū moreris!

Hic est, renatam, partus hic ipſus est,

Orbi voventem maxima, qui novo

Splendore fœcundat Parentem.

Hoc opus, hic labor, & honoris.

Hæc fortis, hæc est pectoris indoles,

Hæc vera celsi (gignere quam solet,

Nam nescit imbellem) hæc *Leonis*

Undique magnanimi propago.

Cujus vigentem, nec minùs Herculis

Jam plus lacertis vividum, & inscium

Cædis valorem nosse si quis

Zoilus in dubio relictus

Quærit? vel ex hinc sat bene colligat,

Postquam sub ictu fatidicæ neque

Clothus ferè spe destituto

Inscius & rudis est mederi.

Hæc verò ut una Prole reſſloridus

Plurèis dierum, lætus agas, *Leo*

Sospes, recursus: id benigna

Temperies, Superùm favebit.

Pranobili, Generoso, Clariss. ac Excellentiss. Dn. Authori

In debitæ observantiæ argumentum

ita accinit.

Leonardus Ferdinandus Meißner,
Phil. & Med. Doctor, Collegiatus
Pragensis.

FILIALIS

FILIALIS a MORIS tessera, e LEGIâ In eDITAS paginas
parentis eXposita, & obseqVenter saVori atqVe
cVtVI paterno reposita.

Elegia

EXpers Principij durans sine temporis Orbe
Immenſum & ſimplex Ens ſine ſine DEVS
Pro bonitate ſua condit genus omne animantũ
Quæ ut proprius moveat ſpiritus, intus agit.
Sed mirum: in tantis ac tot animantibus *Vna*
Eſt genitrix, Mater terra, tamenque ſuos
Cuncta tenent mores, *diverſas* proprietates
Quadrupedum quodvis ſemper habere cupit
Hi æternis certant odiis, hi rurfus amore
Ardent, Rex Vincit, victus amat fugere.
Parcere ſubjectis & debellare ſuperbos
Magnificus Leo Rex ſic generoſe ſolet.
Eſt *Pater* ille bonus *parvis*, Vaſtiſſima vincit
Corpora, fronte minax igneus ore ferox;
Hic *Leo* qui *Magnis terror, fulmenque*, tenellis
Parvis ſublime & grande levamen erit
Quod primo *Infantum mala* pellat nemo ſtupeſcat
Eſt *Pater*, à *parvis* coepit amor *patrius*.
Reſpice benigno cVtV tibi Dandis aMores
QVæls pLVs VIX natVs ferre patri poterit.

*Ita accinit Devotiſſimus & Obſe-
quioſiſſimus Filius*

Joannes Joſephus Löw, Eques ab Erlſfeldt
Metaphyſices & Ethices Auditor.

ELEN-



ELENCHUS AUTHORUM,

qui in hoc Opere continentur.

A.

Agricola
Alexander
Ammannus.
Anthon
Auenzoar
Auicenna
Augenus

B.

Ballonius
Baricius
Bartholinus
Bauderonus
Bauhinus
Becherus
Bertinus
Binnigerus
Blokvvic
Bonettus
Borellus
Burnet.

C.

Caldera

Campeli
Cardanus
Caulis
Cekkins
Celfus
Claudius
Cluvius
Colerus
Corbelius
Crato
Cremsius.

D.

Diemerbroeck
Digbæus
Diomedes
Dolæus
Donatus.

E.

Ephemerides Annus I. 3.
8. 1672.
1. 1680.

Ettmüllerus

)()(

Faber.

F.

Faber
Fabricius
Faventinus
Fehr
Fernelius
Ferrerius
Fischerus
Florentinus
Fonseca
Fontanonus
Forestus
Fortis
Fracastorius
Franchimont
Froman
Fuchsius.

G.

Gabelhover
Galenus.
Garcialopius
Gesnerus
Giesvveinius
Gobelius
Grülingius
Guainerius.

H.

Helmontius
Heurnius
Hildanus
Hippocrates
Hirnheim
Hœfferus
Hoffmannus
Hollerius
Horstius.

I.

Ioëlis!
Ionstonius
Ioubertus
Iüncken,

K.

Kerkringius
Kircherus.

L.

Langius
Lemnius
Liddelius
Lipsius

Lomius

Elencbus Authorum.

Lomius
Lotichius
Lusitanus (Armat.)
Lusitanus (Zacut.)

M.

Macasius
Manardus
Maphæis
Marcellus
Mauriceau
Mercatus
Mercurialis
Michaelis
Minadus
Mynsicht
Mizaldus
Moebius
Mölenbrock
Moræus.

N.

Nevius.

O.

Occo.

P.

Pachequus

Paræus
Pascalis
Pauli
Pecctius
Pedemontanus
Piens
Plempius.

Q.

Quercetanus.

R.

Rhafis
Rhodius
Rhudius
Riverius
Rolfinckius
Rondeletius
Rubius.

S.

Sala
Salmuth
Satlerus
Schenklius
Schmidii Chirurgia.
Schmizius

Schnei-

Schneiderus

Schönfelder

Schröderus

Sebizius,

Sennertus

Septalius

Silvaticus

Sorbait,

Stoyhius

Strobelberger

Sydenham.

Sylvius.

T.

Thiermayer

Tilingius

Timæus

Trincavellius.

Valeriola

Valefcus de Taranta

Vega

Velfchius

Verzaſtra

Victorius

Vidius,

W.

Wallæus

Waltherus

Willis.

Z.

Zachias


Zacutus

Zechius

Zvvelfferus,



PRÆ.



PROŒMIUM.

De

Variolis & Morbillis.



Ebri pestilenti & malignæ adeò affines ^{Introdu-}
sunt Variolæ & Morbilli, inquit Rive- ^{ctio.}
rius, ut plerique Veteres putârint se
non ineptè fecisse, eas sub uno capite tra-
ctare: Neoterici autem, inter quos est
Willisius, Dolæus, alii quàm pluri-
mi, Veteres secuti, earum tractationem
mox post malignarum & pestilentium
februm deductionem, proponunt; hinc

factum est, quòd Rhases, qui inter Arabes de his omnium
optimè scripsit, eas Pestem vocaverit, quòd sit morbus epi-
demiùs contagiosus, & valde periculosus, etenim Pestem sæ-
pè præcedunt, vel eandem sequuntur. Verùm relicto Rhasis
nomine Arabico, ejusdemque mihi ignota significatione, si
Græcorum Latinorumque normam sequamur, deprehendo
illos quoque Variolarum & Morbillorum tractationem, titulo
de Peste inscripsisse: ast malè meo judicio; sunt quidem, fa-
teor, morbus subindè malignus & contagiosus, sed propriè
tamen Pestis non sunt, sæpe enim sporadicæ sunt, & com-
muniter

Cujus mor-
bis morbus
sunt Vari-
olæ & Mor-
billi.

A

muniter

munitur quocunque anni tempore quidam Pueri iis afficiuntur, & liberantur, hoc est, majori ex parte salubres sunt, quod Pesti non convenit, ea enim maxima ex parte deleteria est.

Quæ Variolæ dicuntur salubres,

Quare Græci eas appellaverint Pestem,

Dixi *salubres*, id est, Variolæ ut sic, non autem illæ malignæ & pestilenciales, quæ unâ cum Peste ingruunt, & revera vel Pesti sunt, vel ejus materiam & ferociam induunt, simpliciter tamen pestilentes non sunt. Quod autem Rhases eas Pestem vocâverit, & Græci & Latini eum secuti, sub titulo Pestis eas comprehenderint, eorum solitæ brevitati est adscribendum, aut certè dicendum, ideò factum esse, quod Variolæ & Morbilli, à vicio aëris tanquam causâ communi & Pesti æquè analogâ inceperint, quæ postmodum ex quodam veluti naturæ præscripto morbus quasi hæreditarius factæ, maximam hominum (non tamen brutorum) partem afficiunt, & nullos aut pauciores esse (hoc est inter mille millia vix unum, nisi præcox mors illum tollat) qui hisce, sive in utero (ut multorum restantur Authorum exempla, præ cæteris Foresti *Lib. 5. Obs. 44. pag. 196.* Bartholini *Obs. Centur. 4. hist. 50.* Moellenbrocii in *Ephemeridibus German. Anno 1670. Observat. 53. fol. 150.* Schenkii *Lib. 6. Observationum, tit. de Variolis & Morbillis.* Fabricii Hildani *Centuria 4. Observat. 55.* Rhodii *Observat. 83.* Nicolai Florentini *Tractat. 2. summa 4. Distinct. 6. Cap. 13.* Augenii *Lib. 9. de febrib. Cap. 7.*) hinc dicit Doctor sapius quàm nascimur morimur, id est in ipso utero, sive extra uterum existentes, non afficiantur, adeò ut Avenzoar scripserit, miraculi instar esse, si mortalium quis labe hac non corripiatur, hoc si quis neget, poenâ sensus dignus esto: quin imò qui ab hisce liberi existere, eos leproso facillimè evadere, compertum est, ideò autem plerique iis afficiuntur, quia, uti diximus, morbi hæreditarii sunt, id est, quia illorum parentes laboraverunt; cujus tamen contrarium

Quare maxima hominum

rium tenet Franciscus De Le Boë Sylvius, *Prax. Med. appendice, tract. 1. §. 2. fol. 67.* ubi inquit. *creduntur Variolæ & Morbilli esse inevitabile hominibus malum, quamvis plures noverim ad ætatem senilem deductos & sic mortuos, qui nunquam Variolis laborarunt.* Cujus viri autoritates legendæ quidem, sed in præjudicium tot & tantorum Virorum contrarium sententium, non admittendæ.

pare iis
afficitur:
datur ratio

Ubi tamen notandum, quod *Ly hæreditarium* non sumatur formaliter, & propriè seu strictè, sed consecutivè non propriè seu latè tantum. Ratio prioris est: quia *Ly hæreditarium* formaliter & propriè dicit, quod perpetuò & sæpius affligit; Unde Podagra, Calculus & similes affectus sunt formaliter & propriè morbi hæreditarii, quia perpetuò & sæpius affligunt: Ratio posterioris verò: quia licet ab initio talis proprietas nobis naturalis & hæreditaria non fuisse videatur, attamen post primam tum naturæ tum cœli influentiam, quia omnes tentati sunt, facta est connaturalis & hæreditaria proprietas, quæ in omnes derivatur, exemplo Hippocratis *Lib. de Aëre, Aquis & Locis*; sicut Indiæ Macrocephali primò tales artificiosis compressionibus & ligaturis facti sunt, & tandem proles Macrocephalas generarunt. Ita generant in hunc usque diem, factâ nempe proprietate communicativa: Sic propemodum contingit in Variolis & Morbillis: sunt ergo morbi hæreditarii non *primario* sed *secundario*, non *propriè* sed *impropriè*, non *strictè* sed *laxè*, non *formaliter* sed *consecutivè* & materialiter sumptæ, nam si propriè essent morbi hæreditarii, cur semel tantum, aut bis iis homines corripiuntur & non sæpius? Deinde cur qui Peste semel laborant, eandem ad Pestem aptitudinem soboli non communicant? atqui hoc non fit, & quidem meritò; nam natura vincens venenum pestilens, illud de corpore planè exterminat, idque eodem modo in Variolis & Morbillis facit, & nisi hoc fieret, nemo à Var-

Quomodo
ly hæredi-
tarium de
Variolis
sumatur,

Requisita
ad hoc ut
morbi fiant
hæredita-
rii.

lis & Morbillis perfectè sanaretur ; Ergo sicut Pestis & similes morbi propriè hæreditarii dici non possunt ; ità nec Variolæ aut Morbilli. Ratio ulterior dari potest , nam non omnes morbi quibus parentes laborant , necessariò in corpore relinquunt dispositiones , per quas iidem in sobolem deriventur. Ratio rationis : hæreditarii enim morbi , non nisi per semina liberis communicantur , quia hæc semina similiarum partium ideam , formam & proprietatem continent ; sic arthritici & calculosi , semen articularum parentis arthriticum , renum calculosam dispositionem habent , debet ergo in solidis partibus inesse diathesis illa ; at iis qui Variolis laborârunt & perfectè defuncti sunt iis , nulla remanet labe , nulla superest dispositio talis , tota enim per criticam evacuationem & exanthematum excretionem depurata est , alioqui periculum esset recidivæ ; quomodo igitur eam quam in solidis & carnosissimis partibus non habent diathesin , liberis communicabunt ? neque enim omnes morbi hæreditarii sunt qui fiunt , sed hi tantum qui facti sunt , sic febres putridæ & fientes morbi proli non communicantur. Quapropter ut morbi dicantur hæreditarii , necesse est , ut dependeant à primis generationis principiis , tum formalibus , qualia sunt semen utriusque sexûs , tum etiam materialibus , qualia sunt sanguis maternus seu menstruus , semen autem ut dicemus infra , ad Variolas seu Morbillos non facit , ergo morbi hæreditarii propriè non sunt. Sed dices quosdam fuisse , patres & matres qui Variolis & Morbillis correpti nunquam fuêre , quorum proles etiam immunes manserunt beneficio hæreditario , è contra ii parentes , qui iisdem correpti in proles eodem jure deduxerunt , ergo sunt hæreditarii.

Responsio.

Alia ratio
est iis ple-

Respondeo hoc argumentum esse particulare , & nihil probare , ut infra patebit . His omisissis , alia magis succincta , cur plerique iis afficiuntur , dari potest ratio , quod sint affectus

affectus mixti, partim juxta, partim contra naturam constituentes; nam quoad originem, seminarium nobis habent connatum, quoad effectus verò, symptomata præternaturalia & (sicut ipsa quasi Pestis) venenata quidem producant, ex quo fit, ut peculiare aliquod genus febrium constituunt, hominibus tantum proprium, convenit enim homini omni & soli & plerumque semel. Nec obstat, quòd si fortè quispiam immunis in vita ab iis fuerit, aut quispiam in hos affectus sæpius inciderit; sunt hæc rara dubia, & inusitata naturæ eventa, quæ communi observationi & veritati minimè derogant, de quibus apertius in sequentibus.

rique affi-
ciuntur.

CAPUT I.

De Etymologia Variolarum
& Morbillorum.

Vocantur autem à Græcis *Exanthemata*, quo nomine tam generalissimo in universum omnes eruptiones, seu cutis efflorescentiæ, quibus corpus nostrum afficitur & natura ad cutim deponit, intelliguntur. Latini eas *Maculas* appellant, sed nimis latâ æquæ significatione, nam ly *macula*, vitiligini tribuit Philosophus 3. de *hystor. animalium* 2. unde Variolæ & Morbilli etiam sub his comprehendi possunt, quod nimirum turgentium instar in plantis gemmarum tumeant. Plinius vocavit *Papulas*: Plinium secuti plures alii, tam Veteres quàm Recentiores, nomina Variolarum & Morbillorum confundunt inter se, & unum quandoque pro altero accipiunt, ut videre est apud Sennertum *Lib. 4. Cap. 10.* & Forestum *Lib. 6. de febr. obs. 51.* Paræum *Lib. 19. Cap. 1. fol. 550.*

Etymologia à Græcis.

à Latinis latè.

A 3

Echtyma-

Echymata Variolas seu pustulas, Exanthemata verò Maculas
seu Morbillos vocant. Alii Variolas à variando dicunt, eò
quod cutim variant: Arabes verò propriorum vocabulorum
amatores, Variolas appellarunt à varorum similitudine, quòd
instar vari in corpore emineant: sunt autem vari tumores
exigui infacie psitracis affines, ex crasso ferventique succo
collecti, ad quorum similitudinem Variolæ dictæ sunt, tan-
quam parvi vari. Riolanus utpote Vir arte & scientia pro-
vectissimus, Variolas dicit pustulas esse eminentes, humore
plenas, & plerumque suppurantes, Germanis die Urschlechten/
die Pocken/oder die Blattern. Gallis, La petite Verole, dictæ.
Morbillos verò vocat Rosalia, Rubecolas; quia cutim rubore
tantum perfundunt, nec elevantur aut suppurantur, Germanis
die Massern oder Flecken. Gallis, Rougeole. Clariorem &
ad rem aptam horum nominum Etymologiam & differentiam
discernit Ludovicus Mercatus de Puerorum morbis Lib. 2. cap.
22. Rationem nominis (inquit) desumptam esse à variis &
morbo, quippe Vari sunt excrescentiæ pustulosæ, quæ in facie
plerumque apparent (vulgò die Finnen oder Ungarn) cum
evidenti cutis asperitate. Morbillus verò sic vocatur ex ma-
ligniore conditione, cum certum sit, Pestem antiquitus mor-
bum fuisse nuncupatum, & ea ratione Morbillus quasi levis
Pestis dicitur: Est tamen uterque affectus Variolæ & Morbilli
de genere pustuloso, quippe in Variolis pustulæ sunt humectio-
res majores & suppurabiles; in Morbillis verò minores, reso-
lubiles aut evanescentes: Fracastorius Morbillos vocat à fer-
vore: verùm quidquid sit, si de rebus constat, facilè de ver-
bis conveniri potest, ut fusiùs patebit, ubi infra de differentiis
acturi sumus.

Unde Mor-
billi.

CAPUT



CAPUT II.

De Definitione Variolarum
& Morbillorum.

Variolæ sunt exanthemata, seu pustulæ saniosæ, in summa Definitio Variolarum.
totius corporis cute, partibusque cuti proportionē corre-
spondentibus, cum febre continua, propter sanguinis pecu-
liarem effervescentiam & ebullitionem, varia quoque secum ve-
hentes symptomatum genera.

Dixi Primò *Exanthemata*; quod genus generalissi- Explicatio ejusdem.
mum denotat, sub hoc enim etiam echymata continen- Quare dicantur Exanthemata
tur; nam ly exanthemata, non est certi morbi nomen
ut phlegmone, sed *ἐξάνθη* dicuntur generali significa-
tu humores quilibet, qui ex alto corporis in cutem pul-
lulant, pustulasque excitant, aut asperitates quasdam, &
ideò Variolis & Morbillis hoc nomen potest adaptari teste
Hipp. & Gal. 6. *Epid. Sect. 2. 2. Epid. Sect. 3. Gal. 5. Meth. Med.*
Cap. 12.

Dixi Secundò. *Pustulæ saniosæ*. Quod significat Quare pus-
tulæ saniosæ
v.
genus differentiale, siquidem in genere sub natura tu-
morum præter naturam continetur: Sunt enim eminentiæ
adestque magnitudo aucta: prominent autem (in genere lo-
quendo) in cutē tumores, tubercula & pustulæ, tumor tuber-
culo major est, utroque minor pustulæ, unde elucescit genus
differentiale, quod Variolæ non ad tumores & tubercula,
sed ad pustulas & exanthemata referantur, quia tumorum,
minimi sunt, nequaquam magni, ut Phlegmone & Furuncu-
lus, atque ideo Hipp. 3. *Aphor.* inter pueriles morbos numerat
ex-

exanthemata. Nec obstat quod Mercurialis probare conatur Variolas nostras non esse Veterum exanthemata; quod superfluum assertum videtur ex eo, cum hoc nomen adeò sit generale, ut certam non indicet morbi speciem, sed omnibus incutem eruptionibus, etiam ipsis maculis attribui possit.

- Obiectio.** Dices. Variolas & Morbillos Hippocrati & Galeno cœterisque veteribus non fuisse cognitæ; ergo alia videntur esse exanthemata, quam Veteribus fuerint cognita; nam ut inquit Manardus Ferrariensis *Lib. Epist. 7. Epistola 1. Variolas & Morbillos sub Exanthematum nomine Galeno, & sub Herpetis titulo Hippocrati forsan notas fuisse, vel planè ignotas.*
- Responsio I.** Respondeo. Manardum abundè in hac re refutat Franciscus Valeriola *Enarrat. medicinal. Lib. 1. Enarratione 8.* Respondeo Secundò. Hoc assertum non esse vetus sed immaturum, seu immaturâ fundatum ratione censemus ex eo, cum non fundatam rationem notabili experientiæ præponat, nam ipse Hippocrates *Lib. Epid.* pustularum rubrarum rotundarum parvarum &c. sæpius meminit, & Aëtius *Lib. 14.* infantibus papulas per universum corpus erumpere scribit, non ergò Græcis omnino incognitum hunc affectum esse puto. Et quis quæso dicet eos novos, Veteribusque incognitos affectus, qui ab antiquissima causa ipsis quasi Prothoparentibus nostris Adami & Evæ principiorum impuritatibus oriuntur? Accedit quòd, cum Arabibus fuerint noti, & dudum ante ipsos grassati, eos minimè novos morbos censuerunt; Quia si primùm Arabum tempore grassari cepissent, illud speciatim ab illis fuisset annotatum: Et quamvis ab iis primùm exacta eorum descriptio tradita sit, Hippocrates verò, Galenus cæterique Antiquiores vix de illis mentionem fecerint, arbitrari oportet, ideò peculiarem illorum tractationem ab hisce Veteribus non fuisse iustitutam, quòd sine tantum accidentia febribus synochis & malignis supervenientia,

tiâ, & eruptiones critica, proprium & peculiare morbi genus minimè constituentes. Vel dic: quòd in Græcia propter aë-
 ris clementiam, & exquisitam ac strictam victûs rationem ita Responsio
V.
 levis fuerit affectus, ut Medicorum curam non meruerit, prout plurimùm hodierno sæculo fit, ubi anus edentulæ, relicto Medicorum prudentùm ministerio, curationis scopum absolvunt.

Queinadmodum etiam apud Indos occidentales propter summam aëris clementiam, ita levis esse consueverat, ut vix animadversus fuerit ante accessum Hispanorum in has regiones: Postquam verò Æthiops quidam eò delatus, Variolis pestilentibus correptus est, communicatâ per contagium malignâ & venenatâ qualitate, tam immaniter grassari caput affectus, ut magnâ Indorum pars de medio sublata fuerit; cum enim antea impuritates illæ ex sanguine relictæ, ob clementiam aëris faciliè à natura discuti consuevissent, accedente postmodum venenatâ qualitate, graves morbos effecerunt. Nihilominus tamen Veteres quæ necessaria sunt ad earum curationem & cognitionem reliquerunt, scilicet, in febribus malignis eas apparere, esse quoque si recesserint, aut paucæ fuerint, periculosas, non esse repellendas, sed potiùs incutem attrahendas, demum quibus remediis sint exsiccandæ.

Neque tandem obstat si quis dicat, quædam esse in quibus exanthemata Hippocratis, Galeni & Aëtii cum nostris Variolis & Morbillis conyenire non videntur: huic respondendum est, nec nostras Variolas & Morbillos semper ejusdem generis apparere, imò ejusdem generis morbos, aliis atque aliis sæculis ex diversitate Regionum & victûs, ex peculiari vi syderum, ex vario hominum vitæ genere, ex causis aliis tùm internis, tùm externis, quasdam mutationes & differentias accipere posse: Interim tamen, ut mox allegavi, multa quæ tùm ad naturam horum, tùm ad curationem spectant, communia habent.

B

Dixi

Ultior
definitio-
nis expli-
catio.

Quare Va-
riolarum
potissima
pars erumpit
in facie,
& non
item Pete-
chiarum,
declaratur.

Dixi 3tio. *In summa totius corporis cute partibusque cuti proportionem correspondentibus.* Ex quibus verbis vera imprimis differentia ab iis exanthematibus elucescit, quæ unam tantum partem afficere solent, ut Pitythracia, Vari, Exanthemata à Paulo inter externos capitis affectus *Lib. 3.* descripta: Variolæ autem totum corpus inficiunt. Quod si tamen unam partem seorsim laborare contingat, id casu potius fit, quam morbi naturâ, ubi notandum, hæc verba definitionis quoad sensum expressa esse, negandum enim non est, & experienciâ anatomicâ constat, quod Variolæ & Morbilli non tantum in externis corporis partibus, cute scilicet, sed etiam in internis (cuti tamen proportionem, seu connexionem nervorum, muscutorum, venarum, arteriarum correspondentibus) ut pulmonibus, faucibus, intestinis, ventriculo &c. generantur: Potissimum verò erumpunt in facie, quod è contra contingere solet in Maculis purpureis seu Petechiis, quæ faciem raro & parum occupant, quamvis tamen certum sit in utrisque humores sursum ferri, ut deliria, cerebrique symptomata palam ostendunt: sed quoniam cutis in facie tenuior est & rarior, nisi copiosa fiat humorum expurgatio, in cute non firmantur, sed exhalant, & per insensibilem transpirationem dissolvuntur; vel quòd in Petechiis humor crassior non soleat sursum ferri, eò quod vasis majoribus plerumque contineatur, in Variolis verò sit in ipsa partium substantia, sive quòd facies aëri continuo exposita inutilem illam & exiguum purpurarum evacuationem non admittat; In Variolis autem maximus impetus naturæ, humorisque pravi abundantia ita urgeant, ut non obstante aëris frigiditate, in cute facie pullulent, nisi summo & extraordinario aëris rigore repellantur: Aristoteles scribit Varos potissimum fieri in facie, quia locus humidus est & rarus, materiam propterea crassiorem facilius excipit, quod humoribus istis etiam convenire potest.

Præte-

Præterea patet ex iisdem supradictis definitionis verbis *Subjectum Variolarum & Morbillorum* subiectum esse cutim, ac imprimis externam ejus superficiem, quæ *epidermis* dicitur cum subiectis partibus. Dico *cum subiectis partibus*, siquidem cutis sola, utpote, teste Galeno solum usum habens, & nullam actionem (si strictè loquendum est) morbi alicujus subiectum esse nequaquam videtur, verum quia nos in genere loquendo (ut in Anatomia nostra fusiùs actum) ipsum usum ab actione non distinguimus, quia invicem faciliè convertuntur; nam partis actio, quia ad quemcunque finem spectat, sæpe usus atque etiam usus, quia actionem non excludit, actio dicitur: strictius tamen si rem capiamus, usum latius patere, quam actionem, fateri oportet.

Exinde autem non sequitur, si cutis propriè actionem non habeat, sed tantum usum, quod morbi subiectum esse nequeat, nam secundum me actio privata, de qua *textus Gal.* (quamvis de publicâ id non asseram) ab usu nullo modo distinguitur; actionem autem privatam, quæ sibi soli consulit, habere cutim quis dubitat? habet enim alimenti attractionem, retentionem &c. quin & publicam quæ consulit toti animali habere dici potest, videlicet dignotionem qualitatum tactilium: Verum ut hanc cramben verbò auferam, studiò addidi: *cum subiectis partibus*, quatenus scilicet cum Nervis & Musculis, Venis & Arteriis, conjungitur, quâ ratione sinè dubio morbi & consequenter Variolarum subiectum dici potest: Dic quod vis, utrumque enim faciliè sustinetur; nam cutis per se sola, vel cum subiectis partibus juncta, subiectum Variolarum existere potest, & testantur id historiz, quod quibusdam post mortem dissecatis, deprehensum sit eorum viscera non secus atque cutem, sordidis ejusmodi pustulis, affecta fuisse, ut testatur Fernelius 2. *de abditis rerum causis* Cap. 12.

Dixi 4to. *Cum febre continua.* Ubi notandum primò, Quare dicitur in Definitione

ne cum fe-
bre conti-
nuu.

Morbilli sine febre esse possint? Ratio dubitandi hæc est: Cum enim vitium hoc in sanguine undecunque etiam contractum sit, natura per quandam criticam evacuationem & ebullitionem, ut vulgò vocant, soleat discutere; quæri omnino cum ratione potest, an semper hoc fiat cum febre, an verò aliquando etiam sine febre?

Variolæ an
possint esse
sine febre,
ratione
allegantur.

Qui affirmant eas sine febre esse posse, id ita fieri posse commenti sunt, & quidem juxta mentem Antiquorum, quia potest sanguis efferlescere in partibus cuti proximis, tumque ejus calor cornon afficiet, nec fiet febris, vel saltem primò subsequetur, quando scilicet in pus transmutantur; Ratio, nam dum pus fit, febres fiunt, quem casum, etiam rarum, possibilem tamen contendunt, idque docere videtur *Theophrastus Lib. de sudoribus*, qui vult, in corporibus nostris ex sudoribus & laboribus eruptiones quasdam, seu exanthemata fieri Varis similia, quarum tres causas affert, anni tempestates, excrementorum abundantiam, corporis motum & agitationem. *Celsus quoque Lib. 5. Cap. 28.* de pustulis & exanthematibus agens, ait, eas similes esse Varis & fieri ab igne, vel à frigore, vel medicamentis. *Rhases* etiam Variolas post febres erumpentes, statuit salubriores esse iis, quæ febrem præcedunt, ex quibus liquet Variolas sine febre dari posse.

Variolæ
proprie
distæ non
possunt ef-
fe absque
febre.

Negativam qui tuentur, cui & nos subscribimus, firmiori pede incedunt, & tam ratione, quam autopsiâ priorum confundunt argumenta, propriamque sententiam sequentibus evidenter fulciunt argumentis fundamentalibus. *Primò* quidem non negamus posse pustulas seu exanthemata quædam oriri sine febre, quæ tamen non sunt Variolæ nostræ de quibus agimus: Variolas enim necessario febris præcedit vel saltem comitatur, estque continua, ut plurimum autem præcedit, & ideo illa febris (non ut quidam recentiores opinantur symptomatica est, sed semper essentialis, & sui generis: ut mox infra) utpote quæ (dummodo omnia recte suc-

cedant)

cedant) apparentibus Variolis & Morbillis paulatim evanescere incipit, quia fieri solet crisis ratione, naturâ per habitum corporis febrem solvente, id est, quia Variolæ nihil aliud sunt, quam criticæ evacuationes febrem solventes. Crisin verò & ebullitionem sine febre fieri non posse, omnes tenent, imo non tantum adest febris, sed etiam dolor & pruritus maximus, ægris interdum intolerabilis, interdum tamen mitior est, cum humor minùs est acris & effervescebat, ut in pustulis latis, quas vulgò Grandines, Cryсталlos, *Vidus Vidius & Petreus* appellat, de quibus mox infra fufius.

Dixi mox suprà: dummodò omnia rectè succedant, febres enim illæ, quæ, postquam apparuerunt Variola, delitescente priori febre, gignuntur, sine dubio omnes sunt symptomaticæ. quandocunque (ut loquitur Horatius Augenius *Lib. 9. de febribus Cap. 19.*) generentur, præcedente alio morbo, ad ejus incrementum augeantur.

Notandum 2do. quòd illa effervescencia seu febris, quæ Variolas excitat, non fiat juxta cutim, sed in ipsis etiam variolis interioribus, à quibus in superficiem humor transmittitur; fateor autem non posse ita facillè humores effervesce prope cutim, idque ex eo, quòd pars ea corporis ab aëre attracto & adumbrante refrigeretur, non nego tamen id impossibile, quin imò frequenter posse contingere, quòd humores in minoribus etiam vasis juxta cutim, id est capillaribus, putrescere possint, & ut *Galenus* docet, in intermittentibus in ipso habitu corporis putrescant & corrumpantur, & consequenter etiam, qui in minoribus istis vasis, vel juxta habitum ex facta putredine ebulliunt, febrem generare, sic quando febris ardens solvitur, extrahitur humor in habitum corporis, sive vasa minora, & tamen adhuc febris est, nec transpiratio cutis id prohibet, ut experientia ostendit, idèò statuendum febrem præcedere Variolas, & simul eas interdum febres fa-

Confirmatur in Variolis febrem debere adesse.

cere : quod autem fiant à febre semper patet, quia ut diximus eam critico impetu solvunt, & tunc ea cessat.

Quando
possit dici
febris po-
sterior Va.
riolis, &
qualis tunc
sit.

Variolæ
quæ sequ-
untur fe-
brim salu-
briores
sunt iis,
quæ eam
antece-
dunt, ratio
hujus,

Observatio

Quod si autem contingat Variolas esse copiosas, magnas, sanguine ichoroso plenas, tunc fateor equidem febres fieri à Variolis possunt, quæ tamen febres non ejusdem sunt cum prioribus generis, sed symptomaticæ, diariæ seu Ephemeræ dictæ, quales etiam observamus in bubonibus, phymate, furunculis, & cutaneis aliis affectibus, de quibus alibi. Propterea sobriè est intelligendum dictum Rhafis, quod est verissimum qui statuit Variolas salubriores esse quæ febrem sequuntur, quam quæ eam præcedunt aut comitantur. *Ratio* : nam cum iis apparentibus minui febris debeat, si ea perseveret aut augeatur, aut quæ cessaverat iterum redeat, augmentum putredinis significat, quod non potest non esse perniciosum; ita quoque si Variolæ appareant comitante solummodo levi febre, ex pulsu & urina, aut etiam calore externo vix notabili, dum vel materia expellenda pauca & benigna, & natura robore poller, vel revera suspecta & pessimi ominis res est, præcipuè si magnus dorsi dolor & magna virium oppressio advertatur; Sic præter omnium spem paucos ante annos extinctus est Illustrissimus Dominus Junior Comes Slavata, ultimus è stemmate; qui inexplicabili ac repentino dorsi dolore cum virium jactura in instanti correptus, nullâ nec in pulsu, nec in urina alteratione apparente, quarta die petechiis mixtis Variolis, obiit: in quo Juniore omnes credebant spinam dorsi luxatam fuisse, quod tamen falsum effectus docuit.

Similem lamentabilem casum pro directione Practicorum refert etiam doctissimus Franciscus Ignatius Thiermair in *Consil. Lib. 1. Cap. 7. fol. 89.* de quadam Serenissima Principe. Nec ex prædictis Authoribus quidquam probari potest, quam pustulas quasdam interdum sine febre fieri, eas tamen esse nostras Variolas, nemo dixerit, quamvis si Variolis nostris ea applice-

applicemus, causæ illæ de quibus illi (præsertim *Theophrastus* ac *Celsus*) loquuntur, non nisi commotis prius internis, & forsitan prius excitatâ febre pustulas progignunt.

Unde si quis, sanô tamen sensû, duplex febrium genus in Variolis statuere velit, non inficio quidem, unum quod propriè ex illa ebullitione excitatur, de qua in præsentî quæstio, vel cujus symptoma & crisis, est Variolarum & Morbillorum efflorescentia, bonum est si Variolis & Morbillis erumpentibus febris hæc cesset: nonnunquam verò post Variolas febris apparet, & quando illæ suppurantur, excitatur: Vel quia materia tota primo impetu non fuit expulsa, vel quia pars ejus intrò suscepta, quod peius est indicium. Experientia quam adferunt adversarii, pueros & infantes Variolantes & Morbillantes de febre non conqueri. *Resp.* Eam experientiam infantilem, vel ut candidè loquar, falsam esse, quamvis etiam pueris & infantibus febris adeò magna non sit, ob materiæ paucitatem & levitatem, ebullitionem magnam non producentem, ex quo fit, ut nec de morbo aliquo conquerantur, nec etiam conqueri pusilli possunt, donec Variolis & Morbillis erumpentibus ægrotare cognoscantur, iis tamen credere, aut asserere, absque febre erumpere posse, falsum est, & nullâ ratione fundatum.

*Responsio ad obje-
ctionem negantium
febrem in
Variolis.*

Notandum 3tio. Quòd licet nunc ex dictis certum sit, Variolas Febrem præcedere, attamen sciendum, illam Febrem non omnibus æqualem, eandemque esse, quia sanguinis reliquorumque humorum, non solet esse idem incendium, aut eadem putredo, sed modò major, modò minor, unde nova oritur quæstio: An illa febris sit Putrida, an Synochus, an verò alia?

*Febris non
in omnibus
Variolan-
tibus ea-
dem est,
neque æ-
qualiter
intensa.
Ratio ha-
jus.*

Febrem Synochum simplicem esse plerique asserunt, quia à principio ad finem usque cor assidue fatigat, donec impurus sanguis multorum excrementorum permixtione inquinatus, à natura depuretur, & expulsis, à majoribus sive internis
vafis

vasis in minora, & ab his ad habitum corpóris, humoribus, Variolas proferat. Putridam hanc febrim esse, ab omnibus promodum hujus sæculi Medicis statuitur, & quidem veriùs, ut patebit in dicendis.

Sciendum tamen est putredinis varios esse gradus, quibusdam enim levior est, quibusdam gravior, hinc febris oritur mitis, quam ægrotantes ferè negligunt, nec nisi ab iis qui diligenter attendunt cognoscitur; quædam major & gravior, symptomatibus stipata pravis, ex vehementi humorum putredine, tuncque Variolæ sunt mali moris, & ulcera gravia in partibus affectis tùm externis tùm internis relinquunt: Et hæc est, tam Veterum quàm Recentiorum de Variolarum febre, opinio, quæ tamen dubia videtur, utrùm scilicet febris Variolas præcedens, Synochus semper sit? tum quoque, an semper sit Putrida? nam primò non necessariò videtur esse Synochus.

Non semper esse
synochum,
probat
Primo.

Probatur *Imo*. Mirantur enim Arabes, si quis semel in vita iis non laboraverit, certum autem est Synochum non fieri, nec in gracilibus biliosis, puitosis, melancholicis, nec in frigida ætate seu senectute, nec in plenitudine ad vires, sed in plenitudine sive plethora sola, quæ ad vasa dicitur, generari. Non est autem verisimile, omnes quos Variolæ occupant, plethoricos esse, cum vix quispiam hunc morbum effugere possit, & in omni ætate contingere queat, in ipsa quoque senectute, quin imò ante ipsam vitæ exortum, in nondum natis, sed claustro uteri adhuc detentis, ut multa referunt Authorum exempla. Neque hujus opinionis ullam videmus repugnantiam, causæ enim quæ in genitis Variolas producant, eadem ipsæ in nondum genitis, mediare saltem, easdem causare possunt; & satis est pro hoc tam meam propriam, quàm etiam aliorum authenticorum Authorum, ut supra diximus, experientiam stare.

Secundo,

Probatur *2do*. Si febris Synochus est, quæro? cur in omni-

omnibus, eâ febre laborantibus non contingit excretionem fieri? quandoquidem enim sanguis in omnibus putrescit; si ergo eundem hominem bis terve aut sapius Synocho laborare contigerit, cur semel tantum patitur Variolas? & reliquis temporibus solis tantum forsan sudoribus absque pustulis liberabitur, si idem humor, quantitate, qualitate & consistentiâ peccat, excretioque fiat per eadem loca, cum tamen eadem non est. Essè quoque febrem putridam non est adeo certum, quia explorato sanguine illorum, qui hac febre laborantes, ante eruptionem Variolarum, scilicet ante sanguinis depurationem, venæ sectione vacuati sunt, purum rubentem, citò conrescentem, tanquam à victima, conspeximus: quæ sunt sanguinis laudabilis indicia. Accedit, quòd quidem ebullitio sanguinem puriorem reddat, unde colligi potest, ipsius sanguinis substantiam non putrescere, sed tantum n. mens-
strui sanguinis & excrementorum iniquatione accendi, ex qua ebullitione purior & perfectior redditur, cujus quoque evidens argumentum est, quòd evacuatâ per Morbillos & Variolas parte eâ, quæ sanguinem in fervorem agebat, cessât febris, & sanguis ad pristinam redit bonitatem. Hic autem intelligimus universam sanguinis massam, & si totus sanguis non putrescat, effervesceat tamen secundum setotus, aliud autem est accendi, aliud putrescere, accenditur in Synocho simplici, seu non putrida, putrescit autem & simul accenditur in Synocho putrida. Sanguis ergo modò biliosus, modò pituitosus, modò melancholicus, modò ichorosus est. Ut verò de hac febre tandem statuam quod veriùs videtur

Non semper esse putridam etiam probatur.

Confirmatur.

Dico *Primo*. Non semper esse Synochum, ut varii pustularum colores indicant.

Decisio I. quod nimirum non semper sit Synochus. Decisio II. Essè malignam aliquando.

Dico *2do*. Non semper putridam, sed malignam, siquidem contagiosa ut plurimum est, exitialis, & crises facit quæ aliis febribus non competunt, ex quibus patet, aliquid hic esse peculiare, quod aliis febribus non inest; nam si putrida foret

C

febris,

febris, expulsis in habitum corporis noxiis humoribus, rigor ut in ardente & synocho contingeret, quod tamen fieri ordinariè non observamus, cujus ratio infra declarabitur.

Decisio. III
Esse Fe-
brem sui
generis.

Dico 3tio. Febrem Variolarum & Morbillorum esse febrem sui generis, sicut enim caro cordis, non est caro glandulosa, musculosa, aut parenchymatica, sed sui generis, sicut dentes non sunt ossa reliquis ossibus in totum identificata, sed ossa sui generis, ita febris hæc non est synochus, non putrida, sed maligna & quidem sui generis.

Quare di-
catur sui
generis.

Febris sui
generis,
natura
qualis sit.

Dixi sui generis: Nam febre malignâ sæpius corripi hominem nihil novi est, ast veris Variolis ultra semel, aut quod rarum bis quendam corripi, quasi est inauditum, vel saltem rarum, aut si unquam factum, casui potius & causis infra annectendis adscribendum videtur. Hujus autem febris sui generis natura maligna hæc est, quod fiat per modum cujusdam criseos, naturâ humorem noxium expellente in corporis peripheriam, cum ægri ephoria, modò crisis bona sit; febris enim illicò aut omnino desinit aut imminuitur, tertio quartovè morbi die, qui criticus esse solet, & apparentibus signis concoctionis; hæc crisis huic febre summè est peculiaris, ut febris quasi ipsa crisis esse possit, tanquam ab aliis omnibus longè differens, reliquæ enim febres, aut per vomitum, aut per alvum, aut per sudores, aut per urinas sanantur, hæc verò per solam corporis superficiem, non extimam solum ut ardentes, quæ sudore copioso liberantur, sed extimam & intimam, simul scilicet per parvos abcessus & pustulas, nunquam alvi fluore, nunquam vomitu sanantur, quin imò si hæc quandoque contingant, pessimum signum hætenus proclamatur. Interim tamen probè sciendum hanc febrem licet sui generis sit, in genere tamen generalissimo, sicut reliquæ malignitatum febres, ad genus morborum intemperiei reduci & sub eo contineri posse, ubi tamen benè notandum, hos morbos non unum, sed duplex morbi genus constituere. Nam primò sunt

Ad quod
morbi ge-
nus hæc
febris re-

sunt morbi intemperiei, quod ex calore præter naturam & febre notissimum est. Secundò, sunt etiam morbi prava conformationis, ut patet ex tumore, & solutione continui.

ducatur, & ad quatuorplex.

Dixi in definitione 5to. Propter peculiarem sanguinis ebullitionem, & effervescentiam (quibus verbis causa earum antecedens) à facultate expultrice irritata (his verò causa continens elucescit) de quibus verbis infra de causis fusiùs agemus. Interim hæc esto datæ Variolarum definitionis rudis adumbratio, quæ tamen ex infra dicendis longè adhuc clarior red-detur.

Explicantur ultima Definitionis verba.

Morbilli breviter sic definiri possunt: *Morbilli sunt exanthemata seu maculæ aut tubercula parva rubra in cute erumpentia, cum febre continua, itidem à facultate expultrice, vel potiùs sanguinis peculiari ebullitione excitata. Juxta mentem Neotericorum: humorum & organorum heterogeneitate & difformitate excitata.*

Morbillo-rum definitio.

CAPUT III.

De Differentiis Variolarum & Morbillorum.

Differentiam horum affectuum quòd attinet, eam trifariam partimur. Primò differentiam horum affectuum in genere & simul in specie exponemus. Secundò, Differentiam in Variolas & Morbillos. Tertiò, Differentiam Variolarum & Morbillorum ab aliis pustulis consimilibus, explicabimus.

Trifaria horum affectuum differentia consideratur & proponitur.

Differentiæ istorum affectuum & exanthematum plures sunt, nam Imò à substantia; alia ex hoc vel illo humore constent,

Differentiæ à substantia,

- stant, unde vel sanguinea, pituitosa, biliosa, melancholica.
- à qualitate 2dò. à qualitate seu colore, sunt vel rubicunda, nigra, flava, livida, violacea, purpurea, alba, coloris denique varii, pro diversitate causæ & humoris ex quo constant, id est prout humor benignior aut malignior est, ex quo oriuntur. 3tià.
- à quantitate. à quantitate, alia sunt copiosa, alia pauca, alia majora, alia minora, alia profunda, alia superficialia, alia sublimia cum tumore cutis conspicuo, quæ Variolæ dicuntur; quædam minora sine sensibili tumore, potius cum asperitate quadam, quæ dicuntur Morbilli, licet *Fuchsius* contrariò prorsus, ast ineptò modò, Variolas pro Morbillis & è contra usurpavit. 4tò.
- à tactu. à tactu, alia dura sunt, ob crassitiem & cruditatem materiæ, alia mollia ab humore aquoso vel flatu etiam turgentia. 5tò.
- à modo & tempore. à modo & tempore, alia sunt boni, alia mali moris, alia citò & sine symptomatum multitudine, alia tardè & ingenti symptomatum stipata congerie erumpentia, & suppurantia. 6tò.
- à Loco. à loco, ratione cuius totum vel partem, collum scilicet, magis oculos, nares, faciem, palatum, asperam arteriam, intestina, lienem, reliquaque viscera magis vel minùs occupantia, ut in operationibus anatomicis sæpius reperi. Alia cum vel sine malignitate, cum vel sine Petechiis.

Differunt Variolæ à Variolis, quod alie sint confluentes, alie distinctæ, item distinctarum; facillimè autem ab invicem discriminantur. Germani distinctas vocant, die hohen und rechten Blattern/ confluentes, die breite zusammen gefahrne und bleibete Blattern/ inticulant.

Circa differentiam Variolarum & Morbillorum hoc notandum, quòd sicut notissimum morbi genus est, quòd Variolarum & Morbillorum nomine appellatur, ità incertum ha-

Genus,

Genus, cui Variolarum & Morbillorum nomen sit tribuendum, & Morbil-
 cum enim, ut diximus, utraque communem habeant essentiam, ^{lorum}
 seu materiam & nomen, quod scilicet sint exanthemata ^{quædam}
 sanguinis effervescentiâ procreata, cum febre universum cor- ^â ^{notanda.}
 pus occupante, cum tumore, pruritu & dolore, adeo ut ple-
 rique Authores non timuerint, quin uterque affectus simili
 modo & methodo tradatur; hinc curatio quoque quoad ma-
 gis & minus, sive accidentaliter tantum (quod non mutat spe-
 ciem, teste *Philosopho*) differt.

Differunt tamen in aliis. Imò. Quia *Variolæ* pustulæ ^{Differen-}
 majores sunt, eminentiores & crassiores, primum elatæ, no- ^{tia I.}
 duli acuum, vel granorum milii instar (als wie Nadel-Köpf/
 oder Hirsch-Körner) postmodum sicut Verrucæ, & tandem
 sicut Perlæ. *Morbilli* minores sunt, nec habent sensibilem
 tumorem, granumque milii nunquam excedentem, Pulicum
 morsibus similes, imò quandoque ipsa cute altiores, adeo ut
 vix oculis aliqua eorum eminentia possit deprehendi.

2dò. *Variolæ* à sanguine corrupto magnâ copiâ peccan- ^{Differen-}
 te crassiore, frigidior aut saltem temperatior: *Morbilli* ^{tia II.}
 verò ab acriori & bilioso solum generantur, ideoque
 minimè petunt altum, id est intumescunt, sed potius, Pulicum
 morsibus ut diximus similes, sunt pustulæ latæ, non sublimes,
 quare citius etiam ægritudo finitur.

Nota, non obitare nobis locum Galeni *Aph. 9. Lib. 6.* & ^{Quomodo}
 ex eo *Fuchsius*, qui inquit, pustulas sublimiores à calidiore ^{locus Gale-}
 humore fieri, humiliores à frigidior, quæ ideo minus pru- ^{ni intelli-}
 riunt, quod à temperatior succo procreantur. ^{gendus, ubi}
^{de pustulis}
^{sublimiori-}
^{bus agit.}

Resp. *Fuchsius* hunc Galeni locum non intellexisse, nam
 hoc modo intellecta Galeni sententia falsa est; erysipelas enim,
 herpes, phlyctenæ, à fervidior fiunt humore & acrior, quàm
 ædema, scyrthus, phlegmone, & tamen tumores sunt mino-
 res & simul aciores, majoremque inducentes pruritum; ipse
 enim pruritus non solet fieri nisi ab humoribus tenuioribus &
 falsis



Tumores
quicunq;
qui in acu-
tum ver-
gunt, ma-
gis pruriūt
ē contra in
latum ex-
tensi, mi-
nūs,

falsis absque ulla extuberantia, ut verum non sit, tumores minores pruritus minus inferre, quin imò autopsiā teste, majorem. Igitur *Galenus* intelligi debet de tumoribus & pustulis ejusdem generis, non diversi, sicut hic Variolæ & Morbilli sunt, nam non bene opponuntur latæ pustulæ sublimibus, cum plurimæ sublimes possint esse latæ, plurimæ humiles acutæ; sed latæ opponendæ sunt acutis, humiles sublimibus; malè enim quis discurret, si hominem obesum magno, & gracilem minori oppositum veller, cum certum sit, multos obesos longos & magnos, graciles & parvos & è contra reperiri. In uno quoque genere tumorum, sive sint sublimes, seu humiles, quicunque in acutum vergunt, magis pruriunt, quoniam acrior causa eos concitat, minus verò qui in latum expanduntur, & hoc adaptari debet Variolis & Morbillis, nam Morbilli possunt, esse acuti & lati non minus quam herpes, quorum qui miliares sunt, multis exiguis pustulis minimum exstantibus cutim exasperant, ut forsàn non sine ratione *Monardus* Morbillos ad herpetum genus retulerit, quod valde magnum pruritus inferant. Pariter Variolæ possunt esse acutæ & latiores; acutæ magis pruriunt, quàm quæ in latum exporriguntur, nam in latitudinem extensæ distantur, & quæcunque latæ sunt humorem habent minus acrem. ●

Differen-
tia III.
Variola-
rum à
Morbillis,

3^{tiò}. Differunt, quòd major in *Morbillis* sit fervor & subtilior ebullitio, hinc etiam major calor & intensior febris, & major quoq; respirationis angustia, quia illorum sanguis acrior est, hinc etiam acrior pruritus, sed non diu durans, quia statim omnes vel pleræq; & citius prorumpunt. In *Variolis* verò non est tantus fervor, sed major ebullitio, ob copiam materiæ, calor etiam non tantus, nec tam intensa febris, quia sanguis ob copiam est mitior, quem calor igneus aut motus circularis non possit superare. Pruritus quoque licet non sit ita acris, est tamen dolorosus & diutius durans, ob eandem rationem, quod nimirum tardius prorumpant, hinc etiam dolor
dorsi

dorsi in Variolis longè plus excruciat, adeò ut multi crediderint infantes sibi spinam dorsi eluxasse, & inde orti errores, quòd illos inunxerint, & alia pinguia remedia contra casum porrexerint, ex quibus obstructis poris & tubulis, magis accensus sanguis circularesque humores, loco Variolarum, Pecthix & quidem nigræ, & mors repente secuta est: ità contigisse cùm quodam Illustrissimo Comite Juniore, & quidem ultimo ex Excellentissima & Illustrissima Familia, oculus & luctuosus fui testis; nam cùm in Variolis major sit pravi sanguinis & humorum redundancia, venæ dorsi & cum his nervi extenduntur, inde dolor dorsi longè major: Proinde si adeo ac moneo Medicinæ Practicos, in hoc & simili casu bene attendendum esse, ne decipiantur.

4to. Differunt, *Variolæ* suppurantur & replentur tenui pure, vel (ut aptius loquar) ichore, mox marcescunt, & tandem crustas acquirunt, quæ postmodum decidunt, quod longiori tempore durat; *Morbilli* verò nullo ichore unquam præditi, sed breviorum, acutiorem & periculosiorem morbum inferunt, sponte evanescunt intra 5. vel 7. dies, nullâ relictâ ulceratione aut cicatrice.

5to. Differunt. *Morbilli* comuniter censentur affectus, qui sæpiissime inter pueros corruscant, rariùs ætate grandiores aut senes corripit; etiam qui Variolis priùs laborârunt, non sunt adeò postea Morbillis obnoxii; sic enim observatur sæpiùs, quando Variolæ Morbillos præcedunt, plerumque Morbillorum exinde sequitur immunitas, quia Morbilli fermenti particulas saltem aliquales absument, adhuc diathesin ad Variolas relinquunt, quare ut dixi senes aut ætate grandiores Morbillis non ità promptè inficiuntur, quia à Variolis priùs infecti, aut contagio absolvuntur, aut leviori hujus affectûs myasmati eorum spiritus robustiores facillè resistunt.

6to. Differunt. *Variolæ* oculos gravissimè adeò interdum lædunt, ut inde visus amittatur: *Morbilli* verò ocula

los non afficiunt; cujus ratio forsitan hæc dari potest, quod natura tenuiorem humorem ad oculos non admittat, sed dissipet, & si admittat faciliè dispellat, crassiorem autem quem natura in copia transmittit, nec repellere, nec dispellere, quin eundem admittat.

Obectio. Sed dices, hanc rationem non subsistere, cur enim oculi, qui secundum Aristotelem 31. *problemat.* 22. soli non rigent, neque gelutentantur, tam graviter à Variolis affici possint?

Responsio. Magnam in hoc esse differentiam, quod illud sit extrinsecum agens, à quo se perpetuò motu & seipementis ruen-
tur oculi; hoc verò internum domesticum & crassum; sicuti autem bella domestica sunt multò graviora quàm externa, ita & hic. Alii verò contrarium statuunt, uti Grulingius *Lib. 5. Med. Pract. Cap. 9. fol. 837.* qui dicit in Morbillis & eorum ortu plures ex oculis exstillare lachrymas & acriores esse plerumque, quàm in Variolis; rationem nullam addit, interdum credendum est, tam senis Practici experientiæ.

Annotatio. Notabis hic obiter, de Variolis & Morbillis non tantum inter Medicos, sed inter assistentes mulieres, præsertim in Aulis Magnatum, innumeras ferè proponi quæstiones & difficultates, Doctoribus aliquando difficulter solubiles; ita sanè meminit famosissimus *Bavariæ Archiater Thiermaier*, foeminam Illustrem in Gynæceo olim interrogasse: cur infantes plerumque citius Variolis quàm Morbillis afficerentur, cum tamen Morbilli facilius erumpant & dispareant, atque adeò mobiliorem materiam præsupponant? non levis revera hæc est quæstio, ad quam modò citatus Author doctè admodum respondet: Duplex est, inquit, excrementorum contentorum in sanguine materia, una crassior, alia subtilior, & ut alibi dictum, volatilis & acris, nec dubium est quin crassior per Variolas, subtilior per Morbillos evacuetur, interim cum utramque expellendi necessitas incumbat naturæ, & hæc natura à multitudine magis quàm ab illius acrimonia irritetur in infantibus, & pueris in quibus color nondum

Ratio quare plerumque Variolæ citius in

nondum tam acris est, omnisque excrementorum acrimonia ab ex-
superante humiditate facile obtunditur, consequens erit, ut cras-
sior Variolarum materia, in regionibus Germanorum plerumq;
magna ex parte citius, quàm subtilior Morbillorum pars, apud
infantes & pueros expellatur. Quòd si verò contrarium con-
tingat, id vel diversitati temperamentorum, vel intercedenti
contagio adscribendum est, quod effectus & experientia docuit,
ut modò Morbilli, modò Variolæ epidemicè grassentur & ob-
veniant. Et hæc per parenthesin.

Differentiæ tandem, quæ Variolas & Morbillos à consi-
milibus pustulis discernat, ansam dedit tertium quoddam ge-
nus pustularum, pueris familiare, & Variolis quoad magnitudi-
nem simile & etiam quoad figuram, cujus descriptio, ut supra
diximus, apud *Vidum Vidium* est, vulgò à Gallis *Veirolette*,
Italicis, *Ravaglione*. Latinis, *Variolæ petreæ*, *Grandines* seu
CrySTALLI. Germanis, *Wasser oder Epitz-Blattern/ oder*
Stein-Bocken/ Windt- oder Schaffs-Blattern dictæ. Cry-
stalli sunt quædam vesiculæ aquâ plenæ, instar crystalli splen-
dentes, quæ licet pueris familiares, Variolisque quoad magni-
tudinem & figuram similes, in multis tamen ab iis distinguun-
tur. *Primò*, quòd Variolæ cum rubore & inflammatione
appareant, tardè suppurentur, & ad undecimum, quin imò
14. diem perdurent. Crystalli verò albæ sint, & veluti vesicu-
læ seroso humore repletæ, quæ intra triduum disrumpuntur
& exsiccantur. *Secundò*, Variolæ semper cum febre & non
sine periculo, Crystalli verò plerumque sine febre, & sine peri-
culo. *Tertiò*, Variolas incurrunt omnes quasi homines, quia
est morbus hæreditarius, Crystallòs verò non item: ex quibus
patet Crystallòs ad genus Variolarum & Morbillorum, tanquàm
tertiam speciem esse referendum.

Nota, cum secundùm plerosque ex eodem sanguine men-
struo Elephantiasis seu Lepra generetur, quæres, quonam de-
mum modò à Variolis distinguantur? quomodo nimirum in

D

Variolæ.

infantibus
oriantur,
quàm Mor-
billi, &c.

Alia diffe-
rentia Va-
riolarum
& Morbil-
lorum à
consimili-
bus affecti-
bus.

Variola-
rum petre-
arum seu
grandinò,
seu crystal-
lorum de-
finitio.

Differen-
tia eorum
ab aliis Va-
riolis. I.

II.

III.

Elephan-
tiasis ut di-
stinguatur
à Variolis,
& cur hæ
sanabiles,
illa è con-
tra.

Variolis universus corporis habitus expurgeretur, in illa verò immedicabili malo defædetur? *Resp.* id explicare non est difficile, modò sequens propositio bene distinguatur: Con-
ceptio fit, vel antequam fluant menses, vel postquam fluxe-
runt, vel dum fluunt. Optima fit post menstruorum fluxum,
uterò repurgatò, deinde antequam fluant, deterrima autem
ipsis fluentibus, quæ etiam legibus divinis prohibita est: na-
scuntur enim fætus elephantici. Itaque ex pravo sanguine ge-
nerationem sortitur homo, ut, qui fluente menstruo gignitur
fit elephanticus, qui verò, post uterum à sanguine expurga-
tum generatur, cum ex optimis purisque principiis coalescat,
solidæ partes bene se habent à nativitatis principiis, solummo-
do dum ad nutritionem purum impurumque suum sangui-
nem proleat, labem aliquam contrahit, quam deinde per
Variolas expurgat.

Non omittendum, hic est novum quoddam Variolarum
genus, quod sub historia exanthematum, quæ annis superio-
ribus in tota civitate Wiennensi grassabatur sub titulo *Rosa-
liæ* seu *Rosariæ* Neapolitanis dictæ, quæ à Germanis propter
analogismum *Neßlsucht* / à Boëmis *Spala* nominatur; cu-
jus descriptionem *Jonstonus* ita habet.

Rosalia
definitio.

*Rosalia seu Epidemata sunt macule rubræ & quasi igneæ,
quæ cum vix effatu digno tumore, per univ. corpus, quasi
quædam erysipelata parva, in principio morbi, seu die quarto
vel quinto erumpunt, progressu morbi totum corpus occupant,
ut id quasi ignitum appareat, is color in declinatione iterum, ut
in principio in maculas mutatur, quæ tandem septimo vel nono
die evanescent, epidermide quasi squamis decidente; horum
tamen curatio nihil singulare habet, sed ob causæ cognatio-
nem, quam cum aliis habet, unâ eademque curâ perficitur hoc
morbi genus, Germanis die Ritteln / oder Röstteln / oder
Rösalien / oder die Neßlsucht (quasi urticâ quis casus esset)*

Boëmis

Curantur
uti Varic-
læ & Mor-
billi.

Boëmis *Spala*/ id est uftio dicitur , à rubore nimirum, quæ sæpe cum calore, tussi, aliisque Morbillorum symptomatibus invadunt, minùs tamen sunt periculosa, quàm vulgares Morbilli, & quandoque solæ invadunt, quandoque Variolis inter se sparguntur, quandoque sanatis Variolis superveniunt, de quibus fusiùs Sennertus *Lib.4.de febrilib. Cap.12.fol.512.*

Nihilominus etiam hoc malum subinde grave & periculosum, imò sæpe lethale est, calor enim est ferventissimus, sitis inextinguibilis, sæpius ac plerumque (unde tussès excitantur) faucium viscerumque aliorum inflammationes, deliria & alia mala urgent; in declinatione tandem materia ad articulos extremorum transfertur, ac dolorem & ruborem, ut in Arthriticis excitat, cutis squammarum instar decedit, mox pedes ad talos & furas usque intumescunt, hypochondria laeduntur & suspenduntur, respiratio difficilis redditur, tandemque abdomen intumescit, agriq̃ue non sine magno labore & post longum tempus pristinae sanitati restituuntur, sæpè etiam moriuntur. Cujus notatu dignam refert historiam Sennertus supra citato loco.

Etiam ali,
quando
sunt peri-
culosa.

Puerum quandam *Wratislaviae* post hunc morbum, pedibus, cruribus, scroto, ventre ac facie intumuisse, cum genarum nonnullo ac perpetuo rubore, febriculâ irregulari, tussi, quâ pauca, eaq̃ spumosa saltem & pituitosa rejiciebat, cum summa respirandi difficultate. Hic, prima die antequam moriretur, post summam respirandi difficultatem ponderis sensum circa pectus, ac stertorem, pulmonis abscessu rupto, pus & sanguinem atrum tussi rejecit, & hinc septimo ab illo die, cum eadem symptomata redirent, mortuus est: Corpore aperto, tota pectoris cavitas aquâ citrinâ repleta, pulmones ambo toti lividi & gangrenosi, sinister magnum intus abscessum fovebat: Abdomini innatabant intestina tota simili aquæ, omentum propè consumptum videbatur, hepar pro individui ratione portentosa fuit magnitudinis

Observatio

Et subpallidum. Talia autem mala ac symptomata, arthriticos nimirum dolores Et tumores abdominis, Et id genus similia, huic morbo succedere mirum non est, cum enim Variolæ non solum in externis partibus, sed etiam in omni viscerum superficie erumpere solent, idem etiam in Rosalia accidere potest, & sicut totum corpus extra inflammatur, ita etiam viscera interna procul dubio inflamantur, Et de pulmonibus res extra dubium est, neque etiam dubitare quis potest de aliis visceribus, unde materiæ parte ad extrema protrusâ, primum fiunt dolores arthritici, hinc tumores hydropici, ac viscera ipsa corrumpuntur.

Superest, ut differentiam statuamus inter Morbillos & maculas illas purpureas in febribus malignis apparentes, quas vulgò Petechias, Germani Petetschen/vocant (de quibus alibi) quas plerique inter se confundunt, & ab iis sæpè in praxi Eruditissimi Viri (non sine ingenti patientum sanitatisque discrimine) confunduntur.

Differ. ia
Variolarum
& Petechiarum
I.

Differentia ergo Ima est hæc: quòd nimirum illæ maculæ purpureæ, pustulæ non sint, sed superficialiæ solummodo efflorescentiæ, sine elatione aut tumore, sed pulicum moribus saltem quasi ex toto similes; præterea nullum pruritus edunt (idque ob summam malignitatem ejusque narcosis) nullumque ullius post se relinquunt vestigium, quæ omnia tamen conveniunt in Morbillis & Variolis.

II.

Differunt 2do. Ratione loci, quòd Variolæ & Morbilli quamvis in toto corpore erumpere soleant, majori tamen copiâ in facie pedibus & manibus apparere consueverunt; in maculis purpureis verò aliter evenit, illæ enim in pectore & dorso præcipue apparent, ratio autem hujus hæc est, quòd cum Variolæ oriuntur ab ebullitione sanguinis, cujus beneficio fit excretio ad cutem, excrementi in eo latantis, & pravâ qualitate affecti, ad quod multum facit hepatis, tanquam (ut antiqui volunt) fontis & originis sanguificationis, secundum nos
verò

verò partis coadjuvantis, vel potius perficientis sanguificationem, discrasia vel intemperies; etenim, ut experientiâ observamus, & ratione convincimur, hepatis emunctoria sunt facies, manus ac pedes, unde fit, ut calidiore hepate præditi, facie rubedine ac pustulis, vulgò guttâ rosaceâ laborare, caloremque internum in volis manuum ac pedum percipere soleant, eaque ratione major sit expulsio in illas partes. Contra verò maculæ purpureæ in febre maligna, à corde præcipuè affecto oriuntur, ideoque circa partes cordi vicinas erumpunt, & præcipuè circa lumbos, quia in his vena cava & arteria aorta decurrunt.

Differunt 3^{tio}. Ratione coloris, quòd primæ maculæ, quæ in Variolis & Morbillis conspiciuntur, sint floridi & rubicundi coloris & exiles, ac postea dilatantur, maximeque appareant in facie & manibus, ut diximus: Petechiæ verò sint rubri obscurioris coloris, declinantis in purpureum, & in principio aliquantulo latiores & exactè rotundæ, & nullæ ferè erumpunt in facie & manibus, sed in pectore, dorso, ex data jam ratione.

Differunt 4^{to}. Ratione temporis & motus, quòd Variolæ & Morbilli apparentes, tertio vel quarto die à febris invasione, critica esse soleant, & ut plurimum salutare: maculæ verò purpureæ etiam septimo die apparentes, plerumque symptomatice sint, & morbum reddant deteriorem, cum aliter debere fieri videretur, morbus enim crudior est quarto die quàm septimo: hujus autem eventus ratio inde desumenda est, quòd in Variolis & Morbillis plerumque febris incipit à summo vigore, ideo non solum tertio aut quarto, sed etiam primo vel secundo die, excretiones ferè in ea critica possunt contingere; siquidem, ut dictum supra, Variolarum & Morbillorum eruptio unâ crisis est. Verum febres malignæ segniùs progrediuntur, & principium earum ad septimum plerumque extenditur.

Ratio assignatur quare Variolæ quarto die febris apparentes sint critica & petechiæ non item.

tur diem, unde eo tempore excretiones contingentes, non possunt esse verè criticae. Sed

Quæres, cur autem Variolæ & Morbilli tam cito ad statum perveniant, non autem febres malignæ? *Resp.* id inde fieri, quia febris Variolarum & Morbillorum à putredine levissima & sanguinis ebullitione potius, quàm intensæ materiæ putredinè fit, eam cessare facit natura mediante coctione ante diem septimum, eò quòd levissima sit, & facillimis ex causis orta, at in febribus malignis adeò urgens & fortis est putredo, ut nec decimo quarto die & interdum duodecimo corrigi possit, & ob id maculis erumpentibus ante id tempus exacerbatur, quia citra coctionem, & symptomaticè coacta fuit natura eas expellere.

Ad quæ-
stionem
quomodo
culicum
morsus à
Morbillis
distingua-
ntur, re-
spondetur.

Sed dubitat quidam, quomodo autem culicum morsus à Morbillis differant, cum, ut dictum, ex toto illis sint similes? *Resp.* Licet hoc dubium non mereatur responsum, quin potius dubitantem ad vetulas culicum aucupes dimittere videatur, quæ si aliam solutionem non haberent, in hanc ad minus prorumperent, se detentis maculis purpureis pro culicum aucupio indispositas, lassas & verbò infirmas videri, quin potius irridendo ac cachinnando, stratum super stratum, verborum scilicet elegantiâ, ipsius imponent auribus; Interim nè crasso dubio ingrassatum relinquamus, dicimus morsus pulicum & culicum sine dolore & tristi sensu fieri non posse, fiunt tamen sine virium jactatione, symptomatumque multitudine, quòd non evenit in purpureis, unde facilis dabitur utrorumque dignotio.

Obiectio. Instabis, posse fieri, ut hi morsus cum jactatione virium & symptomatum multitudine coincident, quid in hoc casu dicendum? *Resp.* hoc in casu, copiam, & quantitate, loco & duratione esse discernendum, quod si morsus tantâ quantitate non prorumpant, neque in locis certis, sed hinc inde sparsis,

sparsis, & nunquam aliquot horas (quod in petechiis dies) perdurare observamus.

CAPUT IV.

De Subiecto Variolarum & Morbillorum.

Subiectum adequatum *primarium* in Variolis & Morbillis, Subiectum adequatum Variolarum & Morbillorum primum, ratione febris, nec non ipsarum pustularum & macularum assignatur. Sest vel totum Corpus, ratione febris, vel ratione pustularum & macularum, Cutis cum Cuticula (si ea ut affectus spectamus, aliud enim dicitur infra de subiecto cause) quæ sunt nostri Microcosmi littora, glandulis infinitis & tubulis scatentia, inibi enim vasorum terminus, & merito sanguinis maceries observatur, omnes hoc suscipit sanguinis quicquillas, tum hæc ipsa exanthemata. Cutis ergo quæ rarior & calore magis fovetur, magis hæc suscipit pustulas saniofas, unde sese in dorso magis produnt; quàm in facie, manibus & pedibus, hinc Medici statim dorsum inspicere debent, & quidem ab initio, ut certiores de præsentia illarum reddantur.

Quod attinet subiectum *cause* seu *inhesionis*, est Massa sanguinis & Lympha, imò omnes partes solida & internæ v.gr. ventriculus, intestina, pulmo, jecur &c. in quibus seipsum jacet seminum, nec excludendo glandulas, ut testantur cadaverum Variolis mortuorum sectiones. Subiectam cause seu inhesionis

CAPUT

CAPUT V.

De Causis Variolarum & Morbillorum.

Causæ Variolarum & Morbillorum.

Varizæ à variis Authoribus recensentur.

Absolutâ Variolarum & Morbillorum identitatis, earumque differentiarum & subiecti explicatione, ad causas earundem convertimur, de quibus eò acrius disputant Medici, quò inutilior & incertior est illarum inquisitio, nam sive ab aëris vitio, sive semine, sive sanguine menstruo ut *Arabes & Willisius*, sive sanguinis impuritate ut *Galenus*, sive sale, sulphure & Mercurio, ut *Paracelsus*, sive veneno ignoto quo cruor inficitur & Archæus exasperatur, ut *Helmontius*, sive ab acrisalfo lixivio, ut *de le Boë Sylvius*, sive ab implantato nobis principio ex lacte nutritivo, in & extra uterum hausto, & in liquamen acido-salinum abeunte, ut *Ettmüllerus, Doletus*, sive aliis ex causis oriuntur, eadem vix non curandi ratio est. Attamen aliorum imitatione, nè quid videamur omittere, de iis omnibus in specie agemus,

Verùm tamen, si unquam in magnâ versamur caligine nos Medici, ea frequentissima contingit in causarum cognitione, ut ortum sit tritum illud & vulgare proverbium: *felix qui potuit rerum cognoscere causas*. Verissimum proinde sit etiam dictum Hippocratis *Lib. de flatibus*: qui morbi, inquit, cognoverit causam, is utique ex his quæ in corpore insunt, adepta per contrariam morborum cognitionem, facillè poterit quæ profunt offerre: nam si in aliis, ceu minore luce cæcutimus, absque omni dubio hic plane in sole cæci sumus: nihilominus, hoc non obstante, nobis liceat causam affectus nostri eâ quâ possumus brevitate & claritate prosequi: prius tamen

Sciendum

Sciendum 1^{mò}. Medicos morborum causas ordinariè & primariò dividere in *Internas & Externas*. Internas rursum in *Immediatas & Conjunctas* seu *proximas*, seu *continentes*, & *Mediatas* seu *antecedentes & Remotas*.

Dicitur
causarum
quomodo
& quotu-
pliciter à
Medicis
fiat, indi-
gitatur, I.
II.

Sciendum 2^{dò}. Causas internas continentés rursum esse vel *Materiales*, vel *Efficientes*, quas alii *formales* dicunt, unde

Sciendum 3^{tio}. Causam *Efficientem* eam in Definitione à nobis fuisse expressam, scilicet facultatem expultricem irritatam esse, quid autem sit, quòd facultatem seu naturam, seu ut Neoterici loquuntur Archæum irritet, hic Medici cerant & adhuc sub judice lis est, quàm antequam decidamus,

III.

Sciendum 4^{tò}. Variolas & Morbillos omnes omninò homines occupare, juvenes & senes, virgines & vetulas, adeò ut virum octuagenarium, & foeminam septuagenariam me habuisse & curasse Variolis laborantem, ipse sciam: Similes etiam casus plures refert Thiermair in *Consil. Lib. I. Cap. 7. fol. 90.*

IV.
Omnes o-
mino ho-
mines Va-
riolis cor-
ripiuntur.

Et quamvis unus aut alter reperiantur, qui hujus labis dixerint se immunes, tam parum ipsis credendum, quàm certum est, eos iisdem adhuc corripi omninò sit possibile, aut saltem in utero matris jam communem stragem sustulerit. Prout tales casus refert Moëllenbrokius in *curiosis Medico Chymicis Germanorum Anni 1670. Obs. 53.* & Joannes Rhodius *Centur. Obs. Medic. 3. Obs. 83.* Et meâ propriâ autopsiâ (scisò puellò variolante ex matris utero Romæ in Nosocomio alla Consolazione dicto) contestari possum. Quin imò Variolas morbum esse in Islandia periodicum testatur Thomas Bartholinus in *disertationibus de Medicina domestica*, his verbis: *Islandi alii præterea sunt ipsis morbo peculiari subjecti; species illa est Variolarum periodica, quæ singulis vicennis an-*

Confirmatur
Aurho-
ritatibus
variorum.

E

nis

nix redit, & observatum est omnes illos morbo illo stato tempore non correptos, sequentibus viginti annis suum obiisse diem.

Fidem propè excedit, quod Petrus Borellus *histor. & observ. rariorum Medico physicarum Cent. 3. obs. 10.* narrat. Videtur inquit *quisvis non solum in juventute, imò & in senectute Variolis cruciari, sed nihil adeò (inquit ulterius) circa has notandum occurrit, ac Mulier quædam Bononiensis Galla, quæ septies illas passa est, & Anno 118. tandem eodem morbo periit. Franciscus de le Boë Sylvius refert multos bis terve in vita laborasse Variolis, quin imò nonnunquam (ut ipse testis sum eodem annò) observasse se meminit. Thomas Willis Lib. de feb. Cap. 16. doctè & breviter hac super re discurret: Convenit inquit, homini omni & soli & semel Variolis & Morbillis affici, si fortè quispiam totâ vitâ immunis degerit, aut alius in hos affectus sæpius inciderit, sunt hæc rara & inusitata naturæ eventa, quæ communi observationi minimè derogant. Quòd si ergo ita est, ut videtur verissimum, quòd omnes hic affectus occupet homines, & miraculum sit, ut diximus, si quis immunis evadat, verum etiam erit, communem morbum esse, & communem ideò causam habere, teste ipso Hipp. Lib. 1. de natur. hominis, ubi inquit: communes morbi communem causam agnoscunt, ubi*

Quid intelligamus
per causam
communem.

Sciendum igitur. hic per causam communem nos loqui de causa materiali, non autem efficiente seu formali (ut pluribus infra) Variolarum & Morbillorum.

Causa communis quæ sit, & quodplex.

Causa autem communis, quâ scilicet omnes utuntur est vel *Aër* quem inspirando attrahimus, & extra ambiendo nos afficit; vel *Lac*, quo omnes utimur pro nutritione, vel *Semen* ex quo omnium hominum origo, generatio & principium, vel *Sanguis menstruus*, quo itidem partes corporis nostri coagmentantur & fiunt.

Doctissi-

Doctissimus *Fernelius* & cum eo non pauci, ex causa abdita seu potius arcanâ aëris qualitate proficisci putat, indeque fieri, ut certis temporum intervallis prorsus fileant, rursusque sevant in plebem, præterea quod rigente cœlo, non minus quàm ferventissimo, generentur: Causam vero cur in Infantibus & pueris hæc magis familiaria sint, quàm adultis, hanc reddit, quod firmior sit ætas adultior, & tantillis malis non lacescitur, nisi cùm fortè constitutio gravior invaluerit. Sed malè sensit doctissimus Vir, quamvis enim interdum epidemiorum morborum more grassentur, id tamen non est perpetuum, sunt enim sæpius sporadicæ, id est sparsim vel hunc vel illum privatim corripientes, quod signum est Variolas & Morbillos tunc temporis non à causa communi, sed privatâ provenire, & quocunque anni tempore, in qualibet regione quidam hoc morbo consistantur; in Septentrione, in Meridie, Ortus & Occasu, in universo demum terrarum orbe quidam perpetuo sunt, qui eò laborant, unde etiam interdum sevuunt in plebem; falsum tamen est unquam prorsus silere.

Fernelii opinio de causa communi.

Refutatur.

Itaque cùm omnibus communis sit hic morbus, & pueris maximè familiaris, ad aërem solum referri non potest, quæ enim sporadicæ Variolæ sunt, non nisi ab interna causa possunt suscitari, singulis enim annis pueri quidam illis afficiuntur ubique gentium, etsi aër nec pestilens sit, nec malignus. Qui tamen si Variolæ & Morbilli solum ex aëris vicio provenirent, singulis annis (quod avertant Superi) aër pestilens ac malignus dari deberet. Vel igitur ab aëre originem non ducunt, vel arcana illa aëris qualitas in universo terrarum orbe perpetua est, quod est absurdum & non verosimile; Accedit, quod si aër causa esset, non tantum semel in vita sed sæpius, pestilentium & malignarum more infestarent, quod tamen fieri non observatur, nisi rariùs, ut supra allegavimus.

Lac esse
causam
communem
etiam non
admittitur

Semen esse
illam cau-
sam etiam
refutatur.

Quin tamen quandoque, etiam sæpius à contagiosa causa coelesti, materia Variolarum commota ad fermentationem & actum deducatur, non video cur tam strictè & fundatè negari possit. Altera secta, quæ paucos habet fautores, *Lac* quo infantes nutriuntur, causam esse statuit: Sed malè æquè ac prior, absit enim, omnium nutricum lac esse vitiosum, quia alias in universum omnes nutrices laborarent, ob vitiosi scilicet sanguinis perpetuum proventum, quin imò sæpe videre contingit, partus hac lue perfosus fuisse editos antequam lacte fruantur. Tertia classis eorum est, qui *Semen* quasi ex primis generationis principiis causam horum affectuum asseruerunt, verum minùs fundatè, quantumvis enim concedamus, Semen commune ac proprium quoddam generationis principium esse, ac proinde rationem communis causæ ipsi competere posse, negamus tamen tantò firmiùs, idem semen causam Variolarum & Morbillorum esse posse; Ratio, quia ab eo morbi quidem hæreditarii, sed tales qui totà vità perdurant, ac per vices sæpiùs affligunt, oriuntur; Variolæ autem & Morbilli, qui communiter semel, rariùs bis, rarissimè hætenusque inauditum ter recurrunt, contrariam naturam obtinent.

Obiectio.

Responsio
ad ob-
jectionem.

Sed dices, semen, ex dictis, æquè est principium generationis sicut sanguis menstruus, ergò si dictus sanguis potest esse causa horum affectuum, etiam semen poterit esse causa? Resp. esse disparitatem, quòd semen sit principium formale, materiale verò sanguis maternus, sicut autem principium formale ut tale, non potest esse materiale & è contra, ita multa competunt principio formali, quæ materiali denegantur, & multa producuntur à principio formali, quæ non producuntur à principio materiali, & vice versa, ut supra in proëmio de vi hæreditaria diximus.

An diathe-
sa seu di-

Communissima tandem eaque hætenus probabiliior opinio, quam *Arabes* primò protulerunt, *Galenus* & omnes ferè

ferè Authores tenent, est, hujus morbi causam esse, *reliquias* seu *diathesin*, seu connaturalem dispositionem *sanguinis menstrui*, quo in utero fœtus elevatur; fœtum enim in utero sanguine maternò sustineri, apud omnes in confesso est veteres, primis quidem mensibus purissimo, sed incrementum fœtu purum vitiosumque simul absorbit, eoque magis quo fœtus est grandior, plurique alimento eget ad sui nutritionem.

(positio
connatura-
lis sangui-
nis men-
strui sit
causa Va-
riolarum
communis

Huic *Arabum* & aliorum hætenus gravissimorum Viro-
rum veterum sententiæ se opponit Mercurialis de morb. pue-
rorum Lib. 1. Cap. 2. asserens: *hæreditariam esse, & à parenti-
bus in filios derivari hanc aptitudinem Variolarum*. Hæc Mer-
curialis: oppositio, licet in ratione utcumque fundata sit, at-
tamen tam firma non est, ut ob eam sententia Arabum ex
toto rejiciatur, nam ut supra dictum, Sanguinem & humo-
rem quem in utero materno haurimus omnes, plerumque non
ex toto defæcatum esse, sufficienter comprobant impura fœ-
minarum menstrua saltem ex parte, præsertim fœtu gran-
desciente pro alimento ejusdem destinata; quid igitur mi-
rum, si hæc impuritas per alimentum commune in nos deri-
vata, hæreditariâ quadam successione in omnibus propemo-
dum seriùs aut citiùs depuretur, de quibus fusiùs in sequen-
tibus.

Probatur
sanguinem
menstruū
esse horum
affectuum
causam.

Nec obstat doctrina Galeni 5. *Epid. Comment. 7. tit. 73.* Ubi inquit: *melio-
rem sanguinem ad se trahit nutrimenti causa infans, deterio-
rem autem relinquit, unde prægnans prævis humoribus impletur,
quos in partu natura evacuat, ideò, hunc lo-
cum intelligendum esse de fœtu primum formato, non verò dum
incrementum sumpserit, ubi purum cum impuro sumere opus ha-
bet, quin imò impossibile creditur, quin grandior fœtus aliquid
de prævis humoribus non simul attrahat, præsertim cum in gra-
vidis menses supprimantur, per quos alias natura singulis men-*

Quemodo
Galeni do-
ctrina in-
telligenda
de nutri-
mento fœ-
tus.

sibus, id quod vitiosum in corpore cumulabatur excernere solebat: unde eotempore quò fœtus major factus est, matres & plenitudine & vitiosis humoribus minus laborare, & symptomata, quibus ob sanguinis copiam & pravorum humorum retentionem antea vexabantur, evanescere observantur: hujus autem sanguinis impuri malâ qualitate fœtus inficitur, unde solida & carnosæ partes eâ labe inquinatæ, accedente causâ aliquâ procacitaticâ excitante ebullitionem, cujus causæ beneficiò ebullitio fit, quâ ratione semel saltem si non sæpius in vita depurari postulant; quæ sententia à doctissimo de le Boë Sylvio, novæ sententiæ si non fundatore, promotore certè eximio, nec recipitur nec rejicitur: inquit enim loco citato suprâ: quemadmodum autem nullam novi rationem urgentem, quæ hoc assertum evertat, itâ nullam etiam novi, quæ idem potenter adstruat.

Sylvius
suam cum
antiquorū
sententia
de men-
struo san-
guine com-
binat.
Quid fer-
mentum
Variolarū
sit, & quo-
modo fœ-
tui com-
municetur.

Interim tamen si juxta nostram & recentiorum mentem, debitè interpretetur, non omnino improbabilis videtur; nam quod illi dicunt Veteres de sanguine materno, nos, de universo sanguine à toto corpore, per uterum seu illius vasa fœtui communicato asserimus: In fermenti autem ratione hoc in casu in eandem coincidimus, scilicet, nil aliud esse, quàm fermentationem omnium succorum in sanguine, in corpore nostro contentorum, ordinariam, fœtui per uterum communicatam, & eidem postmodum identificatam. Quippe verum est in utero muliebri (idem secundum nos dici potest in toto corpore) secus ac in aliis plerisque animalibus, generatur fermentum quoddam, quod Sanguinis massæ communicatum, ipsi vigorem ac pneumatosis conciliat, ac deinde statis periodis turgescientiam & sanguinis superflui excretionem procurat, & hinc ego motus sum purgationem menstruam mulierum aliud non esse, quàm fermentum succorum, existentium in utero ex corpo-

re eò delatum, quod fufius proprio loco demonftrabitur, & de hoc videri poteft Graff *de Mulier. organ. fol. 140. & 141.* Tempore verò conceptus cùm omnino defiftant menftrua, plurimum hujus fermenti foetui impertitur, ejusque particulæ cæteris quibuscunque heterogeneæ, velut quid extraneum humoribus feu omnibus fuccis & maffæ fanguineæ perfunduntur, quibus involutæ & à fe invicem feparatæ, diù delitefcunt, poftea tamen à caufa evidenti commotæ, cum iisdem fermentantur, ipfisque *ebullitionem*, ac deinde *coagulationem* vel *resolutionem* inducunt, à quibus plurima hujus morbi fymptomata oriuntur.

Quomodo illud fermentum in aërem deducatur.

Quid autem fermentum in genere fit, quæ ejus caufa, proprietas, finis & effectus, diximus in titulo de febribus in genere, necnon in capite de febribus malignis, ubi fuiffimè fumus ratiocinati, & infra adhuc ubi de indicationibus egerimus, præcipua quædam annectemus; in præfenti interim fufficiet hæc pauca ad rem apta nofcere.

Fermentativa hæc femina feu fucci, modò funt pauci & mitiores, modò aliis corpusculis ita involuti, ut non facile emergant & in actum deducantur; quandoque etiam funt plures & ferociiores, ita ut levi quavis occasione in hunc morbum maturentur, ac in quibusdam major vel minor, magis benigna vel maligna fit ebullitio, atque hinc quidam citius & primis annis, alii magis vel minùs, alii benignius, alii ferociùs corripuntur, hinc alii primis annis, alii non nifi provecftà ætate, alii per contagium periculose, alii fine periculò hanc labem fufcipiunt, unde fit quòd Pueri fæpiiffimè evadant, Senes autem plerumque pereant, idque ob mox datam rationem, præterea quia in pueris & juvenibus transpiratio facilior eft, corporis etiam habitus firmior & falubrior. Adde quòd ex eadem ratione mox datâ (licet venenata huius morbi femina ut plurimum femel vel unicâ ægritu-

Rationes adducuntur quare quidam citius aut tardius, quidam gravius, alii benignius &c. his affectionibus afficiantur.

Quare quidam fæ-

pius Variolis corripiantur, datur ratio. Quare quidam citius alii longius liberantur, ægritudine solent diffari) quandoque accidat tamen, ut parte miasmatis adhuc relicta, bis aut ter ægri in hunc affectum incidant. Præterea quò dulciores & pinguiore hi succi vel semina sunt, eò mitius & diutius fermentationem suam peragunt, maioremque copiam spiritus effervescentis gignunt; quò macrior verò, & austerior succus seu semen est, eò impetuosius fermentatur, citius definit, & consequenter paucior

spiritum effervescentem producit: nullus enim unquam succus est, qui spiritum effervescentem actualiter in se contineat, sed is demum producitur in fermentatione, nullus etiam succus ante fermentationem inebriat, quia Spiritus effervescens, à quo omnis ebrietas proficiscitur, nondum adest,

Dices, vindemiatores dum colligunt vuas, ex comestione sola se inebriant, ergò ante fermentationem ille succus inebriat. Resp. negando consequentiam, eò ipsò enim dum ingeruntur statim incipiunt fermentari, & eò ipsò quòd fermententur, Spiritus effervescens adest.

Causa hæc semina fermentativa commovens adstruitur spiritus effervescens. Causa ergo evidens, quæ hæc semina fermentativa seu succos commover, & sæpissimè in actum deducit, est Spiritus effervescens, cujus rursus causa est, vel ipsius propria activitas, vel contagium, vel dispositio aëris, vel sanguinis & humorum perturbatio, de quibus hic obiter, fusiùs autem infra; & hæc de causa Variolarum per se spectata.

Verùm, quæ sit hujus causæ & consequenter morbi hujus ratio formalis seu modus fiendi, res paulò intricatior videtur, vulgò comparari solet effervescentiæ multi, aut cerevisiæ, (idem dic de pyris, pomis, frumento seu pane, de acidulis & aquis quibusdam mineralibus) cum in dolio depuratur, atque hoc à paritate sic deducunt: sicut enim vinum recens seu mustum in dolio spontè effervescente & ebulliendo

defz-

defacatur, & suam turbiditatem in faeces secernit, easque tam sursum quam deorsum à se propellit, quin imò, si idem mustum in dolium mucidum, aut pravâ seu viciolâ aliquâ qualitate infectum infundatur, à dolio quidem malam illam qualitatem recipit, verum dum per effervescentiam & ebullitionem depuratur, non modò se ipsum, verum etiam dolium purius reddit, nisi forsân mucus ille dolii nimius sit, ut effervescentiam impediât, sicut sæpe fit, dum vina in his vasis priùs corrumpuntur, quàm effervescant, & sic turbida potiùs maneant, cùm faeces non deponant, sordes, mucorem, lentorem, vermes, & ejusmodi corruptivas qualitates contrahunt, præsertim si etiam ambientis gradus alius sit, quàm fermentationi conveniat, uti contingit si non in cellario, sed in calore solis sales succi asservantur.

effervescen-
tiæ multi
aliisque
succis, co-
rumque
depuratio-
ni.

Modus autem fiendi hujus, talis est: nam si liquoribus istis aliquid fermenti adjicias, eorum particulae cùm sint heterogeneae & miræ activitatis, illicò per totam se diffundunt liquoris molem, crassiora & impura, quibus intricantur corpuscula variè exagitant, invicem deducunt & obvolvunt, donec effervescentiâ factâ, eadem ab intimo reliquorum consortio, ad extremam superficiem propellant.

Modus ef-
fervescen-
tiæ decla-
ratur.

Pari modo heterogenea hujus morbi semina seu particulae, sanguinem in poris partium contentum, effervescere & fermentare faciunt, ut naturæ vi foràs propulsatus, efflorescat in cute & depuretur, atque ideò omnes Variolis & Morbillis obnoxios esse, nisi mors ex alia causâ præveniat. Rationi succedit experientia, cùm enim sanguis humanus ex meris succis inebriativis, & fermentationem passis, nempe vinò, cerevisiâ, pane &c. constet, naturam fermentationis retinet, & juxta diversa temperamenta, citiùs vel tardiùs turbiditatem suam in Variolas & alia tubercula congregat, & expellit, quod in brutis non fit, quia non pascuntur rebus

Compara-
tionis ap-
plicatio.

Confirma-
tur hæc ef-
fervescen-
tia ab ex-
perientia.

fermentatis, ut homines: quemadmodum autem quædam mur-
sta inveniuntur, quæ vix sensibiliter fermentantur, sed mi-
tissimè fæces suas sensim ad fundum dolii cadere sinunt,
præsertim si aliquid Spiritûs effervescentis affundatur, is enim
omnem fermentationem citò finit, dulcificando aciditatem,
fermentationis authorem. Ità pariter quandoque, quam-
vis rarissimè homines reperiuntur, qui per totam vitam Vari-
olas non experiuntur, eò quòd ejusmodi temperamentum
nacti sint, insensibiliter turbiditatem suam segregans, vel ab
aliquo inscien-ter assumpto præcipitante (de quo plura in cu-
ratione simplici) quò à manifesta fermentatione inhi-
bitur.

Variolæ &
Morbilli
dum à ma-
lignitate
aëris pro-
ducuntur,
non fiunt
per fer-
mentatio-
nem natu-
ralem, uti
aliàs solent

Contrariò
fit si cur-
sum natu-
ræ ordina-
rium tene-
ant.

Hinc secundùm me firmum teneo, si interdum quædam
malignitas aëris, Variolas & Morbillos epidemiales producat,
quòd tunc non fiat per fermentationem naturalem, sed mo-
dum corruptivum, prout mox diximus fieri cum vino recen-
ti, vel aliis succis dolio mucido infusis, in quibus fæces non
deponunt, sed potius magis sordescunt, mucorem, lentorem,
vermes (ut infra patebit) atque similes qualitates corruptivas
contrahunt, idque ob ambientis gradum fermentationi con-
trarium, ut diximus, gradus etiam alius sit, quam fermentationi
conveniat, uti contingit, si non in cella, sed in calore so-
listales succi asservantur. Idem ergò contingere in Vari-
olis epidemicis dubium non est, ità ut infectus, impurus & na-
turalem constitutionem excedens aër, corruptivam & mali-
gnam qualitatem in corpore pariat, quam ob rem etiam ple-
rumque Pestis sequitur: At si Variolæ cursum suum ordina-
rium teneant, tunc sanguis & succus corporis, per fermenta-
tionem suas fæces extrudunt, vinumque imitantur, quod per
fermentationem spiritum acquirit effervescentem; sæculentiâ
enim corporis per Variolas expulsâ, natura humana paula-
tim incipit fieri spirituosâ, crescit enim sensim ratio, memo-
ria

ria & iudicium, ita ut demum fiant habiles ad usum mundanum, prout etiam vinum post fermentationem paulatim clarescit, & aptum fit pro potu: hinc ratio datur rursus à pari, quoniam sanguis necessarîo ex statu primo in secundum, id est, ex impuro in puriorem & defæcatum transit, sicut mustum necessarîo per defæcationem in vinum purum mutatur.

Dices, si hæc Variolarum & Morbillorum ebullitio fit, ad modum bullientis musti, ergo sequitur, sicut musti ebullitio seu effervescencia nunquam fit cum putredine, etiam altera fieri poterit, cum utriusque sit par ratio? *Resp.* Omnem similitudinem uti & hanc claudicare; imprimis quidem concedimus, fermentationem & effervescenciam hanc fieri ad modum ebullientis seu fermentantis musti, id intelligendum est cum restrictione, non in omnibus, sed in quibusdam tantum: convenit ergo, quod effervescat ad modum musti, ac differt, Imò, quod sanguinis effervescencia seu ebullitio fiat aliquando sine putredine, musti verò non, ut mox supra diximus, nam si musto accedat putredo vel corruptio, non effervescit, sed turbidum manet, nec fæces deponit, sed in alias corruptivas qualitates degenerat, & hinc effervescencia dici non potest, sed corruptio, cum non fiat per fermentationem, sed per modum corruptivum. Præterea effervescencia seu ebullitio sanguinis raro, imò nunquam fit spontè, qualis tamen plerumque fit in musto & cerevisia &c. sed à natura vi facultatis expultricis, per modum cujusdam crises, fit ista viciosorum succorum expulsio, ad quam natura à materiæ putridæ, aut quocunque modo appellare libeat, vitio vel causâ externâ incitatur.

Objectio.

In quibus
differt ef-
fervescen-
tia sangui-
nis ab illa
musti &c.
I,

Atque ut candidè dicam quid hoc in puncto verè sentiam, sciendum est, si rem strictius consideremus, & paulo alius perpendamus, magnum in hac paritate apparebit discri-

Quemodo
se habeat
miasma
Variolarū.
Adducitur
ratio.

men, nimirum, ut mox dixi, miasma Variolarum habere se quidem uti fermentum, sed corruptivum, & sanguinem non versùs perfectionem, sed versùs depravationem effervesce cogens, quod non fit in musto &c. Ratio prioris est: cum enim venenatæ hujus miasmatis particule, subjecto impinguntur, alia statim corpuscula sibi ipsis similia, & nobis connata exsuscitant, quibus associatæ, totam pervadunt sanguinis massam, eamq; insigniter turgescere & ebullire, ac post aliquale effervescentiam, in partes secedere & coagulare faciunt, scilicet, dispersa veneni semina, cruoris mixtionem solvunt, spiritus puriores statim profligant, deinde crassiores ipsius particulas sibi consciscunt, & adhæsu suo velut congelatas reddunt; portiones ita coagulata, unâ cum implexis veneni seminibus, à reliquo sanguine in circuitu ejus, inter vasorum extremitates derelictæ, cuti affiguntur: quo pacto si natura factis robusta, congelatò sanguine totum virus eliminat, reliqua cruoris massa, licet minor & pauperior facta, utcunque salubris, & vitæ prorogandæ habilis existit. Si verò cruor nimium coagulatus, hoc modo depurari nequit, vel si portiones sanguinis cum veneno coalescentes non plenè erumpunt, aut denuò intus restagnant, & sanguinis liquorem penitus corrumpunt, visceribus & imprimis cordi affixæ, eorum crassim & robur destruunt.

Quomodo
II.
differt
fermentatio
sanguinis
& musti

Differt 2da. Fermentatio vini & sanguinis, quòd in vino nulla sit veterum partium absumptio, & novarum accessio, quin liquor vase conclusus, usque idem perstet, secùs fit in sanguine, in quo partes quædam continuò perduntur, & earum locò, semper aliæ de novo generantur.

Quomodo
III.

Differt 3tia. Quod in vino cruditatis, maturationis & defæcationis tempora sint distincta, & successivè in toto
pera-

peraguntur; in sanguine autem triplex ille status eodem tempore, & per partes celebratur.

Differt 4^{to}. Quod fermentatio in vino semel incepra, usque ad finem prorogatur, in cruore autem eò usque renovari debet, quò usque humoris nutritii particulæ non congeneres reliquo liquori adaptentur, quare ad hoc opus præter fermentationem semel in sanguine inceptam, fermentis quibusdam opus est, quæ eandem aliàs destitutam aut deficientem conservent, & perficiant. Hæc autem ebullitio seu fermentatio pusillis ut plurimum, aliquando tamen adultis, & ætatis provectioris contingit, cujus ratio est, quod semper à causa aliqua externa commoveri soleant, qualis inter reliquas communissima est, certa aëris dispositio, huic morbo analogæ, unde quoque fit, ut nunc Variolæ, nunc Morbilli grassari soleant, quia nimirum illa aëris dispositio, nunc his, nunc illis sit magis analogæ: circa quod tamen benè observandum, quòd si à causa excitante & externa, v. gr. aëre in æstum deducantur, plerumque Variolæ & Morbilli fiant contagiosi, & epidemii, si verò natura solùm, à causa interna excitata & stimolata, hanc expulsionem tenter, plerumque privatim & sparsim, morborum sporadicorum modò, diverso tempore tunc hos, nunc illos infantes invadunt.

IV.

Quare ut plurimum pusillis hæc sanguinis fermentatio obveniat, datur ratio

Aëris varia dispositio est causa quòd nunc Morbilli jam verò Variolæ grassentur.

Si ab aëre procedant, sunt etiam hi affectus contagiosi & epidemii.

Aliter, nec ineptè ac breviter hanc causam explicat *Avenzoar* cum *Hippocrate de natura puerili*, hoc modo: foetum quidem purissimo ac dulcissimo sanguine nutriri, sed labem illam ab utero impuro, non secus ac vinum in dolio foetente solet contrahere, eamque ubi ex utero exclusus & robustior factus, per ingentem naturæ conatum (ut denotant deliria & febres &c.) excutere, qualiter fit buryrum ab agitato lacte, quod primà vice separatum à lacte seroso, separari amplius minime possit, quia ex ejus potentia educi non valet ulterius, unde est, quod semel tantùm homines in vita Variolis labo-

raverint, cum nempe tota deferbuit sanguinis massa, nihilque remansit ex illo fomite hæreditario, aliàs enim bis tervè laborarent homines, quod est contra *Averrhoem*: verum tamen prior sententia ejusque explicatio magis arripet, infantem quidem purissimo sanguine primis ingravidationis diebus nutrirî, non inficior, dum tamen grandior fit fœtus, impurum etiam attrahere sanguinem, certissimum est. Ex qua deinde causa, sive internâ sive externâ commovente, ut infra dicemus, accedente, hi affectus producuntur.

Hæc hætenus prolata sententia, quamvis multis fulcita rationibus, pluribus tamen infestatur argumentis in contrarium, quæ proinde ordine proponenda & refutanda, ut tanto firmiorem opinionem nostram proposuisse videamur.

Objicitur
I. contra
hætenus
prolatam
sententiã,
& probatur
fœtum
non nutrirî
impuro
sanguine.

Objicies Imò. Non videtur fœtus nutrirî sanguine impuro, sed potiùs purissimo, à quo nulla labes solidis partibus inuri potest, teste Galeno 5. *Epid. Comment. 3. tit. 73.* Et Hipp. *Lib. de natura pueri*, inquit: *trahit fœtus quod dulcissimum est ex sanguine*, unde *Galenus* dicto loco infert, *fœtus purissimo sanguine nutritur*, si enim in gravidis retentus ille sanguis, tot gravia symptomata generat, quomodo ergò innoxie fœtus eò frueretur; accedit, quod selectissimi olim & etiam moderni, ac recentiores Medici, in dubium movent, utrum fœtus in utero sanguine ejusmodi nutriatur, & partem negativam mordicitiùs defendunt. *Resp. Imò.* nutriori fœtum purissimò quidem quantum potest, & quamdiu pusillus ac tenellus est, sed eò incremente, semper impuri aliquid prolektare, aut saltem ab impura portione inquinari, sicut vasa à rebus impositis inficiuntur, ideò natura illas impuritates per cutaneas excretiones tandem cogitur secernere. *Resp.*

Respondetur. I.

II.

2. *Id.* Sanguinem quo alitur fœtus, quemque è venis allicit, purum quidem esse naturâ suâ, non nego, sed humorum qui ex utero expurgari solent, colluvie inquinari omnino assero, ut restatur

testatur Aristoteles 10. de hist. animalium; uterus, inquit, membrum ser-vile, ad ea expellenda constitutum, quibus corpus expurgari debet. Resp. 3tò. Dubium à recentioribus motum, alio loco à nobis resolvendum proponemus.

III.

Obijcies 2dò. Sæpius homines patiuntur morbos graves, simos, multas febres, in quibus ob sanguinis effervescentiam, & vena secatur, & purgationes aliâque remedia instituuntur, pro depurando corpore, quæ ergò ratio est, quòd venenum illud post multas febres, post multos morbos superatos, non fuerit quoque ex fermentatione evacuatum? Quæ præterea ratio, quòd mulieres, quæ ex menstruum suppressione laborant, iisdem malis non sint obnoxie? Resp. Imò. Non quamlibet effervescentiam Variolas procreare, sed eam tantum, quæ ex sanguinis menstrui reliquiis prodit, si enim illa sola in venis fiat simplex fermentatio, ut in Synochis febribus, nulla fient exanthemata, unde. Resp. 2dò. Quòd in suppressione menstruum, fœminæ ægrotantes Variolis non corripiantur, ratio hæc est, quia sanguis per partium substantiam non disperditur, nec malignam illis qualitatem imprimit, sed venis continetur, & ideò Variolæ non fiunt.

Obijcitur II.

Respondetur I.

Respondetur II.

Sed urgebis: Hippocrates Lib. de nat. Pueri, inquit, tres esse partes in sanguine, unam purissimam, quæ nutritur fœtus, alteram impuriorem, quæ nutritur mater, & tertiam impurissimam, quæ in venis, toto gestationis tempore, uterinis asser-vatur, & post partum per lochia expurgatur, ergò cum mater impuriori quàm fœtus nutriatur sanguine, citius æquè ac fœtus hoc malo inquinari potest. Resp. hunc Hippocratis locum minimè nobis ob stare, posito enim non concessio, matrem impuriori sanguine nutriri, ex eo tamen malè sequitur eam citius hoc malo corripi, cum alia quæ id ipsum verant, occurrant. Primò enim cum mater partes habeat duriores & solidiores, non tam facîle recipiunt impressionem, quemadmodum

Urgetur.

Respondetur ad id.

Rationes adducuntur quare

fœtus potius hoc malo, quam Miter corripiatur.

modum fœtus corpus tenellum; deinde portio illa sanguinis impurissima, quæ asservatur in venis uteri & secundinarum, toto gestationis tempore, inficit in transitu sanguinem, qui defertur per ea loca ad fœtus nutritionem, unde fœtus contrahit malam qualitatem, quæ suo tempore causa est effervescationis in sanguine fœtus, at verò portio illa impurissima, in dictis locis remanens, non inficit corpus matris, uti jam supra diximus, & rationes addidimus.

Instat.

Sed rursus instabis, vertitur sanguis menstruus in partium substantias nutritione, sed partes non patiuntur ebullitionem, aut effervescationem, ergo si in venis continetur, in iis quoque eandem patientur matres.

Respondetur ad instantiam.

Resp. non ipsas quidem partes effervescere, sed ex maligna illa qualitate, quæ ex menstrui reliquiis contraxerunt, humores & succi easdem inficiunt, qui effervescentes in cutem propelluntur, sicque partes ipsæ depurantur; sicut vasa quæ non sunt sincera, sed mucida, vinum inquinant, quod si illud effervescat, simul quoque vasa expurgantur.

Obijciunt illi.

Obijciunt 3tio. Si fiunt à sanguine menstruo, cur non statim primis mensibus & annis, quibus debilis & tenellus est infans, sed sæpè longè ob ortu, in ipsa senectute se produnt, quæ ratio est, quod tam diu sine noxa, venenosa illa substantia potuerit retineri? Antequam respondeam, sciendum, quod illæ impuritates substantialiter in corpore remaneant, ut plerique docent, ratio, quia morà longissimā corrumpere & putredinem deterrimam acquirerent, sed ab iis prava tantum quædam qualitas, partibus fœtus imprimatur, *quæ semel est imbuta recens, conservat odorem testa diu*, quæ tandem humorum partem aliquam inficiens, naturæ molestior redditur, eaque suo tempore insurgens, infectas illas humorum portiones ad cutem propellit. Unde *Resp.* ad factam objectionem, quod hi affectus modò citius, modò tardiùs

Respondetur, 1.

diùs oriantur, ideò fit, prout nimirum materia pauca fuerit vel copiosa, naturam vel parum, vel nihil irritarit, sic latet sæpe per annos plures venenum, nec nisi post longissimam temporis moram sese exerit, ut patet in rabie, in luis venereæ & elephantiacorum virulentâ labe, quæ per multos annos occultantur, idem die de Mercurio, Antimonio, Arsenico, quæ diù latent in corpore, antequàm virulentiam prodant. Ideò non semper excretio hæc statim à natura instituitur, nisi aut contagiò, aut externarum causarum vi stimuletur, ideò epidemiorum more interdum Variolæ sæviunt, ratio, quia ab aëre incitatur natura ad excretionem, quæ aliàs otiosa fuisset, vel quia materia pauca est, vel quia natura assueta est. Labes autem illa solidis partibus impressâ, si exigua sit, nec externæ causæ vi commoveatur, sensim alimentum inquinat & multiplicatur, ingravescit in corpore, donec à natura amplius ferri non possit, hincque sese tandem in virili & consistente ætate, vel planè in senectute interdum prodit, citiùs verò, si copiosior illa fuerit acriorque, ut in iis, qui pueri hos morbos patiuntur: eam autem accelerat impura victus ratio, quæ humores pravos coacervat, à quibus citiùs corpus ægrotat. *Resp. 2dò.* Et brevius, hanc quæstionem (quòd nimirum ad tempus innoxie ejusmodi affectuum semina in corporibus delitescant) esse de lana caprina, quomodo enim non rarò semina aliarum febrium, præsertim petechialium, latent: an non habemus sanguinem ità à nativitate constitutum, ut datâ occasione plures mutationes, coagulationes, fusiones subire debeat, ut paulò ante de rabie aliisque venenis dixi, & dici potest?

Sicut venena per longum tempus innoxia subinde in corpore latent: ita etiam fermentum horum malorum.

Respondetur. II.

Obijcies 4tò. Sequeretur, unumquemque his aliquando in vita corripì debere, contrarium tamen evincit experientia, cum multæ familiæ sint, quæ his affectibus nunquam obnoxie fuerunt, ità Diemerbrœeck *tract. de Variol. Cap. 3.* &

Obiectio. IV.

G

ego

Respondetur ad objectionem.

Alia responsio.

ego, in propria mea Socro & Uxore asseverare possum; neminemque his posse secundo vel tertio affici, quod experientia repugnat. *Resp.* si veritati simul & experientia standum sit, candidè fateamur, vix millesimum hanc labem effugere, nisi juvenis ex alio morbo decesserit, vel in utero matris detentus, eadem coinquinatus fuerit, ut testantur multa Authorum exempla, de quibus supra jam dictum est: Vel dicamus, quod causa Variolarum vel Morbillorum quæcunque demum illa sit, sub alio morbi genere possit prodire, capitis v. gr. tinea, scabie, pustulis, ulceribus & aliis id genus, idque exinde patet, quod, qui similibus affectibus prius tentati & multum affecti fuerunt, raro Variolis & Morbillis laborent, & licet iisdem corripiantur, longè mitius & parcius afficiantur, & vicissim, qui abundè Variolas passi sunt, à scabie & aliis ejusmodi morbis esse insontes. Hunc affectum autem non facile repetere, modò sufficiens & copiosa fuerit excretio, nec nisi ex relicto fermento, quod postea novi morbi historiam orditur; ratio, quia teste Hippocrate: *quæ in morbis relinquuntur recidivas facere consueverunt.*

Obijcietur V.

Responsio.

Obijciēs 5to. Variolæ sunt novus morbus ante Arabes vix notus, ast vitium menstrui est sempiternum. Ergo. *Resp.* Jam supra ostendimus, hunc morbum minimè recentè excitatum, sed Græcis fuisse cognitum.

Obijcietur VI.

Respondetur.

Obijciēs 6to. Variolæ fiunt vitio aëris, ut plerique tenent, & autopsiâ probant, fuisse ferme extinctos incolas Variolis, morbidi cœli vitio contingentibus. *Resp.* breviter, non negando aërem esse causam, non autem proximam & internam, sed externam & remotam, quæ internam suscitât. Seu illud fermentum, ut patet, quantumvis morbidum sit cœlum, multiq̃ue morbi ab eo pullulent, non fiunt tamen Variolæ, nisi in iis, qui hujusce labis seminaria continent, quinò dico, illos, qui ad malignam aëris qualitatem Variolarum

larum causam proximè referunt , totò cœlò aberrare , nam cum singulis annis , mensibus , diebus , puerulos hic morbus corripiat , aërem perpetuò inquinatum esse fateri cogemur , neque etiam pueros tantùm , sed etiam omnes homines ut Pestis invaderet , nec semel in vita tantùm faviret , sed quoties inquinamenti conspersus esset aër , ut cæteri pestilentes morbi.

Obijcies 7mò. Si à menstruo fierent Variolæ , quæcunque animalia menstrua habent , iis quoque forent obnoxia , ut equa , canis , asina , quod tamen nunquam fuit observatum. *Obijcitur VII.*
Resp. Bruta uti victu sinceriore & sicciore , vitam in labore degere , sicque sanguinis impuri reliquias digerere : Præterea , prædicta animalia menstruas habere purgationes et si *Aristoteles* dixerit , id tam verum est , ut inter multa millium millia vix uni contingat , parumque absit à fabula , hinc tam debili fundamento subnixæ ratio , sponte faciliè corruat. *Respondetur.*
 Sed

Dices , si menstrui sanguinis impuritas foetui communis- *Instatur.*
 cata , Variolarum causa est , quare illas non producit in ipsis mulieribus , quibus menstrua præter naturæ ordinem subsistunt , & præcipuè in iis , quibus illa toto vitæ decursu non fluxerunt , & tamen fœcundæ fuerunt sæpiusque pepererunt , quarum plurima exempla inveniuntur apud Auctores , uti referunt *Trincavellius* , *Guainerus* , *Bertinus* , *Marcellus Donatus* , *Joubertus* , *Fabritius* , & ego ipse exemplum habui in mea Cognata , quæ nunquam menstrua experta , octo filios consequenter peperit , & post octavum petechiis obiit. *Resp.* *Respondetur.*
 Quoad primum , quòd de cursu ordinario fœminæ quidem , quibus menstrua subsistunt , Variolis denuò non corripiantur , sed tamen contigisse , easdem iis sæpius fuisse correptas , quòd id autem ordinariè non contingat , non sufficit sola sanguinis materni subsistentia , sed illa certa & specifica im-
 puritas

puritas fermentativa, (de qua fusiùs alibi,) adesse oportet. Neque etiam tam facilis est impressio in solida & adulta foemina, quæ est in subtili & tenero infante, cui quævis stigmata, quasi ceræ faciliè imprimi possunt. *Resp.* ad 2dum. Licet foeminae reperiantur nunquam menstruatae, nihilominus non repugnat, quin in illarum utero miasma illud, Variolarum incitabulum, reperiri possit; experientia hoc testatur, cui standum, & non similibus parum fundatis rationibus.

Respondetur
quoad
secundum.

Obijci-
tur
VIII.

Obijciēs 8va. Natura tribus modis omnia foetus excrementa repurgat. *Primò* deponuntur ea inter duas tunicas usque ad partum; *Secundo*, statim à partu per intestina excluditur meconium; *Tertiò* & tandem per achores capitisque ulcera fit nova excretio, quæ pueri excrementa ita fecerunt, ut ab epilepsia, aliisque morbis impostero tutus maneat. *Resp.* Superesse quartam expurgandi rationem per exanthemata, nec enim prædictæ excretiones sufficiunt, siquidem membranæ foetus involventes sanguinem tantum continent, quem infans non attrahit, impurum quidem & vitiatum, sed qui tamen illum non inficit: meconio quoque non posse luem partibus conceptam educi, certum est, tum quia locus accomodatus non est, tum quia excretio exigua est, nec sufficit tandem humori vacuando. Achores etiam non universum corpus, sed solum caput expurgant, necessariò igitur menstruale vitium per corporis habitum debebat removeri. Fiunt igitur exanthemata, cum sanguis (sicut vinum in doliis fervens depuratur,) spumam suam & halitus crassiores ad cûrem demandat, etenim ex pituitosiore fieri sanguine, ostendunt symptomata, fiunt enim somnolenti, caput ingravescit, oculi tument & lachrymantur, febris non est admodum vehemens, extuberantque patulae; Morbillorum verò materia tenuior, maculas tantum inurit.

Respondetur.

Obijciēs

Objicies 9no. Si ad maternum sanguinem referenda est Variolarum causa, tunc in liberis diversis ab eadem matre prodeuntibus, necessario eodem tempore effervescere deberent, quod sæpè contrarium observatur.

Objicitur
IX.

Resp. In diversis liberorum corporibus, immutari pro singulorum temperamentorum varietate singula, sic divus Senex ait: *differre ætatem ab ætate, naturam à natura*: negare interim non volumus, hoc malum etiam frequentius in consanguineos æqualiter grassari, non quidem hæreditario jure, ut multi volunt, sed quia ut plurimum consanguinei æquali gaudent temperamento, æquali humorum motu &c. id tamen perpetuum non est.

Responde-
tur.

Hactenus factas ex antiquiori tripode objectiones, sequuntur aliæ quas Neoterici in medium proferunt.

Objicies 10mo. Ex *Helmontio*, qui etiam huic sententiæ contrariatur, & asserit, Variolarum & Morbillorum causam non esse menstruum sanguinem, rationem addit, quia tunc dum nutritur fœtus, menstruum non est; unde judicat potius illas oriri ex veneno, quò cruor inficitur, & circa stomachum, ob Archæi exorbitationem accenditur.

Sequuntur
Objectiones
Neo-
tericorum.

Resp. Helmontii auctoritatem hoc in puncto non adeò esse attendendam, quia sicut in omnibus, ita etiam in hac materia adversarius est omnium, aliorum mentes opprimit, & de sua nihil exprimit, dicit enim ex proprio ore in suo libro; *Variolas oriri ex veneno quo cruor inficitur, sed hujus veneni* (inquit) *essentia non est demonstrabilis à priori, sed per effectus proprietatem veneni mentitur*; quò fundamentò autem adstruit Author sententiam, cujus sententiæ basis mentiri est?

Helmontius probat
Sanguinem
menstruū
non esse
causam di-
storum af-
fectuum, &
sua addu-
cit.

Diemerbroëck candidè fatetur, causas Variolarum occultas esse, & à nobis explicari non posse.

Franciscus de le Boë Sylvius pariter negat, causam Va-
Sylvius an-
tecedentē
riola.

causam statu-
it in glan-
dulis rena-
libus.

Causam
proximam
dicit esse
acrimoniâ,

riolarum & Morbillorum sanguinem menstruum esse, sed il-
larum causam antecedentem in glandulis renalibus latere sta-
tuit, à causa procacitica (id est vel aëre maligno, vel alimen-
tis peculiaribus, vel terrore &c.) sæpe excitata. Causam
verò proximam attribuit vel acrimoniæ salino-lixiviosæ, vel
acrimoniæ mixtæ.

Michaelis
Lympham,

Michaelis causam proximam adstruit lympham, quovis
modò, seu vitio digestionum, seu inspiratorum, corruptam,
& in liquamen acido-salinum præter naturam transmutatam,
ejus naturam esse volatilem, cum sit contagiosum, glandulosas
quoque partes maximè occupans.

Cartesius
convenit
cum Hel-
montio.

Mercuria-
lis sangui-
nem effe-
parentum
asserit.

Adducun-
tur opinio-
nes.

Kircheri.

Lindani.

Digbæi.

et aliorum

Ettmüller-
us & Do-
laus a jun-
t

Lac esse
causam.

Cartesius cum *Helmontio* in veneno innominato subsi-
stit. *Mercurialis* à sanguine Parentum jure hæreditariò de-
ducit, ab aëris tamen vitio descendere etiam non negat. *Kir-
cherus* ad animatam putredinem refert, cui se subscribit *Lin-
danius*, qui exanthemata nil aliud esse dicit, quàm vermino-
forum effluviorum conceptacula & hospitia. *Digbæus* in
sanguine qui post partum in vasis unibilicalibus remanet,
causam hanc quærit, de qua opinione audientur infra plura.
Alii sunt qui ex repetita post semel factam conceptionem ve-
nerea libidine deducunt.

Hodierni Authores, inter quos est *Ettmüllerus* & *Dolæus*,
statuunt, esse in nobis aliquod implantatum principium, ra-
tione cujus nemo Variolas & Morbillos effugere queat, cu-
jus causam deducunt ex lacte nutritivo, tam in, quàm extra
uterum hausto ab infante, quatenus hoc, more omnium la-
cticiniorum facillimæ corruptionis, abeat in liquamen aci-
do-salinum, ut testantur foveæ, & sub visciditate sæpe diu,
imo ad plures annos in tubulis aliisque locis latent, quod post-
modum acidum aliquandiu occultatum, tandem occasione
datâ, vel ab aëre, vel contagio, vel victu &c. producta,
massæ sanguinis, per fermentum simile extrinsecus haustum,
successi-

Explicatur
quo modo
id fieri pos-
sit.

successivè quasi coagulando, tandem perniciosas febriles effervescentias excitat, donec per vasa capillaria hinc inde sub cute defixa, beneficio glandularum subcuraneorum milliarium excernatur, & ibidem sub cuticula hærendo, successivè in pustulas coacervetur, quarum succus nitroso-acidus, effervescendo ulterius mitescit, & in pus abit, quod in crustam tandem definit. Quæ sententia, uti nova, ita etiam fundata nobis videtur, nihilominus tamen ut & Veteri & Novæ sententiæ favere videamur.

Resolutis igitur hætenus objectionibus atque aliorum opinionibus, firmum manet tam juxta Veteres quam plurimos Neotericos, inter quos *Willisus*, Variolarum & Morbillorum causam continentem esse Archæum, seu facultatem expultricem irritatam, cujus causam proximam seu antecedentem esse ebullitionem, seu effervescentiam peculiarem, reliquiarum sanguinis menstrui acescentis, quæ redigendo se in actum, totam & universam sanguinis massam ebullire & effervesce facit, ubi

Veterum & Neoterico-
rum in cau-
sis Variolarum con-
venientia

Notandum Imò. Acidum adesse in Variolis, testantur foræ sæpe in facie remanentes, item ulcera maligna latè serpens, & tam internas quàm externas partes quandoque erodentia:

Notandum 2dò. Non quodvis acidum in corpore nostro peccans hic intelligendum esse, acidum enim ut sic, latum habet imperium, & multis attribui potest: nam aliud in Podagra, aliud in Epilepsia, aliud in Morbillis, aliud in Variolis concipi debet. Et licet hæc & omnia alia acida, in se ab invicem specie non differant, & ad unum genus referantur, tamen secundum magis & minùs, vel potius in modo, ita ut aliud magis fixum, aliud magis volatile, aliud hoc modo, v. gr. sapore, odore, colore, densitate, raritate &c. aliud alio modo sit constitutum. Acidum autem in Variolis est acidum

acidum falino-volatile, ut ex contagio apparet: hoc quandoque fieri corrosivum patet, ut mox diximus ex foveis &c.

Effervescentia seu ebullitio quotuplex.

Quid perfectiva seu depurativa

Quid corruptiva.

Quando solet hæc corruptiva ebullitio contingere

Notandum 3^{ti}o. Hanc ebullitionem seu effervescentiam in causis expressam, juxta doctrinam *Avicennæ*, ita & modorum duplicem esse, unam *perfectivam*, alteram *corruptivam*. *Perfectiva* seu depurativa ea est, in qua partes tantum impuriore, & excrementitiæ sanguinis putrescunt, & à natura expurgantur, ut tota massa pura postmodum relinquatur, & tunc Variolæ fiunt, quæ sine ullo medico auxilio curantur. *Corruptiva* verò est, in qua non solum partes sanguinis excrementitiæ, sed etiam ipse sanguis sincerus computrescit, unde periculosa & lethales Variolæ oriuntur, & pro majori vel minori putredine, majoris vel minoris participes, plures vel pauciores sanguinis partes occupantes, majus vel minus periculum emergit, talis effervescentia corruptiva præcipue contingit, dum epidemicè grassantur isti morbi, & à maligna aëris constitutione excitantur, à qua humorum effervescentia, & maligna putredo ducitur, unde Variolæ multæ & periculosa generari solent, quæ aliquando Pestis prodromi & nuntii esse consueverunt.

Adfertur sententia ejusdam Authoris, Variolas esse animatas assentientis.

Cum hic facta sit mentio perfectionis corruptivæ & putredinis, tempore Variolarum quandoque obtingentis; pauloque supra breviter insinuaverimus ex *Kirchero*, ob nimiam corruptionem & putredinem, in Variolis vermes & alia id genus prognerari, me quoque hoc loco non posse non meminisse, sententiæ cujusdam recentioris, asserentis, in suis *Miscellaneis curiosis medicis* §. 55. Variolas esse animatas, hoc est, esse animatum, ac innumerorum minutissimorumque adinstar Atomorum insensibilium vermiculorum pullulaginem, non absque singulari naturæ providentia (ut putat Author) productam. Subdit enim §. 58. verminosam hanc putredinem, videtur natura moliri pariter non sine intentionis benignitate,

gnitate, dum causam morbificam, & pessimi moris excrementa, alis ac pedibus velut instruere sic tentat, quò citius illa (causa nempe morbi) aufugere & ex viridario vitæ extirpari queat. Sunt ergo pustulæ, (pergit §. 59.) seu sordidæ illæ papulæ, nihil profectò aliud, quàm verminosorum effluviolum conceptacula & hospitia: Hæc animalcula seu vermiculos Author §. 69. efformat multipedes, & instruit rostellis acutissimis, atque hanc causam esse putat, cur post Variolas cicatrices & foveæ remaneant, ut videre est §. 72. Denique nè in hoc morbo aliquid imperfectum remaneat, curam aggreditur Author, suisque mordentibus animalculis dentes evelit instrumentis variis, *in promptu habeo*, inquit §. 113. *pulverem admirabilem, magisterium manuum, pulverem renovationis, magisterium roboris, margaritam bezoarticam &c.* Curationi præservationem subjungit §. 114. & 115. & *Essentiam benedicti valoris*, quæ primum ante trimestre sibi innotuit, se habere asserit, quâ Morbillos & Variolas ita præservare possit, ut ad incrementum, vigorem seu statum pervenire nequeant, imò etiam jam apparentes pustulas, unius horæ spatio abigere sciat, nullò amplius remanente morbi symptomatumque vestigiò.

Descriptio
horum ver-
miculorum
secundum
dictum Au-
thorem.

Cura Au-
thoris di-
recta ad
causam
verminosæ
putrilagi-
nis.
Præserva-
tio.

Hæc dictus Author, quæ meo judicio admodum raram, & ferè nimis curiosam physiologiam & therapiam sapiunt, non improbo quidem studiosa hæc recentiorum ingenia, dummodo non tantum ob argumenti nimiam novitatem, legentium admirationem aut incredulitatem, quin potiùs ægrotantium salutem promoverens, & practici judicii præ se ferrent firmitudinem; interim aliqua tamen sunt, quæ sine admonitione in hoc mirabili & verè novo argumento transire non possum:

Imò Quidem scitur P. Athanasium Kircherum è Soc. Quædam
JESU in suo *scrutinio de Peste* (ex quo Author suam de Va- admoni-
H riolis tiones cir-

ea dictam
hanc no-
vam sen-
tentiam
adferuntur

riolis opinionem probabiliter mutuatus est) animatam luem, animatas putredines assignasse. Scitur 2dò. Quòd intestina, hepar, cæteraque viscerum parenchymata, infinitis scatere minutissimis animalculis scripserit Kerchringius in *spicilegio Anatomico obser.* v. 93. Scitur 3tò. In sanguine etiam vermiculos, sed sine pedibus, tanquam cete in mari rubro nantes, ad pravam sanguinem hauriendum, determinasse Petrum Borellum *Cent.* 3. *obs.* 4. Scitur 4tò. Eundem Borellum *Cent.* 3. *Obs.* 55. *Cent.* 2. *obs.* 72. Zacutum Lusitanum *Praxi Med. admirabili Lib.* 3. *Obs.* 47. Joannem Rhodium, & apud hunc Horatium Augenium *Cent.* 3. *obs.* 64. Apud *Ephemerides Germ. An.* 1677. *obs.* 85. *fol.* 142. & aliis adhuc in locis, in Variolis quandoque vermiculos & habitum corporis verminosum adnotasse. Scitur demum, putrilaginem tam intra quam extra corpora viventium, eò sapissimè augeri, ut verminosa soboles exinde pullulârit perquam copiosa: Nemo tamen prudens, ut opinor, eò adduci se patietur, ut credat, in quacunque puris generatione, in quacunque Peste, in quibuscunque Variolis, sive benignis, sive malignis, mox & semper verminosa hæc effluvia nasci, multominus similia insecta in partibus & sanguine semper reperiri; nam si viscerum parenchymata minutis vermiculis naturaliter instructa esse dixeris, an non hisce vermiculis iterum sua viscera, & hæc denuò suis minutoribus vermiculis, atque sic de aliis aliisque naturaliter repleta esse, in infinitum affirmabis? aut verminosam hanc colluviem, ad solius hominis naturalem constitutionem pertinere existimabis? Et licet ope microscopii, in visceribus aut sanguine similia aliquando fuisse detecta animalcula dicant; Respondeo tamen ex particularium inspectione non esse ad universalia argumentandum. Deinde quis facile affirmaverit, an vermes microscopiis deprehensi, jam prius intra corpus ejusque sanguinem hæsitaverint? vel postea, quòd probabilius videtur, nova & facillima metamorphosi succreverint?

Quid de
hæc vermi-
nosa sen-
tentia sen-
tendum
proferatur,

Ad exper-
ientiam,
quæ talia
animalcula
microscopio depre-
hensa sunt
in corpori-
bus, re-
spondetur.

verint? sanguine scilicet per vulnus emissò, atque adeò non amplius intra conservationis suæ locum naturalem existente, suæque vitali flammâ penitus extinctâ & corruptâ.

Dicam ergò, quod mihi hac in re videtur verosimile : ego existimo, minutas ac distinctas sanguinis fibras, sero suo innatantes, & aëri expositas, sese naturaliter contrahere & dilatare, ita quidem, ut intuentium oculos facile fallant, ac vermiculorum motus imitando, curiosis & credulis inspectoribus levi negotio illudant; accedit, quòd microscopio incertum fiat in anatomia iudicium, etenim vitra nunquam ita exactè confecta esse credo, ut oculorum & specierum radios variè disjungendo, incertos objecti motus facilè non præsentent. Quòd verò concernit alterum ab Authore prolatum, an Variolæ & Morbilli, ne ad incrementum & statum perveniant, possint in principio statim, & quando adhuc in fieri sunt (prout loquitur & credit Author) cum ægrotantis salute suppressi, vel saltè, ut alii existimant ità præservari, nè unquam superveniant; videtur sanè utriusque propositionis assertio nimis liberalis; movet quidem hac de re aliquam quæstionem disertissimus Horatius Augenius *Lib. 10. de feb. Cap. 1.* sed non sine distinctione concludit, asserens, à quibusdam Variolis præservationem tutò fieri posse, à quibusdam non tutò: Nam *Variolæ* inquit, *in pestilenti constitutione invadentes, perniciosæ adeò sunt, ut quoscunque invaserint, occidant.* Ac proinde omni studio ac opere incumbere debemus, ne adveniant; neque profectò istæ, naturæ bono iudicio fiunt, sed ex aëre pestilenti, cujus summam aliquando impedire, hebetare aliquando, possumus malitiam: at verò (inquit ulterius) à benignis Variolis præservatio nequit fieri, nec si posset, esset secura, quia intrinsecam illam, à natiuitatis principio in solidis partibus contractam labem, nullum artificium emendabit, & hæc Augenius. Unde clarè colligitur, doctissimum hunc vi-

Nostre de his vermiculis opinio.

Augenius ab illis Variolis, dicit esse tutam præservationem quæ in constitutione pestilenti invadunt.

In benignis non item, & quæ bonò naturæ iudiciò fiunt.

rum in hac sua præſervatione, peſtiferum potiùs contagium, & funeſtam aëris malitiam reſpicere, quàm ipſas Variolas quâ tales, utpote quæ abſolutè præſervari non debent, nec poſſunt; Nam ut Fracaſtorius *Lib. 2. de morb. contag. Cap. 2.* rectè docet, & communis Medicorum Schola conſentit, ebullitio hæc purificatio quædam eſt ſanguinis, quâ ſanguis deſæcatur per quandam quaſi criſin à natura factam. Porro quod ſupra allegatus Author & novator addit, ſe nempe ſuâ *Effentiâ benedicti valoris* noviter à ſe reperiâ, puſtulas jam etiam apparentes intra horam abigere poſſe, nullò amplius remanente puſtularum, morbi ac ſymptomatum veſtigio, utique meo judicio inter miracula chymica (quæ apud doctos portenta, apud vulgum mendacia ſonant) ſcribenda res eſt; nam mirum profeſſo, ni dicam ridiculum, roſtratos & multipedes vermiculos, tam ſubitaneâ metamorphoſi in papiliones abire, & illicò avolare: ſed relinquamus iſthæc iis, quibus ſolummodò Author §. 57. ſe locutum fuiſſe proteſtatur, altioris ſapientiæ, vel inſipientiæ filiis. Hæc interim per parentheſin, ſed nunc rurfus ad rem noſtram; Igitur

Duplex
in ſanguine
reperi-
tur excre-
mentum:
ex uno,
nempe
crasso Va-
riolæ, ex
altero &
tenui Mor-
billi ſunt.

Ratio cur
modò Va-
riolæ, nunc
Morbilli
graſſentur,

Notandum 4^{to}. In omni ſanguinis maſſa duplex reperi-
ri excrementum, unum craſſum, alterum verò tenue, ex craſ-
ſo Variolæ, ex tenui verò Morbilli generantur. Et licet ea-
dem & una ſit hæc prava & maligna qualitas, utrumque excre-
mentum inſiciens, attramen diverſa eſt utriusque excremen-
ti natura, diverſa etiam eſt cauſæ externæ ad utrumque analo-
gia, unde fit, ut aliquando Variolæ, aliquando Morbilli po-
pulariter graſſentur.

Notandum 5^{to}. *Cauſas mediatas*, quæ rurfus ſupradictam
ebullitionem, ſeu efferveſcentiam ſanguinis excitant, etiam
eſſe plures, eaſque vel internas, vel externas. Inter internas,
eſt *conſtitutio corporis calida & humida*, intellige *immoderata*,
nam

nam aliàs vita nostra in calido & humido consistit temperamento: *habitus nimium tener*, aut *nimium obesus*, *etas puerilis & juvenilis*, sicut enim pueri magis obnoxii, quia sanguine ichoribus ex maximo calore abundant, facultates naturales habent robustiores, unde scribit Plinius magis eos tentari Peste quàm senes, quod & alii quam plurimi Auctores etiam contestantur: Rationes autem hujus variæ dari possunt; primò, quia sanguine multo, multùm humido ac minùs còsto abundant: secundò, lac & alia potulenta fermentativa plurimùm hauriunt, nec ferè unquam saturantur, hinc multos accervant fermentantes & pravos humores, ob ingluviem, assumendorum ordinem præposterum, vitiosa nempe alimenta bonis præferendo. *Ætate* autem provecti minùs afficiuntur exanthematis, tùm quia minùs validam habent excretionem, tùm quia temporis diuturnitate, vitium illud sanguinis partibus impactum, per insensibilem transpirationem diminuerunt, vel absumpserunt: Quòd si tamen eos affici contingat, periculosiùs ægrotant, quia maxima & tenax illa causa est, quæ tam diu in corpore delicit.

Causæ mediæ su-
pradictam
ebullitionem exci-
tantes sunt
plures.
Internæ.

Hic obiter *Objicies* contra allatam Neotericorum, præsertim *Ettmülleri*, sententiam, & dices: Plures adulti, imò senes afficiuntur Variolis, qui nullò amplius lacteò alimentò utuntur & nutriuntur, ergò hæc sententia non subsistit. *Resp.* Licèt antecedens totum verum sit, verum etiam tandem est, quòd in adultis & senibus depravata victus ratio, materiam talem sive nutrimentum circulantibus humoribus asferre possit, quod singulari advecto æthere, Variolis aptam materiam tam suppeditare, quàm in aliis aliter dispositis febri ardenti, aut malignæ absque talibus exanthematibus, ansam ministrare capax sit. Nescio an ineptè an curiosè *Rhasem* scripissè dicam, dum pueros magis quàm puellas obnoxios esse dixit: ego, quantum opinor, supersticiosam omninò hanc esse, & minùs

Objection
contra al-
latam Ett-
mülleri
sententiam

Uterque
sexus (cò-
tra 'Rhasè')
æqualiter

hoc malo
solet affici.

minùs fundatam propositionem, patet experientiâ, quæ ostendit pariter sexum utrumque affici, nec facile sit observare, puellas minùs quam pueros hoc malo interire, vixque ulla sit puella, quæ illud effugiat. Politicam tamen si quis desiderat rationem, ea dari potest, quòd puellæ ob conservandæ speciei formam magis timeant, & ideo etiam cautiùs contagia effugiant.

Causæ externæ quæ ebullitionem sanguinis efficiunt, enumerantur. Imò. Aër excessivè calidus & humidus.

Causæ externæ seu procatacricæ sunt, quæ in sanguine effervescentiam, seu ebullitionem, & corruptelam efficiunt. Aër sive manifestâ, sive occultâ qualitate sanguinem exagitat, calidus & humidus excessivè, sub quo perniciosæ Variolæ concitantur. Dixi excessivè, quia si Aër calidus & humidus est temperatè, utpote in quo vita nostra consistit, vitiosus non est, quin imò summè salutaris existit, si verò in his qualitatibus excedit, summè periculosus est, & putredini generandæ aptissimus, quia teste Aristotele, putredo in calido & humido consistit.

addo Tempus vernum & autumnale.

Secundò, *Constitutio austrina, Tempus vernum & autumnale, Regio calida & humida. Avicennas Ver magis obnoxium, Rhases verò Autumnum magis proclivem esse scribit, quæ differentia meò judicio inutilis est, siquidem quolibet anni tempore grassari observatum fuit, interdum ferociùs autumno quam vere, interdum ipsâ hyeme magis quam aliis anni temporibus. Rhasis tamen sententiæ, si quis hoc in puncto favere vellet, explicanda sic foret, posito enim, quòd in autumno plerumque grassentur, id tamen non fit ex nativa autumnæ siccitate, quæ, ut diximus, non ita apta est, ut humiditas, sed potiùs propter austrinam ejus constitutionem, ad relictos ab ætate calidos humores accedentem, unde est, quod in vere, ob naturalem ejus constitutionem, Variolæ non sint tam perniciosæ, omnes enim morbi autumnales (juxta illud: *vel longi vel mortales*) nimirum ob mixtam melancholicam*

Quare Variolæ autumnales

licam dispositionem, habent quandam pertinaciam, & fixi magis esse consueverunt.

sint periculosiores
vernalibus,
3tò. Viò 9
prævus.

Præ cæteris ad hæc facit *Vitium prævus*, è quo scilicet tale vitium latitans in corpore excitatur, promovetur, & in actum deducitur, ex hac ipsa causa quoque accidit, ut idem homo bis vel ter his affectibus corripiatur: cujus ratio est, quòd licet illa labe in utero contracta, à natura plurima ex parte discussa sit, adeò ut minimam, si quæ remansit, portionem, natura insensibili transpiratione facile discutere possit, fieri tamen potest, ut à simili causa (accedente præsertim æris quoque vitiò) humores eodem modo iterum corrumpantur.

qui pariter est causa, quòd idem homo his sæpius corripiatur,

Ad hæc quoque faciunt *Exercitia immoderata & intempestiva*, vehementiori cum motu & calore, Variolarum fermentum facillimè in actum deducuntia.

4tò. Exercitia nimia

Nec minus tribuitur *Contagio*, tùm per fomitem, tùm ad distans, vitiato aëre ex anhelitu ægri, quo modo malum in alios postmodum serpit.

5tò. Contagium.

Præstant idipsum *Balnea & Laconica*, præ cæteris autem omnibus, *usus vini meracioris, ciborum calidorum, pinguium, dulcium, corruptorum, lactis &c.* hinc rusticorum infantes late vefcentes, citiùs & faciliùs Variolis laborant, ex hoc enim plurimùm generantur ichores, Variolis vehicula promouentia.

6tò. Balnea, usus vini meracioris, ciborum calidorum, pinguium &c.

Hic obiter *quæres*, quomodo intelligendus sit Galeni locus 3. de *symptomatum causis* 2. tunc fieri proventum exanthematum, quando abundant ichores, ergò maximè hydropici Variolis & Exanthematibus laborare debent. *Resp.* licet Mercurialis *Lib. 1. de Morb. puer*: id ad Variolas applicet, ego tamen probabilìus existimo, hanc Galeni mentem non esse, sed per exanthemata illum intelligere rubicunda illa tubercula, quæ in facie & toto corpore, guttæ rosaceæ, & vulgò unga-

Quæstio de Galeni loco.

Responsio.

rii

ri dictæ, non absimilia, dum nimirum Urinæ non satis fluunt, pullulant. Verum quidem est, dum adsunt Variolæ, multos adesse simul humores serofos, sed è contra dici non potest, ubi sunt humores serofi, ibi esse Variolas.

7mò. O.
omnia quæ
humoribus
efferve-
scentiam
conciliant.

Denique inter causas recenferi possunt, *omnia quæcunque effervescentiam seu ebullitionem humoribus & succis conciliare possunt*, fieri enim per ebullitionem humorum Variolas & Morbillos, clarè ostendunt symptomata, & quæ concomitantur & consequuntur, utpote calor & febris intensa, color extensivè ruber, fitis, capitis dolor, delirium &c. quæ omnia sanguinis ferventis sunt indicia.

Queritur
cur nunc
Morbilli,
jam Variolæ,
grassentur,
cum
unam ean-
demque
causam ha-
beant, &c.
Respondetur.

*Queri hic solet, cum, ut supra dictum, vitium sanguinis materni causa sit communis, tam Variolarum quam Morbillo-
rum, quomodo fiat, ut nunc Variolæ nunc Morbilli appareant & grassentur? Resp. id fieri, ut supra jam dictum.
Imò. Propter variam humorum constitutionem: præterea non esse semper idem vitium & labem, quam infantes in utero contrahunt; tandem fit, ut eadem quidem sit sanguinis constitutio, causarum tamen sanguinem corrumpentium actione, aliqua diversitas induci possit; accedit, quod (ut diximus) varii sint corruptionis humorum termini.*

Helmontii
quid de
causa à no-
bis relata
sentiat.

Tandem, cum de causis horum affectuum in præfenti tam enucleatè disseramus, visum mihi est, nullo modo prætereundum esse cavillatorem medicorum *Helmontium*, quidnam ille suo plastico conceptu atque hac in materia statuat? ille, ut in omnibus aliis, ita & in hoc universæ Medicorum sectæ contrariatur, negatque omnes hæcenus allatas causas, & præcipuè eam, quam de sanguine menstruo attulimus, quia tunc (inquit ille, ut supra jam dictum est) cum nutritur foetus, menstruum non est, asserit ergò: *Variolas & Morbillos exsurgere ex veneno, quo cruor inficitur*
hæc

hæc autem Veneni essentia non est demonstrabilis à priori, sed per effectus proprietatem veneni metimur, Variolarum itaque morbus, prima Archæi exorbitatio est, dum enim aër ambiens endemium noxium quid spirat, tum Archæus noster, qui celerimè ab ambiente affici potest, impatiens fit auræ malignæ, fabricat in se peculiare virus, quod tales in se habet proprietates. Primo, ut sit humanæ speciei proprium; Secundo, natura facile est prona ad fabricandum illud. Tertiò, accenditur circa stomachum, ambiens enim ad stomachi convexum, per ipsum diaphragma transit, ut in illis videre est; qui cadaver secantes, odorem cadaveris (ô quanta anatomicæ feritatis dimensio) sumptò cibò manifestè è stomacho eructantur. Quartò, partes veneno obsessas potius à se versùs superficiem pellit. Quinto, officinæ fabricantes, quod ex Archæis, postquam semel senserunt tyrannidem, magnà præcautione illius generationem præpediunt. Hinc liquet, quòd, etsi endemicum fiat malum, illud tamen velut causa occasionalis, nisi approximatum Archæo humano, nocere non possit; si verò Archæus ab eo irriteretur, tunc parit exanthroses, & intus ab illo fabricantur venena.

Ipsius causæ proprietates.

Dicit præterea, principalem indicationem in Variolis esse sedationem Archæi, quæ habetur per arcana, (sed quæ bone vir) reliqua autem remedia fallibilia sunt, unde ex defectu horum, quamplurimi infantes crudeliter jugulantur, Medicis in vicem disceptantibus. Cæterum, inquit ultra, si quis remediis sedativis caret, hæc agendorum jubet ratio, naturam, quæ in Archæo consistit, non lacessere ad majora mala: unde primò, quando infans vel puer incipit tristari de calore aliquali & siti extraordinaria, de dolore dorsi, ventris sentit nasi pruritum, pondus totius corporis, ruborem faciei, pandiculationem, raucedinem, sputum crassum, cordis palpitationem & alia id genus, præcipuè si Variolas grassari inaudiat, tunc signa sunt intus fabricari venenum. Igitur statim nè major Archæi irritatio ex ambiente

Indicationes secundùm Helmontii causam.

Quomodo in defectu arcæorum suorum procedendum.

Quoad aë-
rem, cibum
Potum.

Excreta &
retenta.

Quare ve-
næ sectio-
nem ad-
mittat.

Si Medicus
sedativum
Archæi nō
habeat
quid agen-
dum, juxta
Helmont.

fiat, arcendi sunt infantes ab externo aëre, cibis paretur ut vires conserventur, velut sunt juscula, pulli, cremor bordei, potus sit aqua passularum cum semine feniculi; si verò dicta symptomata augentur, tunc paretur pulvis Alexipharmacus; si alvus adstricta, parentur suppositoria & clysteres, dicit enim, nihil in hoc morbo magis nocere quàm fetorem stercoris detenti, aërem crassum, nec non calorem hypocausti excalescenti, prius, inquit, non facit ad expulsionem materiæ morbificæ, posterioris maiorem Archæi furorem excitat. In nullo libentius phlebotomiam admittit, quàm in hoc, in scæminis plethoricis, Archæus enim viscerum non ita gliscere potest, abundantia sanguinis oppressus, & si ille rebellis fiat, deponit furoris ideas in cruorem, propter quas fit ebullitio, nam fermentum exoticum fuscitatur, exinde sanguinis quantitas major efficitur, ut videre est in omphacio, si enim vas nimium repletum foret, & omphacium ebulliret, tunc exitum debet habere, vel vas dissiliet; sic ebullitio cruore, vasa majora dilatantur, hinc dolor dorsi vehementissimus in patiente excitatur. Si qui Medicorum sedativum Archæi non habent, saltem non intermittere debent removere impedimenta, ut natura deonerata, id est, Archæus in impeditus, incumbat morbo, id est, in se redeat & resipiscat, atque tartarò ad superficiem expulso, de furore remittat.

Hæc sunt verba pura Helmontii, multa quidem, sed pauca ad caput, carpit alios in suis, & in suis captus relinquitur, in morborum entitatibus & causis à nobis discrepat, in cæteris verò nolens volens nobiscum tenet; ea tandem, quæ pro arcanis venditat, nobis sunt obvia & luce meridianâ clariora; scire igitur illius fundamenta abs re quidem non est, ea verò sequi, hominis est non fundati.



CAPUT

CAPUT VI.

De Signis Diagnosticis & Prognosticis
Variolarum & Morbillorum, eorumque brevi-
ter annexis Causis.

Praesentes Variolas & Morbillos dignoscere non est diffi-
 le, futuras tamen, ut docet *Fracastorius*, antequam erum-
 pant, difficillimum, nulla enim habent signa pathognomoni-
 ca, quæ aliis morbis non sint communia, de quibus videri
 potest, *Tractatus de febribus in genere*: hinc hodiernâ die,
 maximè in eo taxantur & corripuntur à vulgo Medici, & ma-
 gni arguuntur peccari, quòd Variolas & Morbillos non sta-
 tim ab initio cognoscant, prout in Potentissimo Ferdinando
 V. Romanorum Rege electo & formato, Variolis An. 1654.
 Mense Julio extincto, Medici ab initio non pro Variolis, sed
 pro febre tertiana habentes, pravis symptomatibus, deliriis,
 tremoribus &c. stipata, cura pessima cessit. Nè verò quid
 simile contingat aliis Practicis, antequam signa quædam pro-
 babilia, cognoscendi hoc genus morbi proponam, generale hoc
 præceptum, semper & bene esse præ oculis & ore habendum,
 ut, si Medicum ad ægrum vocari contingat, & minima, vel ab
 ætate, tempore, modò, more, regione, stellatione &c. de-
 sumpta suspicio sit, sedulò mox inquirat, num Variolis vel
 Morbillis nondum laboraverit, an cum infectis conversatus
 fuerit, vel hoc modo affectos aspexerit, & inde terrorem
 conceperit?

Signa di-
gnostica.Futuras
Variolas:
aut Morbil-
los difficil-
limum est
cognosce-
re.Præcepta
à Medico
quoad Va-
riolas ge-
nerale ob-
servandum

Signa itaque, quæ suspicionem aliqualem illarum præ-
 bent, sunt sequentia, quorum singulis suas causas annectemus,
 & quo apparatu in corpore nostro excitare solent, eorum
 rationes præponuntur.

rationes & fiendi modos, tùm Veterum tùm Recentiorum libris excerptos, explicabimus. Saluberrimum tamen est, firmum & certum iudicium de iis, cum doctissimo *Sylvio* usque ad tertium diem suspendere.

Signum
primum.

Unde calor
in Vari-
antibus
oriatur,

Signum Imum. Si eâ tempestate grassentur, tuncque quis febricitet, vel cum infectis conversetur, calorque in toto corpore acris & mordax sentiatur, qui calor à nimia sanguinis effervescencia, ejusque in corde accensione dependet: etenim pars sulphurea seu oleosa sanguinis exaltata, & fervorem concipiens, proportionem plus solitâ in corde accenditur, quare deflagratione suâ, caloris effluvia per totum corpus copiosè diffundit; nam quando sulphur minùs dissolvitur, ac in corde accenditur, ut in Pica Virginum, & Leucophlegmatia, calor in toto deficit. In febre autem, quando nimis exardescit sulphur, ætus superabundat, nam calor non tantùm ab actuali sulphuris inflammatione aut ignitione dependet, verùm sine igne in mixtis quam plurimis, ubi particule sulphureo-salinæ, aut in fermento acido-salino seu acri corrosivo latitantes, corrosione dissolvuntur, aut ob ventilationis defectum, densius agglomerantur, calor intensus excitatur, sicut cùm ferrum à spiritu quovis acido minerali corroditur, vel cùm butyro antimonii Spiritus Nitri superfunditur, calor igneus cum fumo producitur; pariter cùm finus madidè repositus à ventilatione prohibetur, summè incalescit. Sic eadem profus ratio est, cur sanguis supra modum exardescat in febribus, nimirum sulphuris particule nimis exaltatæ & effertæ factæ, densius agglomerantur in vasis, & plus dissolvuntur & acceduntur à fermento cordis, & sic mixtionis vinculo solutæ & ubivis expansæ, calorem circumquaque diffundunt.

Signum
secundum.

Signum 2dum. Adest dorsi & lumborum dolor, quia vena cava ascendens perrepat dorsi regionem, in qua sanguis ef-

fervescit & ebullit, malignos & acres vapores ad nervos & membranas transmittit, unde distensio & dolor, præcipuè in dictis partibus; id ipsum etiam in Arteria magna contingere, dubitet nemo.

Cur in Variolantibus dolor dorsi percipitur.

Signum 3tium. Dolor itidem capitis, oculorum, totiusque corporis, præcipuè, ut modo diximus, dorsi & lumborum, cum annexa anxietate & gravitate, atque febre continua (id est: mit einen unnaehlässlichen Fieber darben) à plethora venas majores infestante, & sanguinis, vi fermenti acido-salini, vel sulphureo corrosivi, ebullitione, nec non vaporum, caput, præcipuè ejus meninges, dictasque partes petentium, acredine, unde vellicatio & dolor, etenim sanguis impetuosè commotus, propter arteriæ magnæ directionem, majori copiâ ad caput, quàm ad partes infernas deferetur, quippe transitus è cordis sinu rectus est in caput, ex eodem in membra inferiora obliquus, quare cum cerebri membranæ sint valde sensiles, ibidemque sanguis in cursu rapido sistatur ac reverberetur, nil mirum, si immanes cephalalgæ in febribus existentur. Interdum tamen similes etiam cephalalgæ seu dolores, præter impetuosum sanguinis affluxum, ob succum nervosum (qui à sanguine æstuante jam suppeditatur) nimis acrem & pungitivum; quare cum ab eodem membranæ & nervosæ partes irrigantur, acrimoniâ ejus vellicatæ, in dolores aguntur.

Signum tertium.

Unde capitis & oculorum dolor.

Dixi supra, præcipuè dorsi & lumborum, quòd æquè ab eadem dicta causâ fieri, vulgò discurrunt Medici, quæ tamen ratio Neotericis non adeò autentica videtur, cum non constet, cur non æquè in aliis partibus propter similem vasorum distensionem, eadem molestia inferatur, & quare in Variolis potius, quàm in causone & aliis febribus, ubi sanguis plus effervesceat, ejusmodi dolores dorsi & lumborum ingravescant; quin imò observare licet, insignes modò in capite,

Neoterici allacæ de dolore dorsi causæ non assentiuntur & dant hujus rationem.

Neoterico-
rum opi-
nio de illi-
doloris
causa,

modò in lumbis cruciatus urgere, quando sanguine parum turgescente, vasa minimè ampliantur, scilicet in morbi principio, quando febrilis intemperies nondum conspicua est, dum ægroti adhuc foris obambulant, & stomacho valent, Variolæ ingruentes primò hisce doloribus se produnt: Quare videtur Recentioribus, potiùs in nervoso genere hujusmodi constitutionis causam subsistere, scilicet in cerebro & spinali medullâ, propter membranas & partes nervosas, à veneni particulis fermentantibus acido-salinis, vel acri-corrosivis vellicatas, istos dolores oriri; nam verisimile est, quòd innata Variolarum semina, in partibus spermaticis potissimum recondantur, & quòd primum miasmatis contagium, plerumque cerebrum corripit: hinc in succo, quò cerebrum & partes nervosæ, præsertim spinalis medulla, irrigantur, primam effervescentiam concitari, & exinde cruoris massæ labem communicari, quare incipiente hòc morbo, frequentes epilepsie contingunt, caput & lumbi dolore atroci urgentur, postea venenò in sanguinem translatò, effervescentia febrilis in toto concitatur. Somnus solitò fit gravior & inquietus, insomnia de fulminibus, igne & flammis, evigilationes cum terrore, ex præfatis causis. Gravitas autem seu lassitudo totius corporis fit, ob vasa cruore ebulliente distenta, etiam musculosa caro sanguine & copioso halitu plurimùm infarcitur, & ad motum fit plurimùm inaccommoda, veluti qui anasarca laborant habent actus minùs expeditos, propter serosi humoris copiam. Præterea in febribus ob sanguinis phlogosin, succus qui nervoso generi suppeditatur, à debita temperie dehiscit, ut sit actuandis corporibus minùs idoneus.

Unde gra-
vitas & las-
situs cor-
poris?

Signum
quartum.
Unde pro-
veniat nasi
& oculorū
pruritus,

Signum 4tum. Nasi & oculorum pruritus, & subinde planè hæmorrhagia, propter sanguinis & vaporum acrium ad nares anatromen, aut illarum venarum læsionem, à vicio fermenti sæpiùs allegato dependentem.

Signum

Signum 5tum. Sternutatio frequens, & incurvatio nasi, ob eandem causam. *Signum quintum.*

Signum 6tum. Faciei & oculorum rubor, splendor ac tumor, ob sanguinis fermentati vel vaporum acrim, salinarum exhalationum, sublimationem. *Signum sextum, & quæ causa hujus.*

Signum 7tum. Timores & terrores, inquietudines & interruptiones in somno, propter ascensum vaporum acido-salforum ad caput. *Signum septimum, & unde oritur.*

Signum 8tum. Punctionis & ardoris in universo corpore sensus, ex materia copiosa acris & salina, quærente exitum ad exteriora, transmissa. *Signum Octavum, & ejus causa.*

Quæres, cur pariter non fiat rigor saltem in Morbillis, quos humor biliosus & acris ex prædominio adjunctus parit? expulsio enim humoris acris per membranas sensiles, rigores parere solet? *Resp.* facilem ad hoc quæsitum dari resolutionem, quia nimirum non putredine solâ, sed occultâ qualitate isti humores peccant, unde sicut in febre maligna rigores non concitantur, ita nec hic, ob eandem rationem. *Cur in Morbillis non fiant rigores? Respondetur ad quæsitum.*

Signum 9num. Lachrymæ involuntariæ seu oculi aquei, ex vaporibus acris & salis, è capite in oculos stillantibus. *Signum Nonum, & ejus causa.*

Signum 10num. Pandiculatio, seu tensio frequens totius corporis (ein stetes Dehnen des Leibs) ex vaporibus sulphureo-salinis, musculos totius corporis afficientibus. *Signum Decimum, Unde oritur.*

Signum 11num. Cordis palpitatio vel tremor, ab ebullientis sanguinis vaporibus crassis & copiosis, ab acido fixiori dependentibus, liberum transitum præcludentibus. *Signum Undecim. Unde.*

Signum 12num. Anhelitus compressio, & difficultas spirandi, à sanguinis thoracem opprimentis & comprimentis, liberumque aëri frigido attrahendo viam præcludentis copiâ, vel austerâ aciditatis dotati qualitate. *Signum Duodecimum, Quomodo id contin-*

Signum gat.

Signum
Decimum
tertium,
cum causa.

Signum 13um. Oscitatio immoderata, ob vapores à viciato fermento ortos, musculos oris & vicinarum partium ferientes.

Signum
Decimum
quartum
cum sua
causa &
origine.

Signum 14um. Tussis sicca, & raucedo & pectoris dolor, partim ab acredine & corrosione humorum & vaporum, in partibus spiritualibus ebullientibus, & asperam arteriam transeuntibus, partim à pustulis ibidem fervescentibus, partim à læso id est croso pulmone, resultat.

Signum
Decimum
quintum
à qua causa
fiat.

Signum 15um. Præcordiorum æstus, ob sanguinem copiosè in cordis foco accensum, qui exinde cum magna partium sulphurearum exardescencia, in pulmonibus ebullit, quare quò propior est hæc regio isti caloris foco, eò majori percellitur incendio.

Signum
Decimum
sextum
unde.

Signum 16um. Sputum crassum, à nimio calore & materiæ quantitate, vi fermenti vitiati exortum, & ejusdem copiosis particulis sulphureis productum.

Signum
Decimum
septimum,
cujus simul
causæ pro-
ponuntur.
Datur alia
causa.

Signum 17um. Siccitas, linguæ & faucium orisque asperitas, ariditas, albedo, exsiccatio & inflammatio &c. ab exhalationibus sulphureo-salinis, calidis & acris ebullientis, seu effervescentis in corde sanguinis exoriuntur; vel etiam ob particulas materiæ febrilis acres & acidas, ventriculo à sanguine inter circulandum affixas, quæ quidem elui desiderant, non secus ac alimenta falsa & piperata uberius comesta, aut etiam acria ore & gutture volutata; hujusmodi enim affectus, liberiores potius ingestionem suggerit: lingua verò albescit, id est amurcæ quædam albæ accrescunt, quotiescunque humiditas illa (quæ plurimâ naturaliter imbuta est) exaruit, & decoquitur, ad eoque exterior linguæ cutis à calore elixatur, hinc quoque scabra evadit, quòd etiam in sanis cernitur, si quando linguam jussulo, vel alio sorbili præfervido aduri contingit, pariter etiam, cum linguæ animalium ad mensarum usum elixantur, earum cutis alba & aspera

Unde lin-
guæ aridi-
tas & albe-
do prove-
niat in Va-
rioli.

aspera evadit: sive enim saliva è glandulis maxillaribus (ut ex recentissimo ac Doctissimo *Watsono* innouit) sive ductibus salivalibus, ut Recentioribus libuit, sive alius quispiam humor ex tonsillis, aut aliunde proliciat; quia tamen ob siccitatem nimiam & calorem incrascescit, & visciditatem induit, etiam tunc quoque linguæ tunica exterior albicat, imò & mucosò quodam lentore obducitur, nimirum, quia humor iste præ crassitie linguam oblinire aliquantulum potest, diluere autem & humectare eandem non potest. Si verò accidat, linguam humore bilioso vel introrsum suffundi, vel extrinsecus tingi (ut in vomitibus pycrocolis usu venit) cum villi ejus utpote spongiosi, flavum virus imbibentes, colorem quoque similem exhibent. Quòd si tamen calor adeò intensus fiat, ut sanguinem adurat, ignemque solito ardentior efficiat, sequitur, ut è cordis foco per pulmonum spiracula, vix tanto incendio ventilando sufficientia, fuligines suscitentur, quæ ad palati fornicem allisæ, linguam quasi reverberio feriunt, & nigredine tingunt. Istiusmodi autem nigredo, (ut reliqua linguæ inquinamenta) in interioribus ejus partibus magis conspicua est, quia nimirum exteriores ambitus, frequentiori ad gingivas & palatum attritu desergentur.

Signum 18^{um}. Delirium & animi Perturbatio, Phrenitis & Convulsio, ex maligno humore, ob sulphureo-salinas particulas impetum facientes, cerebrum & nervosum genus feriente, adeòque motus inordinatos in cerebro concitante, quandoque etiam à succo nerveo degenerari, & spirituum animalium regimini improporcionato oriuntur, sæpissimè autem hujusmodi symptomata febribus ingravescent, ob materiæ febrilis è cruoris sinu in has partes metastasi, nam sanguis recrementis adustis à deflagratione residuis satur, ea (velut mustum effervescent) subigere, & consortio suo excludere nititur.

*Signum
Decimum
octavum.
ex quo
fonte illud
dimanet.*

Epilepsia
propter
diversas
causas ob-
venit.

titur, quæ cum fluore oborto, per sudorem, urinam aut hæ-
morrhagiam expellere nequit, sæpe in cerebri substantiam
transfert, ibidemque ea affigit: utque hinc potissimum præ-
dicti affectus, quando fixi & firmiter radicati sunt, originem
trahunt, cum autem leviores & facile mobiles sint, à causis,
prius citatis non raro prodeunt. Motus verò convulsivi seu
Epilepsia, quæ in his febribus frequentissimè, propter causas
diversas contingunt, quandoque ob materiam in primis viis
congestam, quæ insigni pravitate suâ partes ibidem mem-
branosas vellicat, & deinde consensu nervosi generis, statim
spasmus nervoso generi, seu illorum origini in cerebro com-
municatur, & exinde in partes modò has, modò illas re-
torquetur, quâ ratione etiam lumbrici in intestinis scatentes,
humores acres commoti, & pharmaca deleteria, convul-
siones inducunt, vel etiam à malignitate his affectibus fami-
liari, (ut in Variolis, Morbillis, aut Peste & Petechiis fre-
quenter accidit) quia scilicet sanguis à temperie benigna &
naturali, in deleteriam & venenatam alteratur, quâ nervi
eorumque principia percelluntur, & in spasmos aguntur. Non
raro etiam absque malignitatis suspitione in febre putridâ,
propter materiæ febrilis metastasin ad cerebrum, ut mox di-
ximus, hi motus inducuntur; itâ observavi ego, & mecum
alii, quando morbus crisi non statim solvitur, ægroti longâ
ægritudine decumbunt, & motibus convulsivis & tremulis
fiunt obnoxii, id quod etiam in iis affectibus febrilibus, qui
ad mortem terminantur, plerumque contingere solet, sunt-
que tales motus convulsivi tristes lethi prænuntii, quod ac-
cidere puto non tantum à materiæ malignitate, quâ nervo-
sum genus vellicatur & percellitur, sed quia spiritus plurimum
exhausti & debilitati, non satis inflant & distendunt nervo-
rum corpora, quare à solita densitate & motu tonico relaxa-
ta, debiliiori utcumque spirituum nixu in motum inordina-
tum agitantur.

Uc

Ut ut autem sit, Doctissimus Sydenham de febris sect. 3. cap. 2. De Variolis regularibus, inquit motus epilepticos in infantibus, esse quasi evidens signum Variolas in promptu esse, modo infantes dentitione jam sumptos corripuerint, hos motus prognostico fidem conciliare & auctoritatem, ita, ut si forte infans insultum epilepticum sub vesperum, quod fieri solet, patiat, Variolæ insequente aurorâ in conspectum se dabunt, & quod sæpius observatum est, quæ Variolæ infantes statim ab hujusmodi paroxysmis aggrediuntur, pustulas emittunt magnitudinis conspicuæ, mites enim sunt atque boni moris & rarissime confluent.

Signum 19num. Syncope animique deliquia, & Cardialgia, ex humore itidem sulphureo-salino, malignifante os ventriculi, vel ipsum cor feriente, vel ob perturbatum sanguinis motum, nec non æqualem ejus mixtionem à fermento venenato solvi inceptam, cruor in corde stagnare, ut in circuitu suo præpediri, aptus, syncopen, anxietatem & inquietudinem infert. Alii sunt, qui prædictos affectus, syncopen, cardialgiam & animi deliquia (idem dicendum mox de vomitu & nausæâ) plurimis quidem modis fieri posse in Variolis, potissimum verò ob has tres rationes sequentes. Primò, ore ventriculi superiore affectò, quæ pars, cum sit multiplici nervorum plexu intertexta, sit valde sensibilis, & quia ab eodem sexti paris ramo, ad cor atque ad ventriculum nervorum surculi derivantur, si ventriculi orificium ita nervis confutum, magnâ molestiâ afficiatur, etiam cordi communicatur noxa, & in ipso aut sistitur motus, aut saltem inordinatus concitatur, quò æqualis spirituum & sanguinis affluxus interrumpitur; hoc autem fieri solet, cum ab humore acri & amaricante, aut etiam acido & corrosivo obsidentur: *Novi quendam inquit Willisius in febre acuta cerebrâ syncope correptum, qui tamen affectus, postquam lumbricum longum & teretem vomitu rejecit, omnino cessavit.* Secundò etiam similes

Motus Epileptici sunt signa futurarum Variolarum.

Signum Decimum Nonum; quo proveniat.

Aliæ rationes prædictorum affectuum, 1.

III. affectus inducuntur, dum venenata materia in sanguine circulator, quæ spiritus vitales repente figit & extinguit, ipsumque sanguinem congelat, ut in corde stagnare cogatur. Tertio accidere solent, ob rariorem spirituum texturam, qui cum teneri & valdè subtiles sint, motu & dolore quovis immodico facillè exsolvuntur; ita novi quosdam, qui in lecto compositi, satis bene se habuerant, sed in hanc vel illam partem commoti, statim animo defecerunt.

Signum Vigelum cum explanatione proventis

Signum 20. Vomitus immanis & Nausea in ventriculo, materia ex malis vaporibus provenit; vel ut NéotERICI tenent, vomitus talis, licet ventriculus impurâ humorum saburrâ vacuus & liber sit, sæpissimè hunc affectum comitatur, quando semina fermentativa in motum concita, arteriolis in ventriculi tunicas dehiscuntibus, ad singulos sanguinis appulsus deponuntur, & vomitum, non secus ac Scibii seu Antimonii particulæ deglutitæ concitant, postea tamen, quamprimum diaphoresi procuratâ, venenum extra propellitur, symptoma hoc cessat, & sine quavis expurgatione noxiæ materiæ, ægri rursum stomacho valent. Nec ineptè, imò clariùs quis discurreret, dicendo, Vomitus, Nauseam & Inappetentiam ab iisdem causis excitari, à quibus mox Syncopen, Cardialgiam &c. oriri diximus, nimirum, ventriculò materia extranea obsessò, & ad spasmus irritatò: talis excrementitia materia, quatuor modis in ventriculo congeritur. Imò, Aut enim alimenta, partim ob defectum acidi fermenti, quò ritè concoqui deberent, partim ob calorem ventriculi adurentem, in talem putrilaginem exassantur. 2do. Aut hujusmodi materia ex arteriis in ventriculum terminatis in cavitatem ejus deponitur, id quod etiam non tantum in his affectibus, sed & Peste & Febribus malignis observatur. 3tio. Aut merabilis, è meatu cholidocho in jejunum intestinum expressa, propter motum inversum & convulsivum istius intestini, in ventriculum

Alia explicatio quomodo hi affectus Ventriculi fiant. Materia talis quatuor modis in ventriculo colligitur.

I.
II.

III.

lum suffunditur. 4to. Denique hujusmodi ventriculi affectiones aliquando oriuntur, à materia excrementitia, diu ante febrem in primis viis congestâ, quæ non rarò ipsarum Variolarum causâ occasionalis existit, interdum verò hi affectus sunt immediata febris producta, cum enim pridie ægrotationis affecti facis stomacho valuerunt, quamprimum immodica sanguinis effervescencia inducitur, dum iste supra modum ebullit, tùm effluvia & recrementa exterioris evaporari solita, dum humor biliosus è vasis cholidochis exundans, ventriculo suffunduntur, quibus ipsius crasis evertitur, etiam chyli reliquæ aliæque in visceribus contenta insigniter depravantur, unde prædicti affectus originem ducunt; quodsi verò continuus sit Vomitus, ventriculum à simili jam materia læsum & ulcerarum ostendit. Præterea observavi in praxi, in Variolarum eruptione vomituritiones potentiores, fuisse prodromum Variolarum confluentium, & non discretarum.

Vomitus potentiores in Variolarum eruptione, observatū est, subsecutas fuisse Variolas confluentes. Signum Viginti primum cum suis causis.

Signum 21. Tormina ventris, Diarrhæa & Dysenteria, ab acri salina seu corrosiva & copiosa materia tunicas intestinalium vellicante, laniante & lædente, talis est, (ut plurimum) aut à bile è vasis cholidochis in duodenum exsudente, aut à sanguinis & succi nervosi vel pancreatici recrementis, ex arteriis & ductu pancreatis ad intestina suffusis: singuli prædicti humores, præsertim verò biliosus, quando in copia suppeditantur, cum massa euchyma residua non rarò fermentescunt, ut eadem spumosa rarefactione intumescens, intestina irriter, & in excretionis motum stimulet: quandoque etiam circa morbi statum, & in declinatione ejus, diarrhæa concitatur, & sic vel naturâ victrice, crassiora sanguinis purgamenta hoc modo criticè excernuntur, vel eadem succumbente, viscerum omninò viribus & firmo tenore exsolutorum, alvi fluor effectus & signum est. De dysenteria quod attinet, ab iisdem prorsus, potentioribus tamen causis concitatur.

Illa dysenteria quæ quandoque in Variolis &c. frequens est, unde procedat? *tari solet.* Præterea tamen notandum, quòd dysenteria in febribus continuis & Variolis, adeò frequens sit affectus, ut quibusdam annis epidemicus evadat, & Peste non mitior, plurimos interimat: hujus causâ esse solet, non humor aliquis intus in visceribus productus, qui acrimoniâ suâ intestina corrodit, (ut nonnulli putant) sed miasma quoddam sanguini impressum, adeoque intimè ipsi confusum, ut sub vaporis aut humoris sinceri forma, à cruore divelli nequeat, quare versùs intestina propulsum, arteriarum oscula referat, ulcusculâ & sanguinis exsudationes illic facit, velut cùm à sanguine febrili, cutem versùs efflorescente, pustulæ & plegmones exterius erumpunt; verisimile autem est, quòd affectus illi dysenterici, qui febres malignas aut epidemicas, ita & Variolas &c. comitantur, à sanguinis aciditate austero-salina oriuntur, de qua fusiùs suo loco. Ubi verò acrimonia abest calor verò tantò intensior, tunc ex defectu humidi, summa contingit alvi constipatio, adeò, ut non nisi pharmaco proritata, minimè solvatur, licet ægri per plures dies liquida tantùm ingesserint, nihilominus dejectiones solidæ, & duriusculæ consistentiæ observentur, ob dictam mox rationem; parte enim subtiliore per caloris excessum absumptâ, & crassiore in intestinis relictâ, velut caput mortuum à destillatione residuum inspissatur.

Unde summa alvi constipatio proventu habeat,

Viridia in infantibus excrementa unde?

Nota, quòd in Infantibus sæpissimè appareant excrementa viridia, quæ partim corruptioni assumptorum, partim debilitati ventriculi & intestinorum, à voracitate & ingurgitatione nimia infantum, ortum suum agnoscunt. Quæ tamen meo judicio excrementa viracidia, à flavis non nisi majori cruditate distant, unde frigida illa intemperies vel sola sufficere potest, ad excrementa talia generanda, & assumptos cibos corrumpendos, ea autem intemperies rursus oritur, à voracitate infantum, unde multum tenacis humoris generatur, qui calorem ventriculi obruit.

Signum

Signum 22. Manuum & Pedum tremor , ab effervescen-
tis acido falsuginosis sanguinis fuliginibus , ad exteriores ar-
tus translatis, excitatur.

*Signum
Vigessimū
secundum.*

Signum 23. Symptomatum & signorum in Variolis &
Morbillis (prout de febribus in genere diximus) agmen clau-
dar, Pulsus & Urina, quibus præcipuè attenditur, pro digno-
scendis tum morbi statu, tum ægri viribus ; cum enim duo
sint, quibus vita nostra innititur, scilicet calor in corde resi-
dens, & coctio in visceribus & vasis peragenda; ratio ratio-
nis, quoniam Pulsus & Urina alterationes, in utrisque à febre
inductas, optimè ostendunt, ideò hic affectus in mortem aut
salutem cessuri, certissimum desumitur crite-
rion. Non arbi-
tror hic necessarium, de his fusè agere, aut singulas utriusque
causas & differentias recensere, satis erit de iis præcipua an-
notasse, quæ in decursu Variolarum & Morbillorum conside-
ratione digna occurrunt.

*Signum Vi-
gesimum
tertium,
ex Pulsu &
Urina.*

Et primùm consulitur *Pulsus*, vel ut constitutum à natura
certius indicium, ut exinde mensurentur, calor in febre ac-
census, qui si intensior fuerit, & magnam sanguinis ebullitio-
nem concitet, arteria vehementius & citatiùs vibratur, quam-
diu spiritus vigore pollent, deinde ipsis paulò exhaustis, vali-
dior Pulsus remittit, quod tamen celeritate compensatur, &
fit celer & parvus. Si febris sit mitior, & minori incendio
tumultuetur, etiam Pulsus à naturali statu minùs deflectit, &
in toto morbi decursu, cujus moderatio, naturæ inducias de-
notat. Nec tantùm Pulsus febris, veluti hostis, copias pro-
dit, sed & naturæ robur, & resistendi valorem planè osten-
dit, quamdiu Pulsus est laudabilis, res in vado est, & spem
optimam exhibet, sed ex malo ejus statu, pessimum inferitur
omen, & salutis desperatio, adeò ut sine crebro & diligen-
ti Pulsus examine, Medicus nec prognosticari ritè possit, nec
pharma-

*Pulsus est
mensura
caloris fe-
brilis.*

*Pulsus ve-
hemens
vires inte-
gras deno-
tat.*

*Celer &
parvus re-
missus.
Explicatio
ulterior si-
gnorum ex
pulsu sum-
ptorum.
Medicus
nihil præ-*

flare poterit absque accurata Pulsus cognitione, nec in prognosi, nec medicamentorum exhibitione & probatur quoad prognosin. Oportet præscire cuiusque naturam Pulsus, nam variat etiam iuxta morbi tempora. Sequuntur plura ex Pulsu sumenda indicia.

Si sani Pulsus habent debilem, si febre correpti illum quoque exilem si habent non adeò malum, & quo in casu. *pharmaciam* tutò instituere; Pulsus enim est nuncius qui non mentitur, modò malignitatem exceperis.

Quod primum attinet scilicet *prognosticon*, (licet id magis propriè ad prognostica spectet, ob rei tamen combinationem, & faciliorem subsequentiū captum, hoc loco inserere per parenthesis placuit) innotescat oportet, qualis sit cuiusque Pulsus iuxta naturalem constitutionem, his enim fortior, illis debilior existit, deinde in singulis febrium momentis, perpendendum est, quibus gradibus à naturali statu distet, modò enim à debito vehementior, arguit febrem intendi, modò infra solitum deprimitur, & denotat spiritus & vires dejici. Quibus sanis arteria debiliter & languide pulsât, eos febre correptos, Pulsus habere exilem & debilem non adeò malum est, ut statim de salute desperemus. Quibus Pulsus à natura fortis & vehemens est, si à mala crisi vix mediocri pollet vigore, licet non sit omninò debilis, ægrotantis rem suspectam & minimè tutam arguit; si ab initio febris, prius quàm sanguis deflagravit, vel si factâ crisi, cum pars oneris detrahatur, aut si alio tempore, sine causâ evidenti, Pulsus debilior evadat, malum porrendit; si verò post magnas evacuationes, aut longas vigilias paulò debilior sit Pulsus, non ideò de salute conclamatum erit, quia vires his modis dejectæ aut labefactæ, poterunt denuò restaurari, & spiritus refici; quando Pulsus subitò in deterius alteratur, licet æger se ad cætera symptomata melius habere visus sit, triste mortis prognosticum edicere, & viceversâ; licet horrenda urgeant symptomata, Pulsus tamen sit laudabilis, adhuc salutem sperare liceat. Si in viro robusto febricitante, Pulsus valde exilis & formicans evadat, mors in proquinquo est.

Probatur pulsus cognitionem esse quo-

Quoad secundum, scilicet *in exhibendis medicamentis*, cautiones & regulæ non levis momenti à Pulsu desumuntur; purgatio enim & vomitus, prohibentur à Pulsu nimis molli & violento,

violento, etiam ab humili & depresso, quia dum sanguis nimium effervesceat, evacuatio parum conducit, & quod noxiū est, minimè secernitur, imò à tali perturbatione facta vires plus debilitantur & dejectionur. Cum verò spiritus sint fracti, & vires dejectæ, pharmacia eos magis posternit, & quandoq; penitus exsolvit, quia nimirum afflicto additur afflictio; quare cum Medicus evacuationem infra vel supra meditatur, prius Pulsum exploret, & hoc opus solummodo aggrediatur, cum natura est fortis & sedata, ut unà medicamenti operationi vacare, & viribus possit sufficere.

que necessarium pro exhibendis medicamentis.

Quali in Pulsu liceat evacuationem supra vel infra celebrare?

Nec minori circumspectione opus est in *cardiacis* & *diaphoreticis*, quæ, si in febrili paroxysmo exhibentur, cordis motum prius violentum nimis intendunt, & sæpius ejus robur infringunt, etiam cum Pulsus valde languidus sit; si cardiaca valida & calidiora adhibeantur, (ut cum ex illis flamma fortioris spiritus afflatu urgetur) facile vita extinguitur, quare vulgaris observatio est, quod cardiaca non raro mortem accelerent, eò quod cruorem nimis exagitando, vires citius atterant.

Quando cardiacis & diaphoreticis utendum?

Cur cardiaca, & quali in casu mortem accelerent?

Adhuc majori opus est cautela, & Pulsus directione, in exhibendis *Narcoticis*: hæc enim, (quia spiritus vitales nimis feroces extinguendo & figendo opus suum perficiunt) si in Pulsu debili aut vacillante, usurpentur, spiritus vitales diminuendo, eos morbo omnino impares reddunt, aut eos nimium suffocando, somnum perpetuum accersunt: quare in Pulsu languido, inæquali & formicante, eane pejus & angue videntur opiata.

Exhibendo opiata, etiam necesse est Pulsum observare.

Pulsus inæqualis & intermittens ex Medicorum scriptis pessimè audit, attamen pravæ licet sit notæ, non tamen sicut Pulsus debilis tam cerò mortem portendit; novi enim plures cum ejusmodi signis, licet sepulchro damnatos, tamen evasisse, quippe multò certius & facilius spirituum & sanguinis

Pulsus inæqualis & intermittens, non est tam periculosus, ac debilis.

nis inordinatio compesci aut sedari poterit, quàm eorum dejectio restaurari.

Urinarum
inspectio
in Variolis
&c. maxi-
mi est mo-
menti.
Rationes.

Quod *Urinæ* attinet, certum est, Urinarum inspectio-
nem in febribus, ita & Variolis & Morbillis, præ cæteris fe-
bre omnibus morbis plus habere certitudinis, & maximi esse
momenti: hinc enim ægri & morbi status optimè cognoscun-
tur, & Medici indicationes circa agenda meliùs diriguntur.
Quæ super hac re vulgò prostant observationes & regulæ,
adeò multæ sunt, ut singulas enumerare, penè infiniti esset o-
peris, tædii & laboris; præcipua itaque hic annotasse sufficiat.
Circa Urinas Variolantium, Morbillantium & Febricitantium
præcipuè advertenda sunt: *color*, *consistentia*, *contenta* &
subsidentia.

In Urinis
Variolan-
tium &c.
attenden-
dum præ-
cipuè ad
colorem,
consisten-
tiam, con-
tenta &
subsiden-
tiam. Quid
Urinæ co-
lor rubi-
cundus in-
dicet, &
quæ ejus
causa?
Quare qui-
dam levi-
ter febrilen-
tes, summè
tinctam,
alii gravi-
ter, mini-
mè tinctam
habeant
Urinam?

Color Urinæ indicat modum aut excessum caloris in
sanguine, qui prout augetur vel remissiùs se habet, etiam
urina plus aut minus rubicunda existit, cujus causa est ebul-
litio, seu effervescencia, cruori à febre inducta, propter quam
particulæ Salis & Sulfuris invicem commixtæ, & Aquæ inco-
ctæ, humoribus & solidis partibus antè insitæ, plus dissolvun-
tur & sero incoquantur, eique rubedinem impertiunt, uti Sal
Tartar. & Sulfuris mista, & aquæ incocta, liquori rubedinem
saturatam imponunt: contingit non rarò, ut quorundam
Urinæ summè rubescant, licet parum vel leviter febricitent,
& è contra aliorum æstu febrili laborantium Urinæ sint mi-
nus coloratæ. Qui calore vegeto & sanguine præservido ab-
undant, aut scorbutico, phthisi, & gravibus obstructionibus sunt
obnoxii, cum à frigore suscepto πυκνός, crapulâ aut vini
potu, febriculâ tentantur, Urinam intensè rubicundam red-
dunt, eò, quod Salis & Sulfuris particulæ in eorum sanguine
exaltatæ, & priùs semi-solutæ existerunt, quare necesse est, ut
febre urgente sero plus incoquantur. E contra qui intempe-
rie frigidâ, cum pulsu debili & imbecilli, præditi sunt, febre
correpti,

correpti, cum majori sanguinis effervescencia, Urinam minus coloratam excernunt. Haftenus tamen quasi pro comperto habetur, Urinam albam cum sedimento fufuraceo, aut praesentes, aut mox adfuturas Variolas & Morbillos indicare.

Urinarum consistentia, contenta & subsidentia, velut in eodem filo posita, simul dependent à materia adusta & excrementitiâ, quæ à deflagratione febrili in sanguine residua est, cujus si copia adfuerit, Urinæ consistentia non nihil spissior evadit, & postquam steterit, à frigore turbatur; si autem hujus sit, minor quantitas, aut aliò, quam ad renes derivatur, (nimirum si vel sudore, vel critica in hanc vel illam partem metastasi avocetur) consistentia fit tenuior, & liquor clarus persistit. Etiam hujus materiæ particulae Urinæ contenta elargiuntur, quæ se diversimodè habent, juxta quod vel succus nutritivus à sanguine non nihil coquitur & assimilatur, modò omnino pervertitur, & in putrilaginem facessit. Concoctionis & assimilationis signa exhibent in Urinis Variolantium & Morbillantium modò hypostasis, seu subsidentia laudabilis, modò saltem ejusdem vestigia & rudimenta. Concoctionem viciatam è contra denotant hypostaseos privatio, & partium Urinæ confusio & perturbatio. Prout autem hæc materia plus vel minus in sanguine assatur, contenta sunt modò pallidi, modò rufi coloris, pro ratione, quâ excrementa sanguini confusa, vel spiritu præpollente, subigi & secerni incipiunt, vel eodem nimis depressò, separari minus queunt: hinc contenta Urinæ plus aut minus, citius aut tardius à reliquo liquore secerni, & versus fundum subsidere solent.

Quoad *Prognostica* ab Urina desumenda, annotamus, quòd Urinæ color non nihil remissior, consistentia mediocris, contenta pauciora, sponte subsidentia, aut facile in nubeculam collecta, bonum portendant. E contra intensus, consi-

Urinam albam cum sedimento fufuraceo plerumque sequuntur Variolæ. Unde Urinæ consistentia, contenta &c. dependent? Urinæ spissæ unde? Unde tenuiores? Ex quibus desumantur signa concoctionis in Urinis Variolantium? Signa viciatæ concoctionis, Unde contenta modò pallidi, modò rufi coloris? Unde proveniant contenta pauca vel multa, citius vel tardius apparentia? Quæ Urinæ sint bonæ prognostice?

Quæ ma-
læ.

Quando
Urinæ sa-
norum si-
miles in
Variolis
sunt bonæ.
Quando
malæ.

Quando
catharsis
possit ha-
bere locū
in Variolis

stercaria spissâ & turbida, contenta crassiora & opaca, quæ tardè aut vix omninò in fundum subsident, effervescantiam magnam, materiæ adustæ copiam, ejusque subactionem & secretionem difficilem aut frustratam denotant; hinc quando in Variolantibus Urinæ sanorum similes sunt, id fit, quia natura mineram morbificæ materiæ ad peripheriam, seu circumferentiam corporis propellit: & si hoc ob dictam causam accidat, nil mali sperandum. Quòd si autem Urinæ tales sint, & symptomatum malignitatisque adsit congeries, parum aut nihil boni sperandum: denotat enim, naturam succumbere morbo, concoctioni aut expulsionì superfedere, & tandem infallibile mortis periculum instare. Verùm si Urinæ turbidæ, à vehementi humorum ebullitione, agitatione & perturbatione excitantur, quoad directiones pharmaceuticas, id est, circa exhibenda medicamenta, res in hoc cardine versatur, ut crebrâ Urinarum inspectione, naturæ motum attendamus, eidemque obsequamur, nec catharsi movendum, nisi cum debita hypostasis in Urinis concoctionis & separationis signa exhibeat. De his, quæ ad Pulsus & Urinas spectant, fusiùs videantur Authorum Institutiones.

Signum
Vigessimū
quartum.
Prognosis
à partibus
oris inter-
nis, mate-
riâ viscosâ
alicante
& coobdu-
ctis.
Causæ hu-
jus viscosæ
crustæ se-
cundum
alios.

Signum 24. Quandoque in febribus, præsertim autem Variolantium & Morbillantium (ac præsertim circa earum declinationes) contingit, linguam, palatum, gingivas, imò totius oris & gutturis cavitatem, materiâ viscosâ albicante, velut crustâ quâdam obliniri, quæ sæpius deterfa repullulat, & nisi diligenter & fricando, & colluendo os universim, crustosâ hæc materia sæpius abstergatur, suffocationis periculum ægri non rarò subeunt. Sicut autem hic affectus in infantibus recens natis frequentissimè excitatur (solent enim pleurumque inter 14. dies effervescentiâ externâ, cum maculis latis & rubris per totam cutim suffundi) ita quòd si hæc ruboris suffusio minùs liberè erumpit, aut debitò citiùs evanesceat,

scit, ut plurimum crusta hæc albicans in partibus oris succedit.

Hoc symptoma, quando hoc ritu Infantes molestat, vicio lactis adscribi solet, utpote quod acre nimis affectionem oris ulcerosam inducat. In Variolantibus & febricitantibus idem vaporibus crassis & fuliginosis, à ventriculo elatis, vulgariter attribuitur, quamvis mihi verosimilius videatur, in utrisque hunc affectum à totius sanguinis & humorum circulantium impuritatibus oriri; etenim quotiescunque aliquid extraneum dictis humoribus intimè confusum continetur, quod nec sudore sic diffusibile, nec per Urinas faciliè demandetur, illud sæpissimè cum serosa colluvie circa os desigitur; unde affectus ecatarrhales, tumores & sputationes molestæ excitantur. Cùm enim pro masticatione ciborum humor salivialis hic loci ubertim suffundi debeat, per patentes, & hæcæ assuetas excretionis vias natura sæpè, quod superfluum est, aut aliàs molestum, foràs amandare nititur.

Secundum
Nos,
Ejus fieri
modus,

Hinc à Mercurio exhibitò, cùm & cruor & succus nervosus particulis ejus minutissimè divisus abundè infarciuntur, easq; sero involutas excernere moliuntur, idq; verò per sudorem, Urinam, aut aliam viam, Mercurialia hæc corpuscula confusa exterminare non queant, quod reliquum est, per arterias aliosque ductus, qui salivam ori suppeditant, eadem seroso latice obvoluta expellere nititur. Pariter etiam in febribus, cùm à longiori sanguinis deflagratione materia adusta plurimum congeritur, cujus nonnulla pars post crisin residua adhuc cruori & succo nervoso affunditur, aut cerebro aliove loco defixa, ab iisdem denuò resorbetur. Probabile est, quod ista materia, diurnâ coctione perassetur adeò, ut ferè glutinis instar crassescat: quare nec sudore, nec transpiratione insensibili diffusibilis, nec per vias Urinarias secerni habilis, sed demum arteriolicæ, aliisque salivæ ductibus, in palatum dehiscens, utpote

Quare illa
materia
non per
alias vias
expellatur
hujusmodi

lentoris in-
crustatio-
nem cau-
san?

usitatâ excretionis viâ) sensim exsudet, ut protinus præ crassitie suâ in lentorem istum concreseat. Eadem ratio tenet de infantibus, quorum sanguis à sudoribus in utero contractis, impurior factus, statim efflorescentiâ exterius factâ, depurari satagit, quæ si ob materiæ crassitiem haud ritè succedat, statim hæc veluti patentiori impuritates viscosæ exterminantur. Novi quendam in declinatione febris, cui non solum huiusmodi lentoris incrustatio in partibus oris successit, verum salivatio copiosa, velut ab assumpto Mercurio, cum foetore anhelitus, item lingux & gingivarum intumescentiâ, per plures dies ciebatur.

Signum vi-
genum
quintum.

Quomodo
possit co-
gnosci, an
Variolæ,
an verò
Morbilli
sint futuri

Signum 25. Post prædicta signa, aut sæpius etiam cum iis, circa tertiam aut quartam diem apparent in facie & toto corpore prius cutis asperitas, ab exanthematum in superficie corporis proventu & eruptione, mox parvæ pustulæ, granorum milii similes, aut saltem rubræ maculæ, quæ semper & continuò crescunt, in magnitudine & numero multiplicantur, quæ si (NB.) in *altitudinem* crescant & eleventur, sunt *Variolæ*, si in *latitudinem*, sunt *Morbilli*.

Et hæc sunt *Signa* imminentium Variolarum & Morbillorum *diagnostica*, quæ tamen, ut diximus, non sunt necessaria, quia simul singula fere omnia seorsim in aliis febribus contingere possunt, sanguinisq; tantum fervorem indicant, cui necessariò exanthemata non succedunt.

Signa præ-
sentium
Variolarum.

Desumun-
tur autem
1. ab actio-
nibus læsis

Signa autem præsentium Variolarum & Morbillorum cum sensibus pateant, non aliis signis indigent, eademque, ne notum per se explicatione reddamus ignotius, plura non dicimus, illa ex tribus capitibus (ut paucis dicamus omnia) desumi: Imò. ab actionibus læsis: 2do. ab exeuntibus, seu excrementis immutatis: 3tio. ab affectibus præter naturam. Ex actionibus læsis est delirium, insomnia terrificæ, & dolores capi-
tis,

sis, gutturis, dorsi, pectoris, lumborum, tremor &c. Ab excrementibus mutatis sunt lachrymæ involuntariæ, Urina sanorum similis, constipatio, vel laxatio alvi nimia. Ab affectibus præter naturam est febris, tubercula exigua &c.

Signa differentiarum Variolarum à Morbillis, Morbillorum à maculis purpureis, & similibus affectibus, abundè jam fuere suprà propofita.

Signa causarum quod attinet, imprimis ab ipso sanguine propriè dicto, nullæ videntur fieri Variolæ & Morbilli, quia ipse sanguis per se vitiosus non est; humor autem, qui Variolas excitat, plurimum excrementitius est: qualis autem sit humor, faciliè juxta Veteres indicat color: à bile enim cum flavedine rubescunt, & acredinis sensum majorem exhibent: à pituita, colorem album habent, ac sanicliquidiorè abundant: ab humore Melancholico nigricante, & cum siccitate, magis sordescunt, imò nonnunquam violaceæ, virides, lividæ aut nigræ sunt, prout scilicet humores magis corrupti & exusti sunt. Præterea notandum, si veritati Veterum studeamus, quòd si materia sit biliosa & tenuis, minor quidem est dorsi dolor & gravitas, sed major ardor, inquietudo, & ris. Si verò materia sit crassa, minor quidem est pruritus & ardor, major autem corporis gravitas.

Signa locorum, & partium, quæ ab iis obsidentur, jam in prædictis etiam sufficienter explicata reperiuntur.

Signa, quibus dignoscatur, utrum aliquis nunquam amplius Variolis & Morbillis sit corripiendus, (diximus enim quosdam semel, quosdam sæpius illis affici) proposuit mihi quondam Venerabilis quædam Domicella, cæteroquin fæmina non imprudens, tanquam pro verissimâ (fæmineâ tamen, quantum reor utique labili) experienciâ affirmans: *Variolas*, inquit

II. Ab excrementis immutatis.
III. Ab affectibus præter naturam.
Signa differentiarum.

Signa Causarum. A sanguine propriè dicto non fiunt Variolæ.
Quomodo noscantur esse à bile juxta Veteres.
Quomodo à pituita.
Quomodo ab humore Melancholico.
Quomodo præterea juxta Veteres potest nosci ex quali humore fiant?
Quomodo possit cognosci, si quis Variolis semel correptus, non amplius iis corripiatur.

Aliorum opinio de Signis, quod Variolæ non sint reditura.

inquit, plerumque redire, nisi ita erumpant, ut & plantas pedum occupent; ad quod signum licet ego & forsitan alii mecum exactè nunquam attenderint; illud tamen non credidi, carere omni probabilitate: nam plantas pedum simul esse affectas, signum esse videtur, quod naturæ variolosa hæc crisis planè perfecta fuerit, omni scilicet materiâ expulsâ, etiam ad loca à vitalibus distantissima. Alii sunt, qui credunt, si præcesserint Morbilli, ac subsequantur Variolæ, non faciliè iterum Variolis affici homines, secus si præcesserint Variolæ, ac subsequantur Morbilli; attamen & in hoc contrarium sæpe sæpius, præsertim hóc currente annò, observatum est.

Signa Prognostica.

Signa Prognostica. Maximi, ut diximus, esse momenti, imminentes Variolas prævidere; multò tamen majoris erit, earum eventum, sive bonum sive malum, salutis aut mortis, recte Hippocrate 2. *Aphor.* 19. prædicere, quem tamen sequentia signa indicabunt. Priùs verò notandum *in genere*, nos hic solùm loqui de Variolis & Morbillis ordinariis, quæ ab intrinseco nativo principio pullulant, nulli ferè mortalium parcentes; non autem de Variolis & Morbillis, quæ in pestilenti aëris constitutione invadunt, quæ omnes ut plurimum perniciosæ sunt, & ob maxima incendia, ardentissimas febres & insignem putredinem secum vehunt, sæpeq; intestina, fauces, pulmones, vehementissimè excruciant. Notandum 2^{do} *in genere* Variolas & Morbillos ratione regionis & provinciæ esse magis vel minùs periculosos. Sic Morbillos in Italia, & Hispania periculosiores esse, quàm Variolas, refert *Mercatus*; in Germania verò experimur magna ex parte contrarium, ubi ex Morbillis pauci admodum, vel nulli moriuntur; ex Variolis verò multi. Rationem hujus reddere non est difficile: nam cùm materia Morbillorum ex bilioso, tenuiore, fervidiore, volatilioreque constet sanguine & sero, quod ostendit color flavescens,

De qualibet Variolis & Morbillis hic sermo fit? dum de eorum Prognosi agimus. Prognosis horum affectuum ratione regionis & provinciæ variat. Ratio hujus diversitatis, cur nempe in

vescens, eruptio celer, pruritus major, resolutio seu evanescencia citra suppurationem citissima, consequens porro erit, ut in regione calidiore hæc Morbillorum materia sit etiam sincerior, atque adeò exinde natæ febres sint acutiores & periculosiores, quàm in Germania, ubi ob climatum diversitatem volatilis hæc sanguinis pars per Morbillos ad ambitum corporis detrusa, plerumque phlegmate aliquo Teutonico demulcetur ac obtunditur, ac proinde nec febrem tam acutam & periculosam producit. Variolas quod attinet, materia illarum sanguinea quidem est, sed crassior, copiosior, & veluti fex ac putrilago sanguinis, & hæc sanè materia, cum in Germania, ob victus rationem multò ampliore & lautiore, majori plerumq; copiâ, quàm in Italia & Hispania in ægrotis exuperet, mirum non erit, si illa apud Germanos sæpius ægrotantium viscera, & corporis superficiem insuperabili multitudine obruat, ac præter pravitatem copiâ præcipuè opprimat, præsertim imbecilles ac cacoehymicos ad putredinè dispositos; in Italia & Hispania è contra pluribus è Variolis evadentibus, cum materia Variolarum non tam sincera, tamq; fervida sit & acuta, quàm in illorum Morbillis, ac demum non tam copiosa, quàm in Germaniæ Variolis, uti dictum, existat. Notandum in genere 3tio. Si vere aut æstate prodeant Variolæ, eadem æstate solent disparere maculæ; si verò autumnii tempore fiant, totâ fere hyeme perdurare, ac subsequenti æstate demum evanescere consueverunt.

Notandum in specie Imò. Variolas & Morbillos inter morbos acutos recenseri posse, quia ut plurimum intra paucos dies, & quidem cum periculo ex vehementi motu & symptomatibus (adeò ut morbus statim vigorem seu statum attigisse videatur, qui sunt Morborum acutorum characteres) hi tumores accidunt, pro quo

Italia &c.
Morbilli
periculosi.

Cur è contra in Germania Variolæ periculosiores.

Variolæ, quæ in ætate aut æstate prodeunt, earum maculæ citò disparerunt, in autumno non item.

Variolæ & Morbilli inter morbos acutos recensentur.

M

Notan-

Motus criticus alius bonus, alius malus est.

Notandum 2^{do}. Non obstat, quod motum est supra, esse crisin seu motum criticum, quia alius est motus criticus bonus, alius malus, id est, alius ad salutem, alius ad mortem, ut ipsa sonat crisco natura & definitio.

Duplex à quibusdam statuitur Variolarum & Morbillorum tempus, nimirum ebullitionis & eruptionis. Alii tertium addunt suppurationis. Ab aliis quadruplex.

Quot diebus terminetur tempus ebullitionis? Qui dies sit principium earum eruptionis, qui status, qui declinatio? Quibus mediis etibus Variolarum tempus percurrant. Variolarum discretarum

Notandum 3^{to}. Quòd duplex temporum series à nonnullis ingeniosè statuatur, quæ temporum series Medicis, ut verà & securà methodo curent, observatu summè necessaria est, tempus nimirum *ebullitionis* & tempus *eruptionis* Variolarum & Morbillorum. Alii triplex Variolarum tempus, & quidem doctè statuunt; principium tempus *ebullitionis*, alterum *eruptionis* vel apparitionis, tertium *suppurationis*: alii quadruplex tempus *ebullitionis* seu effervescentiæ, tempus *eruptionis*, tempus *augmentationis*, tempus *suppurationis*. Tempus ebullitionis quatuor ut plurimum, nisi aliud obstat, diebus perficitur, ita ut primus dies principium, secundus augmentum, tertius status, quartus declinatio statuatur, clapsò enim quartò, febris & potiora symptomata remittere solent, unde

Notandum 4^{to}. Quòd principium exitus, id est, eruptionis Variolarum, sit ipsemet quartus dies, augmentum septimus, status undecimus, declinatio decimus quartus, quo tempore Variolarum exsiccantur & decidunt; quamvis non rarò ad vigesimum usque diem Variolarum exsiccatio protrahatur, ut videre est in *Ephemer. Germ. An. 1672. Obs. 84. fol. 141*. Quò autem natura est robustior, quò materia subtilior, quò cutis porosior; quò viæ interiores patientiores, per quas sanguis transire necessum habet, quò rectius ægri gubernantur & se in calido continent, eò etiam tempora enumerata breviora sunt, & maturius Variolarum erumpunt, augentur, suppurantur, arefiunt & finiuntur.

Notandum 5^{to}. Eruptionem Variolarum, id est, modum eruptionis quod spectat, hoc se ferè habet modo. Imò. Ma-

culæ

culæ subrubræ, tenuissimarum acicularum puncta adæquantur magnitudine, sparsim se produnt, faciem imprimis occupantes, præsertim labia & mentum, vel etiam collum & pectus, deinde corpus universum: per id temporis & fauces dolor infestat, qui unâ cum pustulis surgentibus augetur, quæ in dies grandescunt, & in majus fastigium elevaræ, cutem carnesque vicinas, rubore atque inflammatione afficiunt.

eruptio
quomodo
se habeat
& fiat?
Quas partes
primò
occupent

Circa *octavarum* primo insultu *diem*, intervalla cutis, quæ prius subalbebant, præ pustularum, quibus obsidentur, numero, jam incipiunt, atque in molem attolli, non sine dictarum partium dolore tensivo & lancinante, qui in horas actus, inflammationi, tumori & prædictis viam sternit, ita ut progrediente morbo, palpebræ adeò impleantur, ut æger quandoque luce privetur, qui quidem palpebrarum tumor, vesicam inflatam ac splendescentem, per easdem extensam non malè refert. Post faciem inrumescunt manus & digiti, qui pro pustularum numero distenduntur. Usque ad hanc diem pustulæ, quæ faciem obsederant, leves ac rubræ ad tactum fuerunt, jam verò asperiores evadunt (quod primum est incipientis maturationis indicium) atque subalbidæ, paulatim succum quendam luteum, colore à flavo non abludentem, evomunt; faciei interim & manuum inflammatio, ad summum evecta apicem, colorem exhibet in pustularum interstitiis, facis floridum & rosarum damascenarum colori similem, Et sanè, quò miiores sunt Variolæ & magis genulinæ, eò etiam magis, cum ipsæ pustulæ, cum etiam cutis, in earundem interstitiis, dictum colorem ad vivum exprimunt, qualem jam diximus. Ubi verò, quæ faciem occupant pustulæ, asperiores quotidie, ac magis flavæ pro maturationis ratione, ita è contra, quæ manus & reliquum corpus, minùs asperæ, & magis albæ in dies conspiciuntur.

Quid circa
octavam
diem hat,

Quas partes
post faciem
aggrédiantur

Quid circa
undeci-
mam diem
fiat?

Die 11^{mo}. faciei tumor atque inflammatio satis aperte
recedunt, & pustulæ tam faciei, quam reliqui corporis, jam
maturitatem & justam magnitudinem adeptæ, exarescunt &
decidunt, atque in hac Variolarum specie, hoc est, si discretæ
& regulares, non verò pestilentes aut confluentes fuerint.

Quid deci-
ma quarta
aut decima
quinta.
Quomodo
faciei, &
quomodo
manuum
Variolæ
abscant.
Pustulis fa-
ciei succe-
dunt
squammu-
læ furfura-
cæ.
Deceden-
tibus squa-
mulis pri-
mum in
conspicua
veniunt
foveæ.
Quomodo
confluen-
tes Vari-
olæ erump-
pant.

Die 14. aut 15. ut plurimum funditus pereunt. Verum-
tamen manuum pustulæ, cæterarum partium pustulis pertina-
ciores, plerumque recentes adhuc & albæ, dici unius aut alte-
rius morâ, illas vincunt : Faciei & reliqui corporis pustulæ,
desquamatione, at verò manuum quæ sunt, diruptione, abi-
tum sibi parant. Pustulis faciei, ut dixi, succedunt squam-
mulæ furfuracæ, quas aliquando excipiunt foveæ cutis. Etenim
ubi primum decidunt pustulæ, nulla adhuc in cute cernitur in-
æqualitas, at verò ejusmodi squammulis exsurgentibus & re-
cedentibus vicissim, tandem istæ foveæ excavantur, quæ sæpe
numero in convalescentibus ab hoc morbo diu visuntur,
quamvis rarò admodum Variolæ discretæ ulla sui relinquant
vestigia, atque illæ ferme solæ, quæ confluent, notas cutis
non evadunt. Et hæc de modo eruptionis Variolarum dis-
cretarum.

Confluentium Variolarum eruptionem quod attinet, scien-
dum est, symptomata cum discretis Variolis plerumque com-
munia habere, nisi quòd in confluentibus omnia sint atrocio-
ra, v. gr. febris, anxietas, vomitum, &c. immaniùs affligunt,
unde sagax Medicus, etiam ante eruptionem confluentium
Variolarum, earum ortum prædicere potest. Accedit, quòd
in confluentibus diarrhæa eruptionem præcedat, & ad diem
unum alterumve post illam protrahatur, quod in discretis val-
de rarò observatur. Præterea confluentes die ut plurimum
tertio, imò quandoque secundo, rarissimè autem quarto; è
contra discretæ die quarto inclusivè, à primo morbi insultu,
vel

Confluen-
tes citius,
quàm dis-
cretæ se-
ant.

vel post quartum, rarò autem ante quartum, se monstrant. Quò magis autem quartum diem præverterint Variolæ, eò magis confluent.

Quamvis autem, ut generaliter loquamur, confluentes diem quartum vix unquam præstolentur, attamen contingit, licèt aliquomodo rariùs, ut ratione alicujus atrocioris symptomatis usque ad quartum aut quintum diem eruptio differatur: exempli gratià, dum nunc acutissimus dolor in regione lumborum, instar proximi nephritici, nunc in latere, qualis pleuriticorum est, nunc in ventriculo, cum ingenti ægitudine & enormi vomitu, ægrum ante eruptionem angit & affligit. In talibus casibus, (quamvis sint infrequentes) rariùs solito Variolas & Morbillos erumpere, animadvertitur, utpote à dictorum symptomatum violentia constrictas & impeditas: quæ quidem symptomata si solitis vehementiora sunt, apertè indicare videntur, securas Variolas è genere confluentium esse, quæ minimè periculo vacant. At verò, quamvis in discretis mox ab eruptione, quæ morbum comitantur symptomata, nullum jam negotium facessant, in confluentibus longè aliter se res habet; tam enim febris, quàm alia symptomata, ægrum etiam ad complures dies à pustularum eruptione discruciant. Dictæ modò Variolæ confluentes, nunc ad modum erysipelatis, nunc Morbillorum erumpunt, à quibus non nisi in his morbis versatissimus Medicus distinguet, saltem quoad externam faciem; nam qui ad dispar in utroque morbo tempus eruptionis, aliasque circumstantias sedulò attenderit, non difficile illi erit, hunc ab illo discriminare. Morbo crescente non attoluntur in molem aliquam spectabilem, quemadmodum discretæ, quæ præsertim faciem occuparunt, ac sibi invicem implicata, habent se instar rubræ vesiculæ totum vultum contegentis, quam etiam citiùs elevant in tumorem, quàm discretæ; deinde ad instar pelliculæ albæ cuti agglutinata, solidam cutis superficiem

Quò magis quartum diem præveniunt, eò magis conflunt. Etiam ubi aliquod atrox symptomata urget ad diem quartum aut quintum differatur eruptio. Ratio.

In confluentium Variolarum facie eruptione non cessant symptomata, ut in discretarum. Ulterior confluentium eruptionis ejusque modi consideratio à discretis differens.

Quomodo
præterea
differant
in eruptio-
ne.
Præterla-
psâ die
oſtavâ
quomodo
procedant.

ciem non multum luperantes. Præterlapsâ die octavâ pellicu-
la alba paulatim quotidie magis exasperatur, & colorem fu-
scum, non autem flavum, prout accidit in discretis, indies tum
asperitas, tum etiam color cutis intenduntur, donec tandem
pellicula laticioribus laminis disquammatur, quod in quibus-
dam faciei partibus, si truculentior morbus fuerit, non nisi
post vigesimam diem contingere solet. Quantò Variolæ fue-
rint atrociores, tantò magis matureſcentes puſtula ad colorem
subfuscum vergunt, tantò etiam ciculis abscedunt, & è contra
quantò minus confluerint, tantò magis & flavescunt & ociùs
proripiunt. Hæc pellicula aut scabies omnia pervadens, ubi
primùm deciderit, nullâ quidem scabritie afficit vulcum, ac
verò mox illam afficiunt squammulæ fursuraceæ perquam
corrosivæ, quæ non modò potentiores excavant foveas, quàm
solent Variolæ distinctæ, sed etiam faciem cicatricibus scedè
deturpant. In confluentium genere si admodum sevierit
morbus, humorum ac etiam dorsi cuticula nunquam deperdi-
tur, nudatis partibus subjectis & expositis,

Confluen-
tes faciem
cicatricibus
deturpant.

Variolæ
&c. cum
sint morbo
acutus de
his absolute
quid statui
non potest.

Notandum 6tò. Cùm, ut diximus, morbus sit acutus,
adeò generaliter seu absolute certum quid statui, aut progno-
sticari non potest, juxta Hipp. 2. Aph. 19. *Morborum
acutorum non omnino certæ sunt prædictiones, neque mortis, ne-
que salutis*; sunt enim futura contingentia, quæ in triplici sunt
differentia, quædam ut plurimum veniunt, ut in æstate calor,
in hyeme frigus; quædam raro, ut Cometa; quædam sunt ad
utrumlibet, quia æqualiter fieri & non fieri possunt, ut quæ à
voluntate nostra pendent. De primis & secundis est determi-
nata veritas, quòd erunt vel non erunt, ut plurimum, sed
de contingenti futuro ad utrumlibet non est determinata ve-
ritas.

Talis est in universum eventus acuti morbi, quia potest
occidere, vel non occidere, ubi pro clariore explicatione be-

ne

ne nota, quòd etiam in ipso morbo acuto adhuc triplex illud contingens reperiatur. Variolæ enim v.gr. si bona signa omnia habeant, sanabitur æger, si omnia mala, morietur: Si partim bona, partim mala, dubius erit morbus. In primo & secundo casu Medicus ferè semper vera prædicat; ut plurimum enim contingit sanari cum bonis signis, & mori cum malis: at in tertio dubius est eventus, & ideo etiam incerta prædictio.

Sciendum autem est, quòd in omni morbo acuto fieri possit prædictio, vel in principio, vel in augmento, vel in statu ipsius morbi. In principio aut augmento ut plurimum incertæ sunt prædictiones, & ideo monuit Hipp. *Libr. Prædiction.* non esse prædicendum, donec statum morbus acceperit, quia eo tempore cõditiones accidunt, & quicquid natura potest, ostenditur.

Sciendum præterea, quòd causæ, (ob quas in universum non sunt certæ prædictiones in acutis) sint materiæ caliditas, volatilitas, vel copia, ob quæ citò de una parte ad aliam transmittitur. His accedit error ægri, adstantium, aut Medici fortuna, novus superveniens morbus. Est tamen certior ad mortem, quàm ad salutem prædictio: ratio, quia magis contingit mori, quem edicimus victurum, quàm è contra. Atque ut clarior sim in explicando hoc sapissimè occurrente Aphorismo,

Sciendum 3^{ti}o. Medicum, non nisi cum maximo fundamento, omnibus collectis & inter se comparatis signis, morbi statum debere prædicere, unde suadet *Galenus*, ut Medicus in prognostico duo faciat; primò mente agitet, quid sit futurum, deinde id pronunciet & voce explicet. Primum appellat *præsentationem*, secundum verò *prædictionem* præcedere debere: nam ex vera prædictione admirabilis & miraculosus judicatur

Medicus,

Medicus, at verò si erraverit (inquit Hipp. *Lib. Prædic.*) fortasse insanire videbitur.

Juxta Hipp. Ly. prognosticum multa sub se comprehendit, eventum, tempus eventus, modum, Authorem, qualitatem, de quibus omnibus verus est allegatus Aphorismus. Ratione eventus scripsit Hippocrates, alios morbos esse sanabiles, ut tertiana exquisita, alios insanabiles, ut morbus acutus in prægnantem muliere tenerâ, alios duobios, ut omnes acuti in principio. De tempore eventus dixit, alios esse breves, ut angina, pleuritis, quibus adde Variolas, præsertim autem Morbillos; alios longos, ut nephritis, podagra &c.

Morbus quò fuerit acutior, eò manifestiorem à principio prædictionem habet, quòd morbus, quò fuerit acutior, manifestiorem à principio prædictionem habet, eò magnæ mutationes fiunt, qui enim evasuri sunt, facile spirantes, dormientes, & reliqua mediocriter tenentes, id est, sine dolore & labore degunt. Morituri verò, spirantes difficulter, delirantes & cum dolore degunt. In morbis longioribus firmior est prædictio in processu, ratio: quia materia magis crassa, & non ita instabilis est, ita Hipp. 5. *Prognosticor.*

Quare Variolæ & Morbilli utrumque solent esse boni & salutares. His igitur prænotatis, nunc proponemus signa, quibus conjecturari saltem potest, utrum Variolæ bonæ vel malæ, salutares aut lethales sint eventuræ. Bonæ & salutares ut plurimum esse solent Variolæ & Morbilli, quia sunt motus critici, qui plerumque ad salutem terminantur, quamvis etiam interdum terminentur ad mortem, adjunctâ scilicet malignitate, quæ velut Pestis hominem depascitur. Quòd si verò malignitas absit, febris sit exigua, citò ac facile erumpant & appareant, breviq; ad maturitatem seu suppurationem perducant.

Quando huc tales.

ducantur, teste Hippocrate, in Coac. 114. quibus (inquit) per febres assiduas pustulae in toto corpore enascuntur, lethale est, nisi quid purulentum accidat. Præterea hoc materiae obedientiam & naturæ robur ostendit, & si febrem tollunt, aut saltem imminuunt, voxque sit libera & respiratio facilis, si largior hæmorrhagia narium illas præcesserit, si coloris rubicundi, subalbi, molles, distinctæ, rotundæ, paucæ (de quibus mox plura) magnæ & eminentes, solam cutim, & non partes internas afficientes, si symptomata reliqua minorentur, ægrique ad oblata se bene habeant &c. his stantibus, nullum inferre periculum, sed salutares esse consueverunt, quia omnia prædicta signa, materiae morbificæ paucitatem, obsequium, benignitatem & naturæ robur, validè eam expellentis, significant. Ubi obiter nota, quòd, qui magnâ Variolarum abundantiam ante Morbillos expurgantur, rarissimè aut nunquam Morbillis tententur, teste Schmidio, *Univ. Med. Pract. Compend. fol. 319.*

Unde præterea desumitur periculum bonis eventus.

E contra verò, periculosas & lethales Variolas & Morbillos ostendunt. Imò. Si semel apparentes evanescant, vel intro redeant, quod omnium pessimum est signum, teste Hipp. *Erysipelas ab intro ferri foras, bonum, è contra, malum.* Ratio ab experientia desumitur: quibus enim ista retrocessio contingit, nullus evadit, nisi statim reverantur, sed ut plurimum intra 24. horas pereunt: nam similis retrocessio naturæ imbecillitatem, humorisque copiam resistentem arguit. 2do. Si post earum exortum febris urgens acuta & continua, nihilque imminuta remaneat, aut, si quæ priùs cessaverat, revertatur: significat enim, humores malignos & venenatos non fuisse sufficienter ad cutem expulsos, sed. maximam eorum partem in vasis restitisse, quæ futuræ recidivæ solet esse. Author, ex citato sæpius Hippocratis loco: *Quæ in morbis reliquantur, recidivas facere consueverunt.* 3tio. Anxietas & inquietudo magna, seu corporis vehemens agitatio, cujus ratio

Quemodò è contra nescantur esse periculosi & lethales hi affeçtus.

I.

II.

III.

N

&c

- IV. & causa eadem, ut prioris est. 4to. Difficultas anhelitus seu respirationis, tussis sicca, rauco, deglutitio laesa, quia haec omnia significant, pustulas in pulmonibus subsistere, anginam aut virium lapsam introducere. Hinc testatur Avicennas *Parte 4. Tract. 4. Cap. 6.* quod plurimi eorum, qui moriuntur per Variolas, moriantur praefocati ex squinantia. Quod & confirmat Paulus Zachias *Quest. Med. legal. Consil. 32.* Hippocrates 4. *Aph. 50.* Aliique Authores dicunt; Si respiratio & vox se bene habet, rem salvam esse: indicant enim materiam procul a nobilibus partibus expulsam. 5to. Sitis, & aestus ingens & intolerabilis, quia internum incendium indicat: & si cum iis spirandi difficultas augeatur, mors in propinquo est, propter suffocationis periculum. 6to. Ventriculi dolor, nausea, vomitus, singultus: ostendunt enim, vel fauces vel ipsum ventriculum laesum aut exulceratum esse: ita quoque, qui tensione & meteorismo ventris laborant, & cum anxietate huc atque illuc se agitant, omnes vel plerique intra paucas dies pereunt, praecipue si dolor junctus fuerit, ut testatur Petrus Pachecus *Obs. 62.* ex data ratione laesa alicujus partis intrinseca. 7mo. Alvi fluxus seu diarrhaea, aut dysenteria, & aliae excretiones praeternaturales, quia indicant, humores malignos ad interiora revertere, motu omnino contrario motui naturae adeoque lethali, adeo quidem, ut ex iis, qui hujusmodi fluxibus post eruptionem exanthematum corripiuntur, paucissimi evadant. Si vero ante eruptionem incipiant, & alia prava non sequantur indicia & symptomata, tales restitui cum favore possunt. Sic pariter discurremus de mensium fluxu, eruptionem Variolarum & Morbillorum antecedente, vel concomitante, vel subsequente, qui a plerisque pro lethali habetur; cum tamen cum plurimis adhibitis
- Memoria
gia ante &
infra dicendis debite remediis feliciter curavi. Eadem quoque ratio currit de haemorrhagia parium, quae ante, & in eruptione.

eruptione Variolarum melior est, quàm si post eruptionem eveniat. Ratio prioris est, quia Variolarum quantitatem imminuit. Ratio posterioris, quia motum laudabilem ab intrò ad extra invertit; hoc modo etiam se habent sudores excretivi, qui boni sunt; si verò resolutivi & frigidi, lethales, teste Hipp. 4. Aph. 37. Idem dicendum de frigore extremorum, quod pessimum est, eodem teste 7. Aphor. 1. *Starò.* Urina sanguinea lethalissimum est signum, tùm etiam si per alvum sanguis purus & sincerus rejiciatur. Interdum etiam per nares, gingivas, aliasque corporis partes sanguineæ excretiones contingunt, quæ lethales quoque esse consueverunt, quia denotant summam sanguinis acrimoniam, resolutionem & malignitatem, quæ naturam vehementer excitat, & ad præposteram illius excretionem compellit. *9nd.* Fœces, aut Urinæ lividæ, virides, æruginosæ aut nigræ, magnum in hoc morbo (eò magis, si ægri adhuc adsit debilitas & virium lapsus) portant periculum, maximè verò, si, ut diximus, per modum diarrhææ, aut (quod pejus) dysentericiæ (cujus solent esse prodromi) præcedant: significat enim, humorem atrabilarium in venis redundare, & totam humorum massam inficere, fierique ad interiora recessum. Quæ, si in declinatione contingant, redeuntibus in viscera exanthematibus, aut alia de causa, etiam in ipsa declinatione æger mori potest. Et hinc mirandum non est, quando Avicennas *Fen. 2. Doct. 4. Cap. 98.* ægros in declinatione Variolarum mori scribit, intelligendum est de symptomatum declinatione: nam dùm Variolæ intrò ad partes principes feruntur, tumor totius corporis externus subsidet, deliria aliquando remittunt, vel dormituriunt ægri, pulsu existente miurò & suffocatò, tunc mors est proxima. Fieri etiam potest, ut materia tota non fuerit ad cutim protrusa, parsque in visceribus internis remaneat, quæ ingentem excitat inflammationem, vel dysenteriam incurabilem, pustulis interim in cute siccatis & ad sanitatem tendere visis; hinc

in eruptione Variolarum t. n. na, pestil. lam, mala. Ratio utriusque.

VIII.

IX.

optandum semper, ut plures exoant, sic enim magis ab internis visceribus humor morbificus remouetur; attamen id dicendum non est absolucè, sed cum limitatione; nam siue copiosæ, siue paucæ erumpant, attendenda semper sunt symptomata, quæ si perfectè cessauerint, semper sunt bonæ, si remaneant vel perseverent, vel redeant, semper malæ: in posteriori enim casu paucæ, naturæ imbecillitatem, copiosæ humorum malignorum copiam, arguunt. In priori casu autem paucæ, humoris perniciosi exiguitatem, copiosæ naturæ expurgantis robur, ostendunt. Præterea sciendum, quod quò plus est de seminario illo hæreditario, eò etiam plures, naturâ existente forti, Variolæ generentur, & è contra, quò minus; unde quoque fit, ut nunnulli paucis Variolis tententur, quidam verò plurimis. 156d. Periculosæ sunt, quando maculæ febris purpuratæ seu petechiali, familiares Variolis seu Morbillis, permiscetur, præcipuè si maculæ illæ lividæ vel nigrae fuerint, ex rationibus jam sæpius datis. 166d. Lethales quoque subinde fiunt in iis, qui valde obesi vel cacochymici sunt, quia in iis ferventi sanguini putredo immedicabilis acilè succedit, præsertim si prava victus ratio, vel morbidi cœli & aëris intemperies accesserit. 17md. Ut ut sit, vix unquam aut saltem rarò ita feliciter curantur, quin in facie cicatrices, & vestigia facis deformia relinquuntur: cutis enim illic non est separata à musculo carnoso, & ut docet Aristoteles 3. de Histor. animal. 11. in quiens, *Ubi cutis immediate ossibus adheret, vulnera difficulter coalescere.* In naribus præterea ulcera diuturna sæpè imminutum odoratum inducunt; quanta autem incommoda oculis inferant, supra abundè dictum. Quin imò, ut testatur Paræus Lib. 19. Cap. 1. materiam horum affectuum quandoquæ qualitatis adeo malignæ pestilentis participem esse, ut carnosas partes dilaniasse non contenta, ossa etiam arrodant & corrumpat, instar luis Veneræ, ut ibidem ex-

Variolæ,
cum remis-
sis tamen
sympto-
matibus,
licet mul-
ta, melio-
res, quam
paucæ.
Paucitas
vel copia
Variolarum
desinitur
etiam à
paucitate
vel copia
feminis
illius hæ-
reditarii,

XV.
XVI.
XVII.

N 3

emplum

emplum notatu dignum legere libet. Et quod plus est, pariratione internas partes, pulmones, hepar, intestina &c. erossisse, extra verò ossa è suis sedibus & articulationibus dislocasse, aliis sensus externos, visum, auditum, odoratum destruxisse, id ipsum confirmat & refert Paræus hoc titulo. Unde quæres, cur quidam habeant turpes cicatrices, & quidam non? *Resp.* cum Aristotele *Problemat.* 50. nigras & turpes cicatrices ex ulceribus habent, ob sanguinem morbidum, sic spleneticis nigras habent cicatrices. 18ta vò. In adultis & ætate proventus, gravior affectus contingit, quàm in pueris, teste Hipp. 2. *Apb.* 39. quia si in tenera ætate infectio non expurgetur, signum est, tenacem illam esse, vixque idoneam separari: quare non nisi vi multâ, & magno labore in adulto separari potest: unde memorabilis est historia Borelli *Cent.* 3. *Obs.* 10. de Mulierere quadam Bononiensi, quæ septies Variolas passa est, & anno ætatis suæ 118. tandem eodem morbo perit. 19mò. Molestia & dolor maximus, ita & majora symptomata urgent à principio, dum Variolæ & Morbilli erumpunt, & tandem quando exaltantur, concidunt, & cutem exasperant, medio verò tempore omnia sunt leviora. 20mò. Periculosius etiam est malum, quando invadit hyberno vel autumali tempore, quàm verno vel æstivo, cujus ratio cuique in promptu est. 21mò. Gravidis & Puerperis esse solent periculosiores: nihilominus in his robur naturæ spectandum est: plures enim in ipso partu correptas feliciter restitui, inter quas erat Excellentissima Comitissa de Czernin nata Slavatica: ita etiam gravidas nonnullas, sine vitæ & abortûs periculo, ab eisdem vendicavi. 22mò. In majori quoque versantur periculo illi, quorum in familia exitiales esse consueverunt, ut sæpius observavi. 23mò. Periculosa etiam sunt hæc exanthemata, si vires debiles, & plura & graviora secum vehant symptomata: attamen Medicus terreri non debet, si ab initio adsint, quia tem-

pus

Cur quidam
turpes ci-
catrices
habeant, &
quidam
non, ratio
datur.
XVII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

pus crisi præcedens, semper magnas efficit mutationes; si vero hæc diutius durent & excedant, malum portendunt; contra si iterum post eruptionem remittant, spes salutis affulget. 24^{mo}. Periculosa iterum sunt, si calor nimis citò remittat, quia natura hoc modo impotens est ad expellenda miasmata, unde cavendum à refrigerantibus, & expellentibus insistendum. 25^{mo}. Pejores etiam sunt Variolæ, quæ interiora viscera afficiunt, unde phthises, dysenteria, angina, gangræna, sphacelus &c. imò quandoque materia peccans, ad unum tantum nervum à natura transmittitur, unde cæcitas, surditas, loquelæ defectus &c.

XXIV.

XXV.

Notandum Imò. Eandem fere esse rationem Morbillorum, quàm hactenus diximus Variolarum esse: periculosiores quidem naturâ suâ sunt Morbilli, cum ex sanguine fervidior & fermentis potentioribus, quæ febrem & omnia symptomata graviora excitant, consistunt; citius tamen judicantur, nec oculos ita petunt, ut Variolæ, quod subtilis eorum materia citius dissolvatur, quàm ut in iis figi possit. In cæteris autem standum est prognostico Variolarum.

Morbillorum eadem fere est ratio quæ Variolarum. Naturâ suâ sunt quidem periculosiores Morbilli ob suam causam, citius tamen judicantur. Causæ mortis Variolis extindorum numerantur diversæ. Frequens mortis causa non solum in Variolis, verum plurimis aliis morbis adducitur.

Notandum 2^{do}. Qui moriuntur in Variolis, vel suffocantur anginâ, ob tumorem ab ipsis excitatum in collo: vel deliquio, ex defectu virium à malignitate debilitatarum: vel convulsione seu Epilepsiâ, ob à maligno humore affectum cerebrum & nervosum genus: vel superveniens diarrhæa & dysenteria, ob solutas vires, & materiæ peccantis & adustæ recessum ad interiora, vitæ finem imponit. Nolo hic præterire aliam mortis causam, non solum in Variolis, sed etiam in plurimis aliis morbis sæpius evenientem, errorem nimium, ignorantiam, imperitiam, negligentiam, timorem, mutationem, & quod frequentissimè accidit, disceptionem Medicorum, agrorum, adstantium, ubi ea, quæ adhibenda sunt,

omit-

omittuntur, & quæ facienda, non sunt, & sic ægros positivè quidem non occidunt, sed interim ad æternitatem transmittunt; quidam enim sunt adeò inflati superbâ juvenes, aut obstinatæ arrogantæ seniculi idiotæ, ut illi remedium à periculis quærere, putent esse legem frangere reputationis; hi verò senio conflati, acumina juventutis annorum serie, plus quàm sapienciâ obtundunt; unde fit, ut veris, (sed contentiosis illis Medicis, sæpiùs Medicaltri, vetulæ, & hujus farinae inutiles homines succedant, quos fors secundat & exaltat; morte verò eveniente, non ipsis, sed Medicis, non sine ignominia artis, culpa adscribitur.

Ratio cur
in scabie,
tinea, a-
choribus
fiant ex-
crectiones
sine fe-
bre, non
legem in Va-
riolis.

Quæres hic obiter, cur in scabie, tinea, achoribus, fiant multæ excrectiones sine febre? cur etiam Variolæ & Morbilli sine febre non fiant? *Resp.* excrectiones eas, quas natura sensim molitur, sine febre possè perfici, sed criticas impetuosas, quales sunt Variolæ & Morbilli, sine multo calore non fieri; calor enim ille, vi fermenti productus, promovet & accelerat repentinas humorum evacuationes.

CAPUT VII.

De Indicationibus Variolarum & Morbillorum.

Indicationes unde desumantur.
Sunt tri-
plices. Re-
media quæ
indicantur

Variolarum & Morbillorum indicationes, prout in aliis morbis, desumuntur à tribus: Morbo scilicet, causâ morbi, & viribus. A morbo, curativa: à causâ morbi, præservativa: à viribus, viralis conservativa. Ratione *causæ morbi*, indicantur evacuantiâ, tum per venas & alvum, tum etiam per habitum corporis seu diaphoretica; Ratione *morbi*, qui triplex

triplex est, in aucta magnitudine, in intemperie, & solutâ unitate. Ratione *intemperiei* (intellige intemperiei febrilis, non autem respectu Variolarum, de quo immediate post fusiùs) indicantur moderatè temperata, non absolutè refrigerantia, ne materia intus detineatur, sed si materia nimium tenuis & fervens sit, ut sit periculum, ne ad partes nobiles ruat, indicantur moderatè incrassantia. Ratione *magnitudinis auctæ*, imminuentia per discutientia. Ratione *solutæ unitatis*, reunientia.

Dixi mox ante, intemperiei febrilis, non autem respectu Variolarum, ubi nota, nos absolutè negare, effervescentiam seu fermentationem esse intemperiem vulgariter intellectam, sed ab ea & calore, ita & putredine à vulgo intellectâ, omninò distinctam, quis enim dixerit fermentationem seu effervescentiam musti, cerevisiæ, panis, acidularum (: ad quorum modum fermentationem horum affectuum quoque fieri diximus:) in intemperie, aut quodam actuali calore, vel putredine consistere, cum nihil horum in iis demonstrari possit, quin imò contrarium observatur verius, quod horum omnium actiones, solius caloris esse nequeant, idque in pisce manifestatur; nam hic æquè digerit alimentum, & illud apponit suæ substantiæ, & tamen actuali calore caret; potentialis autem calor nunquam agit, nisi in actum deducatur, hinc eorum digestio calori adscribi non potest, quæ tamen, cum in omnibus animalibus, cum etiam in homine fiunt, ex fermentorum actione seu motu, de quo mox.

Adde: si enim calor digereret, tunc homines deberent in locis calidioribus & æstate esse voraciores, & plus digerere; atqui contrarium potius contingit, quòd, quò magis frigidioris naturæ sint homines, eò magis voracitati sint dediti, & hyeme quivis melius digerit quàm æstate, non quia calidius est corpus, sed quia fermenta non ità soluta sunt, imò vegetiora. Nec obstat Veterum autoritas, quòd tria sint tantum mor-

ratione
cause.
Quæ ratio-
ne morbi.
Quæ u-
plex sit
n oibus.
Ratione
intempe-
riæ fe-
bris in-
cantur mo-
deratè
temperata.
Ratione
magnitu-
dinis.
Ratione
solutæ uni-
tatis.
Quare ad-
ditum fue-
rit ratione
febrilis in-
temperiei,
& non in-
temperiei
respectu
Variolarum.
Excipitur
Efferves-
centia non
est intem-
peries vul-
gariter
sumpta.
Calor non
digerit.
Probatur.

Medicus, at verò si erraverit (inquit Hipp. *Lib. Prædic.*) fortasse insanire videbitur.

Juxta
Hipp. Ly
prognosticum multa
sub se habet.
Allegatur
Hipp. Aphorismorum
ratione eventus morbi.
Ratione
temporis
eventus.

Sciendum 4to. Quòd juxta Hipp. 1. *de Morb.* Ly prognosticum multa sub se comprehendit, eventum, tempus eventus, modum, Authorem, qualitatem, de quibus omnibus verus est allegatus Aphorismus. Ratione eventus scripsit Hippocrates, alios morbos esse sanabiles, ut tertiana exquisita, alios insanabiles, ut morbus acutus in prægnante muliere tenerâ, alios duobios, ut omnes acuti in principio. De tempore eventus dixit, alios esse breves, ut angina, pleuritis, quibus adde Variolas, præsertim autem Morbillos; alios longos, ut nephritis, podagra &c.

Morbus
quò fuerit
acutior, eò
manifestior
rem à principio
habet prædictionem.

Sciendum tandem, quòd morbus, quò fuerit acutior, manifestiorem habeat à principio prædictionem, quia statim magnæ mutationes fiunt, qui enim evasuri sunt, faciliè spirantes, dormientes, & reliqua mediocriter tenentes, id est, sine dolore & labore degunt. Morituri verò, spirantes difficulter, delirantes & cum dolore degunt. In morbis longioribus firmior est prædictio in processu, ratio: quia materia magis crassa, & non ita instabilis est, ita Hipp. 5. *Prognosticor.*

Quare Variolæ & Morbilli, utrumque solent esse boni & salutare.

His igitur prænotatis, nunc proponemus signa, quibus conjecturari saltem potest, utrum Variolæ bonæ vel malæ, salutare aut lethale sint eventuræ. Bonæ & salutare ut plurimum esse solent Variolæ & Morbilli, quia sunt motus critici, qui plerumque ad salutem terminantur, quamvis etiam interdum terminentur ad mortem, adjunctâ scilicet malignitate, quæ velut Pestis hominem depascitur. Quòd si verò malignitas absit, febris sit exigua, citò ac faciliè erumpant & appareant, brevique ad maturitatem seu suppurationem perducant.

Quando
huc tales.

ducantur, teste Hippocrate, in Coac. II. 4. quibus (inquit) per febres assiduas pustulae in toto corpore enascuntur, lethale est, nisi quid purulentum accidat. Præterea hoc materiae obedientiam & naturæ robur ostendit, & si febrem tollunt, aut saltem immi- nuunt, voxque sit libera & respiratio facilis, si largior hamor- rhagia narium illas præcesserit, si coloris rubicundi, subalbi, molles, distinctæ, rotundæ, paucæ (de quibus mox plura) mag- næ & eminentes, solam cutim, & non partes internas afficien- tes, si symptomata reliqua minorentur, ægrique ad oblata se bene habeant &c. his stantibus, nullum inferre periculum, sed salutare esse consueverunt, quia omnia prædicta signa, mate- riæ morbificæ paucitatem, obsequium, benignitatem & natu- ræ robur, validè eam expellentis, significant. Ubi obiter nota, quòd, qui magnâ Variolarum abundantia ante Morbillos ex- purgantur, rarissimè aut nunquam Morbillis tententur, teste Schmidio, *Univ. Med. Pract. Compend.* fol. 319.

Unde præ-
terea de-
sumi possit
eorum bo-
nis even-
tus.

E contra verò, periculosas & lethales Variolas & Morbil- los ostendunt. Imò. Si semel apparentes evanescant, vel intrò redeant, quod omnium pessimum est signum, teste Hipp. *Erysipelas ab intrò ferri foràs, bonum, è contra, malum.* Ra- tio ab experientia desumitur: quibus enim ista retrocessio con- tingit, nullus evadit, nisi statim revertantur, sed ut plurimum intra 24. horas pereunt: nam similis retrocessio naturæ imbe- cillitatem, humorisque copiam resistentem arguit. 2dò. Si post earum exortum febris urgens acuta & continua, nihil- que imminuta remaneat, aut, si quæ priùs cessaverat, reve- tatur: significat enim, humores malignos & venenatos non fuisse sufficienter ad cutem expulsos, sed. maximam eorum partem in vasis restitisse, quæ futura recidivæ solet esse. Au- thor, ex citato sapius Hippocratis loco: *Quæ in morbis relin- quuntur, recidi vas facere consueverunt.* 3to. Anxietas & in- quietudo magna, seu corporis vehemens agitatio, cujus ratio

Quomodo
è contra
noscantur
esse peri-
culosi &
lethales hi
affectus.

I.

II.

III.

N

&

- IV. & causa eadem, ut prioris est. 4to. Difficultas anhelitus seu respirationis, tussis sicca, raucedo, deglutitio læsa, quia hæc omnia significant, pustulas in pulmonibus subsistere, anginant aut virium lapsam introducere. Hinc testatur Avicenna *Parte 4. Tract. 4. Cap. 6.* quod plurimi eorum, qui moriuntur per Variolas, moriantur præfocati ex squinantia. Quod & confirmat Paulus Zachias *Quest. Med. legal. Consil. 32.* Hippocrates 4. *Aph. 50.* Aliique Authores dicunt; Si respiratio & vox se bene habet, rem salvam esse: indicant enim materiam procul à nobilibus partibus expulsum. 5to. Sitis, & æstus ingens & intolerabilis, quia internum incendium indicat: & si cum iis spirandi difficultas augeatur, mors in propinquo est, propter suffocationis periculum. 6to. Ventriculi dolor, nausea, vomitus, singultus: ostendunt enim, vel fauces vel ipsum ventriculum læsum aut exulceratum esse: ita quoque, qui tensione & meteorismo ventris laborant, & cum anxietate huc atque illuc se agitant, omnes vel plerique intra paucas dies pereunt, præcipue si dolor junctus fuerit, ut testatur Petrus Pachequus *Obs. 62.* ex data ratione læsæ alicujus partis intrinsecæ. 7mo. Alvi fluxus seu diarrhæa, aut dysenteria, & aliæ excretiones præternaturales, quia indicant, humores malignos ad interiora revertere, motu omnino contrariò motui naturæ adeoque lethali, adeò quidem, ut ex iis, qui hujusmodi fluxibus post eruptionem exanthematum corripuntur, paucissimi evadant. Si verò ante eruptionem incipiant, & alia prava non sequantur indicia & symptomata, tales restitui cum fænore possunt. Sic pariter discurremus de mensium fluxu, eruptionem Variolarum & Morbillorum antecedente, vel concomitante, vel subsequente, qui à plerisque pro lethali habetur; cum tamen cum plurimis adhibitis infra dicendis debite remediis feliciter curavi. Eadem quoque ratio currit de hæmorrhagia narium, quæ ante, & in eruptione,

Hæmorrhagia ante &

eruptione Variolarum melior est, quàm si post eruptionem eveniat. Ratio prioris est, quia Variolarum quantitatem imminuit. Ratio posterioris, quia motum laudabilem ab intrò ad extra invertit; hoc modo etiam se habent sudores excretivi, qui boni sunt; si verò resolutivi & frigidi, lethales, teste Hipp. 4. Aph. 37. Idem dicendum de frigore extremorum, quod pessimum est, eodem teste 7. Aphor. 1. *Starò.* Urina sanguinea lethalissimum est signum, tùm etiam si per alvum sanguis purus & sincerus rejiciatur. Interdum etiam per nares, gingivas, aliasque corporis partes sanguineæ excretiones contingunt, quæ lethales quoque esse consueverunt, quia denotant summam sanguinis acrimoniam, resolutionem & malignitatem, quæ naturam vehementer excitat, & ad præposteram illius excretionem compellit. *9nd.* Fœces, aut Urinæ lividæ, virides, æruginosæ aut nigre, magnum in hoc morbo (eò magis, si ægri adhuc adsit debilitas & virium lapsus) portant periculum, maximè verò, si, ut diximus, per modum diarrhææ, aut (quod pejus) dysentericiæ (cujus solent esse prodromi) præcedant: significat enim, humorem atrabilarium in venis redundare, & totam humorum massam inficere, fierique ad interiora recessum. Quæ, si in declinatione contingant, redeuntibus in viscera exanthematibus, aut alia de causa, etiam in ipsa declinatione æger mori potest. Et hinc mirandum non est, quando Avicennas *Fen. 2. Doct. 4. Cap. 98.* ægros in declinatione Variolarum mori scribit, intelligendum est de symptomatum declinatione: nam dùm Variolæ intrò ad partes principes feruntur, tumor totius corporis externus subsidet, deliria aliquando remittunt, vel dormituriunt ægri, pulsu existente miurò & suffocato, tunc mors est proxima. Fieri etiam potest, ut materia tota non fuerit ad cutim protrusa, parsque in visceribus internis remaneat, quæ ingentem excitat inflammationem, vel dysenteriam incurabilem, pustulis interim in cute siccatis & ad sanitatem tendere visis; hinc

in eruptione Variolarum & morbillorum, post illam, quæ Ratio utriusque.

VIII.

IX.

optandum semper, ut plures exoant, sic enim magis ab internis visceribus humor morbosus removetur: attamen id dicendum non est absolute, sed cum limitatione; nam sive copiosæ, sive paucæ erumpant, attendenda semper sunt symptomata, quæ si perfecte cessaverint, semper sunt bonæ, si remaneant vel perseverent, vel redeant, semper malæ: in posteriori enim casu paucæ, naturæ imbecillitatem, copiosæ, humorum malignorum copiam, arguunt. In priori casu autem paucæ, humoris perniciosi exiguitatem, copiosæ naturæ expurgantis robur, ostendunt. Præterea sciendum, quod quò plus est de seminario illo hæreditario, eò etiam plures, naturæ existente forti, Variolæ generentur, & è contra, quò minus; unde quoque fit, ut nunnulli paucis Variolis tententur, quidam verò plurimis. 156d. Periculosæ sunt, quando maculæ febris purpuratæ seu petechiali, familiares Variolis seu Morbillis, permiscantur, præcipuè si maculæ illæ lividæ vel nigrae fuerint, ex rationibus jam sæpius datis. 166d. Lethales quoque subinde fiunt in iis, qui valde obesi vel cacochymici sunt, quia in iis ferventi sanguini putredo immedicabilis acilè succedit, præsertim si prava victus ratio, vel morbidus coeli & aëris intemperies accesserit. 17md. Ut ut sit, vix unquam aut saltem raro ita feliciter curantur, quin in facie cicatrices, & vestigia satis deformia relinquantur: cutis enim illic non est separata à musculo carnosio, & ut docet Aristoteles 3. de Histor. animal. xi. in quiens, *Ubi cutis immediatè ossibus adheret, vulnera difficulter coalescere.* In naribus præterea ulcera diuturna sæpè imminutum odoratum inducunt; quanta autem incommoda oculis inferant, supra abundè dictum. Quin imò, ut testatur Paræus Lib. 19. Cap. 1. materiam horum affectuum quandoquæ qualicatis adeo malignæ pestilentis participem esse, ut carnosas partes dilaniasse non contenta, ossa etiam arrodant & corrumpant, instar luis Veneræ, ut ibidem exemplum

Variosæ,
cum remi-
ssis tamen
sympto-
matibus,
licet mul-
ta, melio-
res, quam
paucæ.
Pauca
vel copia
Variolarum
desumitur
etiam à
paucitate
vel copia
seminis
illius hæ-
reditarii.
XV.
XVI.
XVII.

emplum notatu dignum legere libet. Et quod plus est, paritione internas partes, pulmones, hepar, intestina &c. erossisse, extra verò ossa è suis sedibus & articulationibus dislocasse, aliis sensus externos, visum, auditum, odoratum destruxisse, id ipsum confirmat & refert Paræus hoc titulo. Unde quæres, cur quidam habeant turpes cicatrices, & quidam non?

Cur quidam
turpes ci-
catrices
habeant, &
quidam
non, ratio
datur.

XVII.

Resp. cum Aristotele *Problem.* 50. nigras & turpes cicatrices ex ulceribus habent, ob sanguinem morbidum, sic spleneticis nigras habent cicatrices. *18ta vò.* In adultis & ætate prove-

ntis, gravior affectus contingit, quàm in pueris, teste Hipp. 2. *Apb.* 39. quia si in tenera ætate infectio non expurgeretur, signum est, tenacem illam esse, vixque idoneam separari: quare non nisi vi multâ, & magno labore in adulto separari potest: unde memorabilis est historia Borelli *Cent.* 3. *Obs.* 10. de Mulierere quadam Bononiensi, quæ septies Variolas passa est, & anno ætatis suæ 118. tandem eodem morbo periit.

XIX.

19mò. Molestia & dolor maximus, ita & majora symptomata urgent à principio, dum Variolæ & Morbilli erumpunt, & tandem quando exaltantur, concidunt, & cutem exasperant.

XX.

medio verò tempore omnia sunt leviora. *20mò.* Periculosius etiam est malum, quando invadit hyberno vel autumnali tempore, quàm verno vel æstivo, cujus ratio cuique in promptu est. *21mò.* Gravidis & Puerperis esse solent periculosiores:

XXI.

nihilominus in his robur naturæ spectandum est: plures enim in ipso partu correptas feliciter restitui, inter quas erat Excellentissima Comitissa de Czernin nata Slavatianna: ita etiam gravidas nonnullas, sine vitæ & abortûs periculo, ab eisdem vendicavi. *22mò.* In majori quoque versantur periculo illi,

XXII.

quorum in familia exitiales esse consueverunt, ut sæpius observavi. *23mò.* Periculosa etiam sunt hæc exanthemata, si vires debiles, & plura & graviora secum vehant symptomata: attamen Medicus terreri non debet, si ab initio adsint, quia tem-

XXIII.

pus

pus crisin præcedens, semper magnas efficit mutationes; si vero hæc diutius durent & excedant, malum portendunt; contra si iterum post eruptionem remittant, spes salutis affulget. 24^{mo}. Periculosa iterum sunt, si calor nimis citò remittat, quia natura hoc modo impotens est ad expellenda miasmata, unde cavendum à refrigerantibus, & expellentibus insistendum. 25^{mo}. Peiores etiam sunt Variolæ, quæ interiora viscera afficiunt, unde phthises, dysenteria, angina, gangræna, sphacelus &c. imò quandoque materia peccans, ad unum tantum nervum à natura transmittitur, unde cæcitas, surditas, loquelæ defectus &c.

XXIV.

XXV.

Notandum Imò. Eandem fere esse rationem Morbillorum, quàm hæctenus diximus Variolarum esse: periculosiores quidem naturâ suâ sunt Morbilli, cum ex sanguine fervidior & fermentis potentioribus, quæ febrem & omnia symptomata graviora excitant, consent; citius tamen judicantur, nec oculos ita petunt, ut Variolæ, quod subtilis eorum materia citius dissolvatur, quàm ut in iis figi possit. In cæteris autem standum est prognostico Variolarum.

Notandum 2^{do}. Qui moriuntur in Variolis, vel suffocantur anginâ, ob tumorem ab ipsis excitatum in collo: vel deliquio, ex defectu virium à malignitate debilitatarum: vel convulsione seu Epilepsiâ, ob à maligno humore affectum cerebri & nervosum genus: vel superveniens diarrhæa & dysenteria, ob solutas vires, & materiæ peccantis & adustæ recessum ad interiora, vitæ finem imponit. Nolo hic præterire aliam mortis causam, non solum in Variolis, sed etiam in plurimis aliis morbis sæpissimè evenientem, errorem nimirum, ignorantiam, imperitiam, negligentiam, timorem, mutationem, & quod frequentissimè accidit, discepcionem Medicorum, ægrorum, adstantium, ubi ea, quæ adhibenda sunt,

Morbillorum eandem fere est ratio quæ Variolarum. Naturâ suâ sunt qui dem periculosiores Morbillis ob suam causam, citius tamen judicantur. Causæ mortis Variolis extinctorum numerantur diversæ. Frequens mortis causa non solum in Variolis, verum plurimis aliis morbis adducitur.

triplex est, in aucta magnitudine, in intemperie, & solutâ unitate. Ratione *intemperiei* (intellige intemperiei febrilis, non autem respectu Variolarum, de quo immediatè post fusiùs) indicantur moderatè temperata, non absolutè refrigerantia, ne materia intus detineatur, sed si materia nimium tenuis & fervens sit, ut sit periculum, ne ad partes nobiles ruat, indicantur moderatè incrassantia. Ratione *magnitudinis auctæ*, imminuentia per discutientia. Ratione *solutæ unitatis*, reunientia.

ratione
causæ.
Quæ ratio-
ne morbi.
Quo u-
plex sit
natus.
Ratione
intempe-
ric fe-
brilis in-
causæ mo-
deratè
temperata.
Ratione
magnitu-
dinis.
Ratione
solutæ uni-
tatis.
Quare ad-
ditum fue-
rit ratione
febrilis in-
temperiei,
& non in-
temperiei
respectu
Variolarum.
Excipitur
efferves-
centia non
est intem-
peries vul-
gariter
sumpta.
Calor n-
digerit.
Probatur.

Dixi mox ante, intemperiei febrilis, non autem respectu Variolarum, ubi nota, nos absolutè negare, effervescentiam seu fermentationem esse intemperiem vulgariter intellectam, sed ab ea & calore, ita & putredineâ vulgo intellectâ, omninò distinctam, quis enim dixerit fermentationem seu effervescentiam musti, cerevisiæ, panis, acidularum (: ad quorum modum fermentationem horum affectuum quoque fieri diximus:) in intemperie, aut quodam actuali calore, vel putredine consistere, cum nihil horum in iis demonstrari possit, quin imò contrarium observatur verius, quod horum omnium actiones, solius caloris esse nequeant, idque in pisce manifestatur; nam hic æquè digerit alimentum, & illud apponit suæ substantiæ, & tamen actuali calore caret; potentialis autem calor nunquam agit, nisi in actum deducatur, hinc eorum digestio calori adscribi non potest, quæ tamen, cum in omnibus animalibus, cum etiam in homine fiunt, ex fermentorum actione seu motu, de quo mox.

Adde: si enim calor digereret, tunc homines deberent in locis calidioribus & æstare esse voraciores, & plus digerere; atqui contrarium potius contingit, quòd, quò magis frigidioris naturæ sint homines, eò magis voracitati sint dediti, & hyeme quivis melius digerit quàm æstare, non quia calidius est corpus, sed quia fermenta non ita soluta sunt, imò vegetiora. Nec obstat Veterum autoritas, quòd tria sint tantum mor-

Veteres
borum

probat
Varioles
debere re-
ferri ad in-
temperiem
Probatur
contrariū.

borum suprema genera, adeoque ad unum ex his referendam esse hanc sanguinis effervescentiam, potissimum autem intemperiei: Verum nos candidè negamus, primò quidem, cum quædam hætenus sint morborum genera, quæ ad illa tria referri directè nunquam queunt, morbi nimirum totius substantiæ, quos si ad intemperiem retuleris, ignotum per ignotum explicas, ad quam quæso, manifestam qualitatem hanc occultam referes, aut quibus eam remediis oppugnabis? Si calida adhibes, non prodes, si refrigeras, occidis, alexipharmacis tandem uteris, sed rursum quæro cur? non quia calida, non quia frigida, sed propriâ qualitate opposita sunt, quæ ad manifestas nisi indirectè (ut quidam coactè & insipienter loquuntur) referri potest.

Inde deri-
vatur fer-
mentatio
& febris.

Fermenta-
tionis defi-
nitio.

In quo con-
sistat illa
qualitas in-
testinalis.
Explicatur
ulterius
fermenta-
tionis mo-
dus.

Patet præterea ex supra dictis de fermentatione, & tractatu de febribus, ly fermentatio & febris (quam etiam fermentationem ibidem dicimus) nomen, à februo seu purgamento, vel à ferveo, id est, depurgo, non autem ut alii, ferveo, id est, caleo, ortum ducere, quæ quidem vox febrì commodè imponitur, eò quod sanguis in hoc morbo effervesceat, & insuper fervore suo, velut mustum efflorescens, à sordibus purgatur, ideoque fermentatio seu effervescencia, strictè loquendo ad intemperiem non est referenda, sed sui generis est, id est, motus intestinalis (id est occultus) particularum, seu principiorum cujusvis corporis, cum tendencia ad perfectionem ipsius corporis, vel propter mutationem in aliud, de quo clarissimè & fusè egimus supra de fermentatione: Motus ergò hic, seu qualitas intestinalis, sui generis est, sicut caro cordis, est caro sui generis &c. si autem quæris, in quo hæc qualitas consistat? *Resp.* in motu, qui motus, utpote merè naturalis, in intestina particularum elementarium naturâ, non verò in intemperie vel calore consistit. Id est: motum hunc perficiunt, particule naturaliter concretis insitæ, id quod fit, tam in mineralibus, vegetabilibus & animalibus, de quibus supra; etenim

etenim particulæ elementares, aut spontè naturâ, aut occasionaliter in motum concitatae, semirè exagitant & exagitantur, invicem diducunt & obvolvunt, subtiles & magis actuatæ, se se qua quâ versus explicant, & avolare nituntur, quæ tamen ab iis crassioribus implicitæ, inter avolandum detinentur, interim crassiores, à subtiliorum nisu & expansione subiguntur, & quamplurimum attenuantur, donec singula ad centra & exaltationes suas evectæ, aut debitam perfectionem conciliant, aut alterationes & mutationes à natura designatas, compleant. Hoc ut intemperie aut calore fiat, absurdum est dictum, sic enim, quòd gracilis quidam homo, faciliùs se moveat, aliquò obeso truncò, aut quòd lepus fortius currat &c. ac si hoc eidem calori esset adscribendum. Manet ergò effervescentia qualitas sui generis, prout, si meo standum esset iudicio, omnes morbi occulti esse debent: eam tamen si indirectè & improprie ad intemperiem, tanquam generalissimum genus retuleris, non minus facies, quàm si non faceres.

Reliqua quæ hanc materiam concernunt fusiùs discussa, leges in tractatu meo de febribus, quæ hic repetere inanis esset laboris, ut tamen hic obiter intelligas, nos essentiam febris non in intemperie, non in simpliciter intellecto calore aut putredine consistere, sed febrem esse motum inordinatum sanguinis, ejusque nimiam effervescentiam, cum calore, siti, aliisque symptomatibus, quibus æconomia variè perturbatur, asserimus.

CAPUT VIII.

De Curatione Prophylactica Variolarum & Morbillorum.

ANtequam ad curationem eradicativam nos accingamus, Cur.
 sciendum, in hoc morbo æquè ac in Peste curationem Uta præ-
 O 2 servativa
 dupli- & prophy

Indica.
Altera cu-
rativa &
eradicati-
va.

duplicem esse, unam quæ præservat, & prophylactica dicitur, altera quæ præsentis curat, cujus indicationes generales mox supra retulimus, & therapeutica seu eradicativa nominatur.

Cura præ-
servativa.

Quare tra-
datur Pro-
phylaxis
Variolarum.

De hac pauci scripsere Medici, vel quod illam minus necessariam esse judicaverint, vel quod raro & paucissimi sanè homines super ea Medicos consulant. Verum tamen, cum Viri docti eam non minus necessariam, firmis rationibus quam in peste judicent esse, & plurimi existant (præsertim adulti, senes, formosi, aulici, maxime vero ij, qui suæ formæ & pulchritudini consulunt) qui sibi de hoc malo multum metuunt, tam propter vitæ periculum, quam propter emergentem turpitudinem, non abs re fore duximus, prius prophylacticam therapeutica præponere, quia tutius & facilius est prævenire, quam præveniri & curari.

Variolas
prohibere
nec facile
nec tutum.

Quomodo
quidam ju-
diciæ pro-
hibere pos-
se Variolas
refertur.

Prohibere autem Variolas ne eveniant, satis tutum non est nec facile, si natura semel hoc orgasmo concitetur: refert tamen quidam magnæ autoritatis Vir, hoc facili negotio & sine omni periculo fieri posse, ejus verba sunt hæc: *Quamprimum nascitur infans, antequam obstetrix ligamentum seu venam umbilicalem liget & abscindat, opus est, ut illum sanguinem & humorem, qui penes umbilicum stagnat, digitis premat & retropellat, quia ille tanquam inutilis & corruptus humor, causa est Variolarum & Morbillorum.*

Quidam
causam Va-
riolarum in
humore
in vena
umbilicali
contento
statuunt.

Quin imò scio equidem quosdam nunc esse Neotericos, qui hæc experienciâ (si tamen experientia est) commoti, audacter asserere audent, causam Variolarum unicam in resectione hujus funiculi umbilicalis coniiciendam esse, si post abscissionem sanguis ante colligationem non exprimatur: Quod si verò sanguis ex ea umbilici parte quæ remanet, digitis probe exprimatur, postmodum primò colligetur, infantem nunquam Variolis, Morbillis, scabie vel abscessibus laboraturum: sequi ergò asserunt, quod præcipua istorum affectuum causa,

causa, in prædicto vitioso sanguine umbilicali contineatur, quod, an ex voto succedat, cunctis liberum relinquo tentaminis arbitrium.

Verius quid mihi retulit Reverendissimus & Amplissimus quondam Regii Cænobii montis Sion vulgò Strahoff Abbas Pragensis, Doctor utpote in Theologicis & omni scibili eximius, ità in Medicis Excellentissimus, meus in Philosophia honorandissimus Professor: qui imprimis de se ipso testatus se ultra sedecim Variolas seu pustulas totà vità suà non habuisse, nec de iis amplius (viro utpote ætate mediam superante) timendum esse impostero: rationem addit, se toties à teneris juventutis annis, corpus purgationibus ab impuritatibus reddidisse liberum, plurimumque causam irritantem sustulisse, quò factum est, quòd labe illa sensim & sensim consumpta, aut saltem mitigata fuerit. Hinc credit (cui & ego non dissentio) hoc in omnibus vel saltem plerisque succedere posse, ut, qui frequentioribus urantur pharmacis, eos ab hoc miasmate aut omnino reddi liberos, aut saltem potiorem illius partem imminuere. Id ipsum pariter insinuat Hæfferus in suo *Hercule Medico Lib. 2. cap. 6. pag. 44.5*

Alius modus se præservandi à Variolis proponitur in *Ephemeridib. Germ. Anno. 2. Anni scilicet 1671. obs. 165. fol. 264. in Scholio*, modus nempe emptionis. Id est, inveniuntur mulierculæ quædam, quæ frequenti superstitione ductæ, Infantes suæ curæ commissos instruere solent, ut ab aliis Variolis infectis infantibus, pro aliquot obulis Variolas certo numero emant; firmâ imaginatione credentes, illos qui emerunt has ingratas merces, proventu pauciori infestari, citius & tutius liberari: qui modus emptionis confirmatur in iisdem *Ephemerid. Anno. 8. id est Anni 1677. obs. 15. fol. 22. ubi notatur*, quòd semper vel plerumque ii ipsi infantes, qui vel ipsi, vel per alios emunt ab infectis, licet paucas patiantur, gravius reliquis decumbant.

Alius modus præservationis, emptionis nimirum,

Præserva-
tio juxta
Dolæum.
Juxta lun-
cken.

Dolæus in præservatione generali, conducere ait *myrrha-
ta, Elixir proprietatis, Tinct. Salutis, Essentiam Myrrhe &c.*
luncken in sua praxi Medica, ait, summum præservatorium
esse, primò, quando statim in initio infantes quaruli esse in-
cipiunt, nullis adhuc Variolarum indiciis præsentibus, *Mer-
curium dulcem* à ðß. ad ðj. & si opus sit, addi, *Diagrid. Sulphu-
rat. gr. ij.* quod lentè evacuat, & levem quandoque conciliat
vomitum atque à Variolis præservat, vel earum portionem
minuit, ut Author feliciter expertus est in duabus propriis filia-
bus.

Optimus
præserva-
tionis mo-
dus.

Cùm vero vulgus, & potissimum Nobiles, in tantum
Variolarum timeant contagium, optimum erit, si tunc hoc
morbi genus grassetur, vitare primò omnem cum infectis con-
versationem, & eos, qui nondum experti Variolas, in aërem
salubriorem, (in aëre enim maxima vis præservationis con-
sistit) in quo nullæ regnant Variolæ, quantocyus transferre,
& tamdiu ibidem continere, donec aut cessarint, aut benigni-
ores evaserint Variolæ, in quo casu, si benigniores sint Vari-
olæ, hoc est, facilè & paucæ erumpant, citò suppurentur; &
decidant sine notabili faciei defædatione, illam modo dictam
mutationem non suaderem sed satius foret, infantes sanos cum
ægris vivere, ut Variolis boni moris, & levioribus corripian-
tur. Non minus ad præservationem facit, infantes tùm pur-
gantibus medicamentis, tùm venæ sectione, si vires & ætas fe-
rat, corpus evacuare, & aptis ad hæc remediis temperare,
de quibus fusiùs in febre synocha.

Medica-
menta fa-
ciunt ad
præserva-
tionem.

Hic solummodo addam, quædam remedia prophyla-
ctica & præservativa præter supra dicta, partim à me, partim
aliis famosioribus Practicis usu & experienciâ comprobata.
Præmissis nempe, ut diximus, universalibus, sequentia dari
possunt

Potus

Potus præservatorius Grülingii.

Potus præ-
servans.

℞. Aq. Acetof. Card. bened. Borrág. aa. ʒj vʒ.

Syr. de succ. Citri. Card. bened. de succ. Borrág. aa. ʒij.

M. Dosis Cochlear. ji. vel jv. habitá ratione ætatis
semel vel bis de die.

Vel Pulveres mei præservatoriæ.

Pulveres
præservan-
tes.℞. Crystall. Tartari ʒj. Tartari Vitriolat. ʒʒ-
Salis seu facul. Acetofell. ʒj.

M. Dosis à ʒʒ ad ʒʒ. manè in jusculo.

Vel. ℞. C.C. phil. ppt. Ocul. 9. ppt. (si divites sunt)

adde Margarit. ppt. Corall. rub. ppt. aa. ʒj.

M. Dosis à ʒj. ad ʒʒ. in vehiculo quocunque vel ju-
sculo manè & vesperi, quatuor horis ante prandium, duabus
horis ante cœnam sumendus. Sunt hi Pulveres efficacissimi,
Archæum seu orgasmum, seu fermentationem imminuentem
præservandi, irruentem mitigandi, & præsentem non impe-
diendi; nam acida, ut testatur Horstius in *Epistol. de Chirurgia
infusoria* ad *Danielem Majorem*, in malignis morbis non sunt
fugienda.

Vel, pro evacuatione vitiosorum humorum & liquo-
rum, idest, causa Variolarum & Morbillorum, optimum est
præservativum *Rhabarbarum* à ʒʒ ad ʒj. plus minus, pro ra-
tione ætatis, grosso modo incisum, & in nodulum inclusum,
in cerevisia vel potu ordinario suspendatur, de quo quotidie
bibat aliquot cochlearia, tamdiu, quamdiu opus videbitur.

Rhabarb-
rum etiam
in præser-
vando lau-
datur.

Vel sequens *nodulus*, qui non tantum præservando servit,
sed etiam in actuali morbo, in nimia constipatione alvi tutissi-
mus & excellens est.

℞. Rad.

Nodulus
præservas.

℞ *Rad. Fœnicul. Cichor. aa. ʒj.*
Rhabarb. el. ʒʒ.
Sem. Aquileg. ʒij.
Cinamom. ʒij.

Incisa, dentur ad nodulum, infundendum in Cerevisia vel potu ordinario, de quo bibat, & continuet quousque opus erit & Medico videbitur.

Rotulæ

Vel Rotulas ℞ *Rotul. de spec. liberant. ʒij.*
Dosis Nò. 3. vel 4. omni mane.

Vel Pulverem præservativum Grülingii.

Pulvis.

℞ *Spec. liberant. Diamargarit. frig. aa ʒʒ.*
C. C. phil. ppt. Terr. sigillat. aa ʒʒ.
Margarit. ppt. Corall. ppt. aa gr. viij.
Lap. bezoar. orient. gr. v. vel vj.
fol. auri No. 1v.

M Dosis ʒʒ. ad gr. xv.

Myrrha &
Castoreum
etiam sunt
Præserva-
tiva.

Vel *Myrrha* & ex illa præparata remedia, uti est *Essentia Myrrhe* ita etiam *Essentia Castorei simplex* quam composita è Castoreo & Asia fetida cum Tinct. Tartar. extracta, tam præservativè quam curativè multum laudantur.

Præferra-
tionismo-
dus ad me-
tem *Diem-
merbroeck.*
Syrupus
Pro infan-
tibus.

Diemmerbroeck svadet, corpora à superfluis humoribus ad minimum semel singulis septimanis evacuanda, idque *Pillulis Ruffi*, quæ expertæ sunt, quarum *Dosis* Numero 1. 2. 3. 4. vel 5. in adultis. In infantibus autem valet *Syrup. de Cichor. c. Rhab.* pro atatis constitutione, cavendo cathartica, quæ humores & totum corpus turbant. In plethoricis vena mittatur, vel menses, vel hæmorrhoides moveantur & aperi-
antur.

CAPUT.

CAPUT IX.

De Curatione Practica Variolarum & Morbillorum.

Proposita curâ Prophylacticâ, ad curam Therapeuticam accedamus necesse est. Patet autem, curam therapeuticam veram & methodicam Variolarum & Morbillorum, *quatuor* scopis seu indicationibus perfici posse, quarum *Prima*, in humorum & liquorum quantitate peccantium evacuatione & minoratione versatur, ut nimirum naturæ impedimenta quævis auferamus, & sic sanguis Variolarum fermento inquinatus & coagulatus, in corde & vasis sine stagnatione motum adhuc æquabilem retineat, & effervescent, portiones cum veneno congelatas forâs propellat, interim cavendo, nè fermentationis, seu effervescentiæ opus ullatenus cohibeatur, aut nimium proritetur, hæc enim, cruoris massa plus debito in portiones congelatas agitur, istâ restringitur nimis in motu, & sic nec particulæ venenatæ cum cruore gelato forâs amandantur; natura autem à secretionis & expulsionis opere impediri solet, nimia excrementorum congerie in visceribus, aut sanguinis exundantiâ in vasis, quare oportet evacuatione succurrere, vias clausas aperire, humorum & liquorum crassiciem, tenuitatem, asperitatem, volatilitatem & fervorem corrigere &c. *Secunda*, in motu naturæ & particularum fermentantium expulsionem adjuvandâ. *Tertia*, in malignæ & venenatæ qualitatis oppugnatione. *Quarta*, in virium conservatione, & symptomatum correctione, partiumque tam internarum, quam externarum, nè lædantur defensione.

Ut verò hi scopi & indicationes obtineantur, in usum *Hæ indicationes per-* vocanda veniunt, tria Medicorum necessaria, seu fontes *ficiuntur* *Practica,*

Curatio
practica
Variolarum
& Morbillorum, per-
ficiturque
quatuor in-
dicationibus
Indicatio
I.

Quædam
in hac in-
dicatione
observan-
da propo-
nuntur.

II.
III.
IV.

tribus vul-
gò distis
fontibus.

æta, Chirurgia & Pharmacia : ii enim veri fontes sunt salutis, ex quibus Medicus optatam ægris propinat sanitatem, ex his totus cardo curationum desumitur, eos quapropter in sequentibus singulos ordine prosequemur, hæc tamen extraordinariâ methodò, ut nimirum remediorum in particulari admistratio tantò securior fiat, lubebit in gratiam tyronum curationem sequentem purè practicam ponere, id est, eò modò concinnatam, prout hodie à peritissimis Practicis (adhibitâ tamen diversitate subiectorum) in usu quotidiano observatur: in quem finem, quædam scitu & in praxi feliciter peragenda dignissima præmittimus.

Pro felici-
ter perage-
da pr xi
quædam
scitu dig-
næ annota-
tiones.

Infantes
lactantes
per Nutri-
cem curan-
di.

Vinum pro
Nutricibus
medicatu.

Unde Nora, Quamprimum ergò advertitur, quòd Variolæ & Morbilli quoddam subiectum afficiant (quod ex signis supra recensitis facillè patebit) naturam statim debitis & ad hanc rem aptis remediis adiuvere, morbum verò ejusque causam impugnare oportet; ante omnia autem observandum & videndum, an infantes sint lactantes, an non, an minores, an majores ætate: si adhuc lactantur, per nutricem curandi, ut infra docebitur, idque ratio & praxis docet, vis enim medicamentosa, & sanguini & lacti communicatur, hoc ipsum attestante Hippocrate & Galeno 6. *Epid. sect. 3. text. 34.* Hinc quando quidam liberis suis, de malo quodam quasi inevitabilitiment, antequam ebullitionis seu effervescentiæ ullum signum appareat (& quidem non malè) suaviter eos per nutricem purgant, & dietam strictiorem præcipiendo, à pulcra abstinere, tùm ante morbum, tùm etiam toto morbi tempore, ut cacochymiam omnem maturè tollant, & signaturæ duplex onus & labor, in vincendo morbo & ejus causâ, non relinquatur: atque ob hanc causam Horstius *Tom. 2. pag. 308.* Nutricibus hoc tempore præscribit sequens *vinum* per quinque vel octo dies in prandio bibendum: *R. Passular. min 3ij. fol. sen. el. 3j. Rhabarb. el 3j. vel. 3ij. sem. Fenicul. 3ij. Macis Cinnamon. 3j. vel 3j.* Infundè in *Vini ten-vioris* sextariis duobus,

& post 24. horas cola & exprime. Concedit autem Author hoc vinum inter prandendum, in eam scilicet intentionem, ut lenientia cibis mixta ipsius nutrimento imprimantur, quod denique in lac versum & infanti propinatum, ut ipsum suaviter purgare possit.

Quando
iudicet. m

Præterea ipsis infantibus per os exhiberi possunt quædam aquæ expulsiæ, cochleatim manè & vespèri exhibitæ. Videntur aliquot grana *pulverum* inferius describendorum in vehiculo quocunque. Vel etiam Nutrix omni manè & vespèri sumat bonum haustum *cerevisiæ* vel *jusculi calidi*, incoquendo *Radicem Calami Aromat.* & *Pimpinellæ*. Ettmüllerus svadet, ut nutrix quæ lactat infantem Variolis vel Morbillis detentum, quotidie utatur in potu ordinario vel jusculis *Gelatinæ C.C.* cochleatim.

Infantibus
propinan-
da remedia
per os.

CAPUT X.

De Venæ Sectione in Variolis & Morbillis.

Magna, & magni momenti, inter multos Clarissimos Viros (quorum aliqui eam necessariam, aliqui nullo modo administrandam censent) est controversia, nos, quantum licet, ut rei difficultati satisfaciamus, hanc materiam suis pro & contra enucleabimus, & quænam tandem nostra sit hac in re intentio, candidè exponemus.

Sanguinis
missio in
Variolis &
Morbillis
an conveni-
at disqui-
ritur.

Qui ergo Venæ sectionem in hoc morbi genere necessariam esse laudant, hoc modo discurrunt: nimirum, si ante eruptionem magna Variolarum & Morbillorum suspicio & ebullitio adsit, humorumque & liquorum putrescentium sit plethora seu multitudo, ætas & vires ferant &c. injectio prius

Discursus
illorum qui
venæ secti-
onem in
Variolis
&c. admit-
tunt.

aliquò suppositoriò vel levi enemate, secanda est vena, idque non tantum semel, sed iteratò si opus sit, ut scilicet humor & liquor effervescens & abundans, hâc evacuetur, & natura oneris parte levetur, sic etiam postea alacrius expellat, meliusque transpiret corpus, alioqui enim periculum est, nè natura oppressa multitudine & turbatione, nihil deponat in superficiem, aut tantum morbi partem, vel nè materia orgasmo concitata, ruat in partem principem.

Helmont
Venæsectionem
damnat.
Ejus Argumentum.

Neque audiendus est hic cavillator *Helmontius*, qui contrarium docet contenditque Venæ sectionem non solum in Variolis, sed & in omnibus febribus inutilem esse, quod probat hoc modo: *intentio perpetua nature sanandi febres est per sudores, ut patet in paroxysmis intermittentium, huic autem intentioni è diametro oppositur Venæ sectio, Ergò.* Quàm falsum

Ejus optimo
experientiâ
refutatur.

hoc sit argumentum patet cuique, nam quis quæso sanus dixit unquam, febres semper sudore solui, cum experienciâ teste sepe sæpius hæmorrhagiâ narium, hæmorrhoidum, uteri &c. solvantur. Hisne ergò Venæ sectio contrariatur? sanè unquam.

Quando
secanda sit
vena.

Secanda autem est Vena, nondum apparentibus, ut dictum, Variolis, in morbi principio, cum materia fervet in venis, nequaquam illis prodeuntibus (exceptò casu quem mox subnectam) nè motus criticus invertatur ab extra ad intra; quamvis alii sint, qui asserant, Venæsectionem ad circumferentiam trahere non ad centrum, quod probant à paritate: Cucurbitulæ scarificatæ ducunt ad circumferentiam, ergò & Venæsectio, eadem enim utriusque est ratio; sicut enim cucurbitulæ trahunt ex capillaribus, capillares rursus ex proximis venis, ita pariter venæ brachii vel pedum, trahunt ex venis interioribus, Ergò: hoc quidem dici potest, quod respectu materiæ extra venas stabulantis, per venæsectionem illa materia in venas rapiatur, & sic etiam fieri possit tractio ad intra ob motum vacui, nam & idèò quodcumque venam secamus primam regionem corporis liberamus ab excrementis, nè illa

Aliqui à
paritate
probanda
Venæsectionem
ad peripheriam
trahere.

Quo sensu
dici possit
tractio ad
intra.

illa ab alvo rapiatur ad venas. Verùm hoc intelligendum est de larga Venæ sectione, ut quidam volunt, imò secundum nos, etsi larga instituat, tamen hoc non est timendum, siquidem venæ tunc inaniuntur, concidunt & nullum relinquitur vacuum, ut autem de Venæ sectionis eventu sis securior, statim post eam cucurbitulas siccas plures, infra dicendis partibus externis admove, ex *Riverii* sententia.

Præterea doctè ac enucleatè hunc scrupulum (deturbatò ex sanguinis missione naturæ conatu) eximit, & rem ipsam, prout oportet, optimè distinguit *Caspar. Caldera de Hæredia* in suo *Tribunali Medico Lib. de Variolis Cap. 9, Neque ex hac sanguinis missione*, inquit, *Variolarum timeas retrocessum vacui ratione*, hic enim timor tantum locum habet, ubi nulum restat super vacuum. & materia criticè operatur, omni materiâ extra venas propulsâ, tunc enim est impetus excernendi expectandus, non autem cum symptomatice natura irritata elicit, & restat adhuc in venis vacuandis auxilii oppositio, nempe multitudo, quod tibi æquâ lance perpendendum fuerit.

In quo casu sit timendus Variolarum retrocessus, & in quo non?

Et *Ludovicus Mercatus, de Pueror. Morb. Lib. 2. Cap. 22. Num. 17.* æquâ sane lance isthæc omnia perpendit & ait: sciendum est huiusmodi Morbillos & Variolas exituræ, semper comitem habere certum quendam continentium febrium modum, & certam naturam quæ necessario, tum plenitudinis majoris aut minoris, aut ratione ejus dispositionis, quæ in vasis contrahitur propter succorum effervescentiam, prærequirit evacuationem, & eam per sanguinis extractionem, quo præsidio magni momenti consequimur beneficium, tum quia plenitudo deponitur, quâ depositâ, natura redditur potentior ut supra dictum, supra resistere facilius expellat, tum quia compescimus fervorem, & ex consequenti minuius plenitudinem eam, quæ ex fervore causatur; hæc *Mercatus*.

Ulterius id ipsum confirmatur & Venæ sectionis utilitas in hoc casu demonstratur.

Has rationes confirmat experientia, quâ post venam sectam in Variolis, sedato sanguinis fervore, humorem à natura

Ab experientia in dicto casu

Venæsecti-
onis præ-
sidium con-
firmatur.

melius coqui, & in pus optimum converti videmus, quam proinde methodum, ab Arabibus præcipuè, & Veteribus acceptam, feliciores practici & Medici rationales felicissimo successu imitantur, quin imò ipsa natura, optima Medicorum Magistra & morborum Medicatrix, Medicum sæpe præveni-ens, copiosam per nares hæmorrhagiam instituit, ut faciliorem Morbillis aut Variolis sternat viam ferviditatemque inibi delitescentem extinguat.

Exempla
felicitum
et cessum
per Venæ
sectionem.
I. exem-
plum feli-
citer cele-
bratæ.

Exempla felicissimorum horum eventuum ex Venæsectione, & malorum successuum ex ejusdem intermissione, undique apud Authores palam prostant, quorum duo notatu digna legere poteris apud *Thiermaier*, primum, de Iuvene Barone Ingolstadii, qui non tantum sine virium jactura, sed magnam febri, cum symptomatum sublevatione, sanguinis per intervalla ad 3 libras medicas per nares profudit Variolis interim copiose & feliciter undequaque erumpentibus; si autem è contra sanguinis hoc profluvium, per nares semel tentatum, sed intempestive turbatum & impeditum fuerit, nemo facile dixerit, quanta mox subsequi solent pericula, & quidem tunc præcipuè, quando imperfectum hunc conatum seu motum naturæ, per Venæsectionem Medicus supplere negligat, vel non audeat, vel non possit, id quod alterum exemplum, à citato Authore ex Osvaldo Gremio, in sua *Arbore ruinosa* excerptum *Lib. 2 cap. 3. Num. 55.* satis funestum demonstrat, Nobilissimæ Virginis jam adultæ, quæ, cum tempore hyemali Mense februario, ex prædio in proximam civitatem, jam jam languens corpore ad parentes veheretur, sanguinis hæmorrhagiam in itinere passa est, utcumque copiosam, sed ob frigus externum, sine dubio impeditam aliquatenus, dum dum perventum est, dorsi molestissimus dolor & vomitus aliaque succrescebant symptomata, ita ut de Variolis dubitaretur, & de sanguinis missione in Virgine pulcherimâ bene nutritâ, ac menses nondum expertâ cogitabatur, sed absterruit ab hac sangui-

II. infelici-
ter omiffæ.

sanguinis missione Medicos aliquos hyemale tempus, & præ-
sentes reperiti vomitus, & interim adhibitæ sunt frictiones
molliores, iniectus clyster lenior, ad dolorem dorsi emplasti-
ca ex Foresto *Lib. 6. obs. 49. in scholio* adhibitæ Aquæ confor-
tativæ cum bezoarticis administratæ, sed omnia incassum;
quin imò tandem, auctis dorsi doloribus, Variolæ paucæ,
sine dorsi sublevatione prodierunt, factaque lucta ingens inter
morbum & naturam, donec succedente sanguineo vomitu,
sanguineis urinis, Variolæ purpurefcerent & disparerent, &
Nobilissima Virgo extingueretur.

Accusabatur (& vix non meritò) intermissa Venæsectio, Medico-
rum quo-
rumdam
mala con-
suetudo.
nam revera Medici quidam aliquando sunt timidi, & quan-
doque potius ad vulgi, præsertim edentularum Vetularum
obtestationes cavendas, quàm ad rerum momenta intenti;
ac licet videant aliqui eorum subinde meliora, eademque
proben, attamen in aliorum gratiam, & nè gratiam alicujus
rugosæ Megaræ perdant, consveta sequuntur: Nè forsan quis
meticulosus obiciat, dicendo, in dicta Virgine sanguinis
missionem vomitus & tempus hyemale impedivisse. Sed
Resp. 1mò de vomitu cum Caldera de Heredia, qui loco citato
ita loquitur: Nec deterreat à sanguinemittendo vomitus, ne-
que fluxus ventris si profusus non est, neque catarrhus aut ven-
tris dolor, aut fugax etiam borripillatio, quoniam hæc solent Va-
riolarum expulsiõem præcedere, & pleraque alia complicata &
varia accidentia, quæ post sanguinis missionem, aut scarificatis
aut sicis cucurbitulis sedabis. Resp. 2do de tempore hyemali,
longè minor est quæstio, & difficultas nullius momenti, mor-
bus enim, quocunque tempore invadit, sui medelam seu sui
ablationem postulat, eò citiorem quò gravior incumbit mor-
bi moles, accedit, quod sanguinis missio à nullo instanti sy-
dere inhibetur, si præsens affectus aut necessitas exigat: satius
proinde est maligni Saturni, hoc est morbi cuiuscunque,
falcem fugare, quam benignum Jovis aut blandum Veneris
concur-

An sym-
ptomati-
quorum-
dam præ-
sentia vel
anni tem-
pus veræ-
sectionem
prohibere
possint.
Responde-
tur 1mò
quoad sym-
ptomata.
Respon-
detur adeo

Signa quibus præsentibus venæsectio necessariò adhibenda.

Confirmatur id à Galieno,

concursum (vel ut moraliter id explicem ad statum præsentem, quam benignum Jovis, id est, magni Domini, vel blandum Veneris, id est, alicujus magnæ Dominæ consensum) lethali cum periculo expectare vel sequi. Itaque ubi magna ebullitio, sanguinis copia, febris & calor intensus oppressiones pectoris, vires sufficientes, tunc certo in principio morbi, hoc est, tempore effervescentiæ, sanguinis missio necessaria erit, nam teste Hippocrate. 2. Aph. 29. *In morborum principio si quid morvendum videtur, morve.* Quod confirmat Galenus *Libro de curandi ratione per sanguinis missionem Cap. 9.* primos principesque sanguinis mittendi scopos esse, morbi magnitudinem & laborantis vires.

In qua ætate possit celebrari. Minoribus conveniunt hirudines.

In melancholicis hirudines hæmorrhoidibus applicandæ. Nostro iudicio in pusillo venæ sectio non est tutâ.

Et hæc de Variolis in genere, an, & quando fieri debeat: restat nunc, an in quacunque ætate celebrari possit? pro quo *Resp.* breviter: si minores sunt, applicandæ sunt hirudines una vel duæ, ad medianam venam brachii quæcunque comparentem, vel etiam cucurbitulæ siccæ vel scarificatæ, quod melius est, brachiis, præsertim natibus, dorso & pedibus applicatæ, & si opus etiam bis repetitæ, quæ valenter attrahunt ad habitum corporis; si autem pueruli sunt melancholici, præferrem hirudines esse applicandas venis sedalibus seu hæmorrhoidibus (id ipsum in adultis est observandum) hic enim applicatæ, trahunt immediatè ex anastomosi seu extremitate venarum, non autem si medianæ brachii applicentur. Venam autem secare in pusillis (quamvis Parisienses & alii audaces famosi, etiam in lactantibus administrent) meò quidem iudicio nec semper, nec adeò tutum videtur, quia teneritudo tam fortia & generosa remedia vix suffert, difficilius admittit, & difficillimè tandem adhibetur, & quamvis aliquando successisse in talibus constet, quod tamen rarum, id potius fortunæ, ut aliqui dicunt, adscribendum est: levioribus itaque, & multò tutioribus, in tam teneris contentemur.

Ego

Ego tamen in praxi observavi, & sæpius feliciter à me practicum est, si magna aderant symptomata, & panes plenitudo, in quinquennis & sexennis (taceo adultiores utriusque sexus) semper feliciter adhibui Venæsectionem, hoc tamen præmissò, quod paulò ante Venæsectionem, unum generosum expellens sumperint, quò mediante, natura ab intra ad extra stimulata, nullatenus timenda erat per Venæsectionem retractio humorum. Venæsectione autem in debita quantitate peractâ, desuper duo vel tria cochlearia alicujus cordialis expellentis, & sic Deo Laudes semper feliciter cessit, præsertim in casibus desperatis, ubi oppressio cordis & convulsiones urgebant, In adultioribus, ut sequitur, semper secutus est bonus effectus.

At in quinquennis & sexennis & c. semper feliciter adhibuimus.

Anre & post venæsectionem semper sumenda expellentia.

Fieri autem debet primâ vel secundâ, vel ad summum tertiâ ebullitionis seu effervescentiæ (quod notanter dico) die, cardiùs enim non facilè, nec securè, quin imò nisi magna adfit vasorum & virium plethora, magna quoque anhelitùs oppressio & exinde anxietas, dolores, & alia urgentia symptomata, quæ te ultro citroque ad venam secandam stimulent, præsertim si præfatum brevissimum exhibendi tempus præterierit, satius & longè felicius in praxi feceris si eam intermiseris, quam administraveris, tali enim pacto, cum sanguis & liquores, & iidem prurientes spiritus in motu positi, quâ datâ portâ ruant & dissipentur relicta vappâ & liquorum resolutione, quam virium resolutio, mox etiam ipsa mors sequitur. Si autem 7. 10. 15. vel 18. aut plurium sit annorum & supra indicantia & coindicantia adsint, venam tutò ac licitè secari posse, nullum est dubium, sed necesse & opportunum.

Venæsectio ad summum primis tribus diebus ebullitionis administranda, serius cavenda.

Rationes.

In adultioribus satius secatur.

Neque obstat autoritas Galeni *de curandi ratione per sanguinis missionem* Cap. 13. & alibi, ante 14. annum venam non esse aperiendam, quia corpus resolubile est, & facile dissipabile. Galenum sequuntur multi, quos inter est Ioannes Baptista Sylvaticus, Mediolanensis *Lib. Controvers. Medicar. Controversia* 88. Sennertus *de febris* Lib. 4. Cap. 12. sed tamen

Autoritas Galeni prohibens ante 14. ætatis annum venæsectionem.

Respondetur ad authoritatem Galeni.

Mos Germanorum tardior in venæsectione incassatur.

Nostri conclusio & sententia de Venæsectione.

- I.
- II.

Natura Venæsectionem esse salubrem ipsa nobis demonstrat.

cum distinctione. Huic quoque subscribit ex Recentioribus *Thomas Willis* & plures alii. His accedit mos Germanorum, qui ad sanguinis missionem in pueris, magna ex parte tardi sunt, vel illam etiam plerumque negligunt. Nam primò responderetur ad authoritatem Galeni, quod imprimis eisdem plerique Mauritanorum Medici, præsertim *Cornelius Celsus Latinus*, & quasi omnes Recentiores adversentur, & quidem ex firmis rationibus & experientiis infra ponendis; & sic quoque facile cadit ratio *Sylvatici* ab eodem Galeno deprompta: Morem tardiorē, & quandoque negligentiam in Venæsectione Germanorum quod attinet, audi respondentem Bartholinum in sua *Cysta Medica* loculo 58. *quest. 5. credo, inquit, hanc apud Germanos religionem & morem, pueris naturæ sanguineis & acuto morbo vexatis, sæpe fuisse exitii causam.* Quamobrem his præmissis concludo, &

Dico 1^{mò} in Pueris (uti omnes Recentiores tenent) qui in regionibus calidis habitant, quibus nimirum sanguis copiosus calidus ac spirituosus est in venis, tutò sanguinem mitti posse ac debere, si morbo aliquo acuto præhendantur. Itaque Hispani, Galli omnes, & Itali plerique. Unde subsumo &

Dico 2^{dò} Infestantibus & magnum periculum facessentibus morbo acuto & Variolis, sanguinem quoque nostris pueris in Germania rectè mitti, quando iis sanguis copiosus, calidus & spirituosus est in venis. Si ebullitio magna, febris intensa, respiratio difficilis viriumque robur pro ætate adsit. Rationes pro hac sententia sufficientes, mox supra de Venæsectione in genere attulimus, quas sufficientes ni fallimur existimamus, & sufficiat nobis, & ratio, & experientia, & analogismus, quæ omnia nobis ipsa natura, optima morborum medicatrix, dictat & inculcat: Notissimum enim & compertissimum omnibus Medicis est, si ante Variolarum eruptionem, larga contingat narium hæmorrhagia spontanea, illam feliciter & cum ægri levamine fieri, febrem imminui, & Variolas

facilicis

facilius & minori copiâ prorumpere: Non negamus quidem talem hæmorrhagiam post eruptionem aliquando infelicitè cessisse, præsertim quæ limites excessit, vel contrarium naturæ motum exercuit & concitavit. Probatèr ulterius: Morbi etiam puerorum, ab effervescente sanguine ejusque copiâ orti, ex natura indicantis postulant sanguinis eventilationem & evacuationem. Nec obstat hic virium debilitas, aut tenuioris corporis dissipabilitas in pueris, cum non agatur de magna & copiosa sanguinis evacuatione, de qua Galenum illo loco locutum, multi interpretes fuisse putant, sed de parva tantum, & junioribus corpusculis pro ratione loci & morbi comperenti sanguinis missione. Ac proinde putat *Zacutus Lusitanus*, Vir in Veterum lectione planè versatus *de Medicorum Principum historiis Lib. 3. hist. 80. quest. 47.* esse absurdum credere, Galenum venæsectionis aliàs amantissimum, hoc auxilium in pueris tantopererecusasse: Hinc ut dictus *Zacutus* suam hanc sententiam de sanguinis missione puerorum magis confirmet, variè tum *Galeni*, tum aliorum Veterum *Hippocratis, Pauli, Aëtii, Oribasii, Avicennæ, Avenzoaris, Rhasis, Averrois, Actuarii*, præter plurima Neotericorum testimonia pro se adducit.

Præbatur
ulterius
Venæsectionem
convenire.

De quâ
venæsectione
fuerit
locutus
supra
Galenus.

Itaque ratio mittendi venam in variolantibus & morbilantibus non solum in Hispania, India, Gallia, Italia hodie multiplici experienciâ increbuit, & infinitis pueris felicissimo eventu confirmata est, teste *Septalio Lib. 4. Animadvers. 8.* Verùm etiam non desunt ex septentrionalibus Medicis, qui hanc ipsam Venæsectionem servatâ moderationis lege, commendent: nam præter *Zacutum* locò supra citatò natione quidem *Lusitanum*, sed in *Holandia* praxim facitiantem, *Sennertus* prudens Germaniæ Medicus *Lib. 4. de febrib. Exper. 10.* Venæsectionem in pueris Morbillis & Variolis laborantibus absolute permittit, & si vires & plethora adsint, venæsectionem, ait postulari. *Plempius* Doctor & Professor *Lovanii* quon-

Authores

varii citan-
tur æque
in Germani-
æ infan-
tibus venæ
sectio nem
commen-
dantes.

Confirma-
matur Ven-
æsectio-
nem in pu-
eris esse
convenien-
tem.

Variz Au-
thorum ex-
perientia.

Conclusio
III.
Quando
que etiam

dam eximius *Lib. 6. fundament. Medic. Cap. 4.* sanguinis mis-
sionem certo annorum termino definiri non posse putat, cum
sint senes & pueri qui eam faciliè ferant. Idem confirmat
Melehor Zebitius in *Disp. Med. de Venæsectione habitâ Anno*
1602. Thesi. 78. Idem Ioannes Fuchsius in *compendio de Pur-*
gatione & Venæsectione part. 2. cap. 4. ubi multis docet com-
petere venæsectionem pueris illis qui natu admodum parvi
sunt. Hœfferus in suo *Hercule Medico Lib. 7. Cap. 6. ad finem*
ita in rem nostram loquitur: quod venæsectionem attinet, eam
in principio adhibere ubi febris valde est intensa, corpus pletho-
ricum, & vires constant etiam in pueris, quia spontaneâ super-
veniente hæmorrhagiâ narium, aliquando plurimum juvantur,
nihil vetat, & tantum abest venæsectione naturæ cursum inpe-
dire (licet proximè immineat exanthematum eruptio, vel jam ali-
quot maculæ compareant) ut eam insuper juvare possint. Idip-
sum tenent plures alii hodierni Medici, quos omnes adducere
nec scribendi nec legendi tempus patitur, quibus tamen om-
nibus experientias meas mox additas ante, in memoriam revo-
care volui, & iisdem adiungere luculenta experimenta famo-
sissimi nostri antesignani *Nicolai Franchimond, 44.* Annis in
Universitate Carolo Ferdinanda Pragensi Professoris Primarij
ac Senioris & ultra 50. Annos Practici felicissimi, qui infinitos
pueros satis parvos in Morbillis & Variolis etiam præsentibus
jam aliquot maculis vel etiam actualibus convulsionibus, ex
orci faucibus eripuit. Quod idem se fecisse testatur Thierma-
jer *Lib. 1. Cap. 8 fol. 105.* ubi dicit se habuisse in Germania pue-
ros admodum natu parvos etiam nobilissimos è vena secta, vel
si ita videbatur, saltem ad venas brachii appositâ una alterve
hirudine ex morbis acutis sublevatos quos aliâs, si hoc remedio
tractati non fuissent, certò perire contigisset. Quin imò
Dico 3tio, Ubi prævidetur agrum non levare, sed sum-
mum fore periculum ex intermissione venæsectionis, etiam
Variolis jam erumpentibus, secare venam licet, ut sæpius feli-

cissi-

cissimè practicum est hæcenus, testis est, præter alios plures jam citatos, Diomedes Medicis amicus Placentinus *Tract. de Variolis Cap. 40.* his verbis: *Ceterum quando apparent sine alleviatione, & adsunt signa humorum in profundo existentium præsertim cum magna febre & difficultate anhelitis, & non esset facta venæsectio primis diebus cæteris consentientibus, maximè in magna plethoria non esset inconueniens evacuatione uti, sed parca;* atque etiam citatus Author eodem in loco asserit intelligendum & nullatenus reiiciendum, Rhasin *Lib. 10. de re medica Cap. 18.* qui non tantum in initio, sed etiam comparentibus omnibus Variolis venam secare jubet, & sanè cum plerumque maculæ illæ (ut Sennertus *de petechiis Lib. 5. Inst. parte 2. sect. 1. Cap. 17.* directè docet) ab insigni sanguinis solum ebullitione, ac malignorum humorum ac putrescentium fervore fiant, nihilque ægrum juvent, ipsarum gratiâ, necessaria præsidia omittenda non sunt, ac proinde si venæsectio indicetur & vires ferant, non prætereunda. Avicenna *Fen. 4. Tract. 4. Cap. 10.* Venæsectionem instituere s'vadet ante eruptionem; & etiam in magna repletionem post earum eruptionem. Hunc sensum quoque probat Forestus *Lib. 6 Obs. 46. & 47.* Amatus Lusitanus *Cent. 3. Curat. 16.* Nicolaus Fontanus *Respons. & Curat. Medicinal. Lib. 1.* & Gremsius in *sua arbore ruinosa Lib. 2. Cap. 3. de Variolis & Morbillis fol. 430. & 431.* refert casum lethalem ex intermissa venæsectione satis notabilem, rationesque has annectit: in plethoricis inquit Archæus viscerum non ita gliscere potest, abundantia sanguinis oppressus, & si ille rebellis fiat, deponit furoris idæas in cruore, propter quas fit ebullitio, nam fermentum exoticum suscitatur, exinde sanguinis quantitas major efficitur, ut videre est in omphacio, si autem vas nimium repletum foret & omphacium ebulliret, tunc exitum debet habere, aut vas disiliet, sic pariter ebullitione cruoris vasa majora dilatantur. Hic NB. dolor dorsi vehementissimus excitatur, & tandem excitato cruore, stigmata livida in tergo & alibi apparent.

Variolis jam eruptionibus licet secare in pueris venam. Autoritates id confirmant.

Rationes Gremsii cur omissa Venæsectio quandoque mortem intulerit.

Dolor dorsi in Variolis & ebullitio

litione cru-
oris vasa
distenden-
tis.

Ulteriores
rationes
pro Venæ-
sectione.

Si Variolis
urgens
quidā mor-
bus super-
veniat, iis
erumpen-
tibus licet
venæsecan-
da est. Ra-
tiones.
Venæsecti-
o in tali-
bus casibus
adhibita,
max du-
plicanda
sudurifera.
Quædam
pro dicto-
rum de Venæ-
sectione
majori di-
lucidatio-
ne. Anno-
tationes.

I.

Qui igitur Medicorum Archæi sedativum non habent, saltem intermittere non debent remove impedimenta, ut natura deonerata, id est Archæus non impeditus incumbat morbo, id est in se redeat & resipiscat, & tartarô superficie cruoris expulsô de furore remittat, quod ut verbo dicam, inquit Author, venæsectione suo tempore modoque adhibita perfici potest & ratio ulterior datur; nam interdum non erumpunt vitii copiâ & quantitate, naturâ multitudine oppressâ quæ exonerari debet, præsertim si febris perseveret, spirandi difficultas & suffocatio, hi casus lethales sunt: natura enim proparte exonerata, reliquum facilius agreditur & superat, neque sic periculum erit, ut æger ob materiæ copiam suffocetur, experientia enim testatur, materiam sæpe ita luxuriari, ut & interna viscera per anatomen Variolis & Morbillis conspersa deprehensa sint, eandem rationem obtinet si Variolis urgens morbus supervenerit, veluti est pleuritis, peripneumonia, vel aliæ inflammationes viscerum &c. in hoc & simili casu, nullâ interpositâ morâ, erumpentibus quamvis maculis, venæsecanda est, nam Urgentiori semper est succurrendum, & melius est anceps experiri remedium, quàm patientem certo mortis periculo committere, sed illico post venæsectionem ad duplicatam sudoriferi dosin accedendum, sudorque provocandus, ut motus ad peripheriam materiæ per phlebotomiam retractæ concilietur, proinde corpus benè tegendum & calido loco (nè extra aspiret aura in hoc casu funesta) conservandum. Pro summa hic dictorum, nunc bene.

Notandum imò. Si eruptio Variolarum & Morbillo-
rum critica sit, id est, si ebullitio seu effervescencia tantum
depurativa, æger levetur, nec adsint indicantia exigentia Venæ-
sectionem, ea omnino est prætermittenda tanquam non
necessaria imò noxia, quia naturam turbat & à bono opere
diver-

divertit, quod est contra Divum Senem. 1. Aphor. 24.
Quò Natura vergit eò ducere oportet.

Notandum 2dò Si suspecta sit Venæsectio, verbi gratia, quod tempus idoneum jam transactum fuerit, sanguinis abundantia (etiam in adultis) abstrahi poterit cucurbitulis scarificatis, dorso, scapulis, & femoribus admotis, quæ vicariæ sunt venæsectionis, & in statu morbi conferre poterunt, cum motus naturæ à centro ad circumferentiam per eas adjuvetur, ut supra jam dictum. Cujus occasione.

Notandum 3tìò Nihilominus quosdam esse famosos Authores qui & cucurbitulas & hirudines famelicas, dictis partibus admotas improbant, & quidem ob duas potissimum rationes. *Primò* Quia maxime damnosum est primis diebus corpus denudare, quod in similitum remediorum applicatione necessario fieri debet, cum eò ipsò eruptio impediatur. *Secundò* Quia per cucurbitulas laudabilissimus in capillaribus arteriis & venis contentus, & substantiæ aliti proxime appositus & apponendus sanguis extrahitur, & inde vires prosternuntur; Et hæc de Venæsectione in genere & in specie, plura qui de hac controversia legere desideraverit, prò & contra potentia argumenta, adear Doctissimum Tilingium de febribus petechialibus à fol. 231. usque ad fol. 260.

II.

III.
 Quidam
 Authores
 hirudines
 & cucurbitulas im-
 probant
 Ratio hujus
 I.
 Ratio II.

CAPUT XI.

De Purgatione in Variolis & Morbillis.

Sed novanunc oritur quæstio & inter Authores lis de Purgatione utrum nempe conveniat, necne? Ad quam Respondet, plurimos purgationem hoc in morbo tam Veteres quàm Neotericos vituperare, asseruntque unanimiter alium

De purgatione in Variolis quæritur.
 Purgationem multum

moven-

Authorum
in Variolis
pituPerant
Rationes
cur.

Con firma-
tur ex Hip-
pocrate.

Leuior pur-
gatio inter-
dum & be-
nigna in
principio
declinatio-
ne conue-
nit.

Quare lle-
vis & be-
nigna tan-
tum con-
uenit.

Quare in
principio

movendam non esse, præterquam si non respondeat iis de quibus mox infra dicemus. Ratio est, quia pharmaca cum sint acria humorum ebullitionem & effervescentiam adaugent præterea cum corpus extimum exanthematis scateat intrò virulentam materiam revocant moventque motu naturæ contrario, scilicet à circumferentia ad centrum, unde quibuscunque Variolis laborantibus alui fluxus contingit, retrogressio Variolarum, anxietas, virium lapsus & repentina mors ut plurimum consequitur, ut in prognosticis supra notavimus, nam similem pharmaco irritatum alvi fluxum subsequuntur dissenterix, ulcera maligna & curatu difficillima vixque hac evacuatione infringuntur. Adde rationes ex Hippocrate, cum enim Variolæ criticæ sint evacuationes, sinendæ sunt, ut docet I. Aphor. 20. quæ judicantur & judicata sunt perfecte uel morbo, innovato sive purgantibus medicamentis, neque aliis irritamentis seu finito, id est bene operanti naturæ soli & unicæ totum negotium est committendum & Medicus nihil moliri debet. Rationes pro hoc Aphorismo (ut plurimas omittam) desumere quis potest ex Galeno, quæ sunt in cute, inquit, non possunt in alium retrahi der medicamenta, accidit quod hæc febres, antequam maculæ se prodant, mentiantur aliquando formam intermittentium & quod opus est ante perfectam morbi dignotionem statim ad purgantia properare. Verum tamen utilis interdum esse potest leuior & benigna purgatio in principio & declinatione.

Dico leuior & benigna, intellige quæ sit per lenitiva seu minorativa, non autem fortiora, seu electivè purgantia, utriusque ratio data est supra, & dabitur inferiùs, scilicet eventus sinistrorum affectuum qui exinde contingunt. Dico præterea in principio, id est ante eruptionem Variolarum & antequam febris incandescat, quando scilicet infantes sunt velut in neutro decidentix, id est, quando deficere incipit sanitas, morbus

morbus verò incipit adesse, id est, quando nec sunt sani neque ægri, tunc enim abundat cacochymia seu copia vitioforum humorum aut succorum circulantium. Primo aut secundo die antequam natura movere incipiat, utiliter levissimis pharmacis uti possumus, quibus bilis effervescencia, utpote causæ adjuvantis compescitur, prima regio evacuat, venæque mundantur, fitque natura aliquantum levior & potiori onere levata, fit expeditior ad excretionem & expulsionem, teste Hippocrate 2. *Aphor.* 29. Incipientibus morbis, si quid movendum videtur, move, urgentibus, quiescere multò præstat. Ratio Aphorismi pro prima parte datur, quo enim tempore ager minus affligitur, id est, quò sunt validiores, eò tempore magis & securius movendum, quod fit in principio morbi, ubi vires robustæ, & ager minus affligtus, morbusque quandoque tollitur & jugulatur, unico hoc tempore adhibitò remediò. Ratio posterioris est, quòd in statu vires sint debiliores, unde & in nostro casu, vult observandum Hippocrates; Variolis enim apparere incipientibus, purgatio futura est perniciofa & contra legem Hippocr. 4. *Aphor.* 10. purgandum in acutis, si turgat materia eodem ipso die, differre enim in talibus, malum.

Confirmat id Hippocratis Aphorismus. Ratio Aphorismi primæ partis.

Ratio ultimæ.

Quare apparentibus Variolis non liceat purgare. Cavenda est purgatio summo periculi in Variolis malignis.

Cùm autem Variolas inter morbos acutos recensuerimus, consultum est, ut fulciri hac lege, si movendum quid sit, moveatur prima statim die, non autem apparentibus Variolis. Cùm enim hæc expulsio una quasi crisis sit à natura instituta, ab externo quodam agente impediri non debet, tantò autem perniciosior est purgatio adhuc, si his apparentibus maxima simul urgeat malignitas, ut fit in constitutione epidemica, quando plurimi infantes ex morbo intereunt, in quo casu ego satius judico, omninò à purgatione abstinendum, quia in morbis malignis & pestilentibus purgatio quæcunque demum summo periculi est noxia.

R

Con-

Concludi-
tur ergo
levia pur-
gantia con-
venire,

Concludendum ergo, Purgationem fortiorem nullatenus convenire; levem verò in principio & nondum apparentibus exanthematis, ea autem coniuncta ex levissimis medicamentis, de quibus infra, & in pauca quantitate, ne largiori alui fluxus perniciosus conciteretur, quod non fiet, si juxta mensuram eorum fiat administratio, imò exinde multa speranda erunt commoda; quæ jam supra sunt recensita, quibus pro coronide impertior auctoritatem Galeni. *Methodo*, omnes ab exanthematis pestilentibus fuisse servatos, qui ante (intellige leniter) purgati fuerant. Consultum ergo est, ut quamprimum Medicus bene dijudicet, quales

Medico
necesse est,
qualitatem
humorum
& motum
dijudicare.
Medico ratio
& experientia
sequenda est.
Cur ratio-
nem,
Cur experientiam?

tali tempore in Variolis peccent humores, quò iidem vergant, an ad vomitum, an ad secessum, an ad sudores? ut medicamenta singulis convenientia præscribi, ipsorumque motus ac evacuatio utilis promoveri possit: Ideo Medicus *rationem & experientiam* sequi debet: *Rationem*, ut naturam in bono opere non turbet, illam vel contrario motu impediendo, vel à suo opere avocando, nimirum dum illa à centro ad peripheriam agit, per purgantia invertat. *Experientiam*, cum enim experientiâ consistet, quòd in hoc morbo feliciter moveatur materia morbifica à centro ad peripheriam, quò totum natura vergit. eò ducere oportet, ergo eadem quoque experientiâ constabit, motum hunc contrarium malè & indebitè factum, vel sponte, vel ab arte, factum esse infelicissimum.

Nicolai
Florentini
scrupulosa
aut horitas
reiecitur.

Non obstat hætenus dictis auctoritas Nicolai Florentini, qui & ipse clysteres vituperat, taceo alia remedia. Sed nimis scrupulosa est hæc vituperatio, quæ non in virum condatum, sed timidum cadere potest; nam non impediunt naturæ motum clysteres, cum in solis intestinis (nisi aciores sint, de quibus non est sermo) solummodo operentur, natura autem propè cutim & in venis motum suum perficit. Notent autem juniores Practici, ut in actu jam variolantibus

In vario-

&

& morbillantibus, primis aliquot diebus de alvo lenienda & solvenda non sint solliciti, & si tandem necessitas urgeat, fiat hoc potius in infantibus per sola suppositoria, in adultis per clysteres lenes, & sic feliciter ceder.

Dico tandem in declinatione, ubi enim natura semel à morbo evasit victrix, utilis est, ac esse potest purgatio, tum quia materia peccans jam tota est concocta, tum quia reliquæ humoris morbifici utpote concocti evacuari debent, hæc tamen restrictione, si natura per se evacuationem non aggrediatur, quando enim humores criticè evacuantur, purgatione nullâ opus est, nisi crisis fuerit imperfecta, in quo casu medicamentis succurrendum est naturæ, ne reliquæ recidivam pariant juxta Hipp. 2. Aph. 12. quæ in morbis relinquuntur, recidivas facere consueverunt.

Nota, antequam hujus Aphorismi sæpius in praxi occurrentis, ac Medico dogmatico, si debite capiatur, in universalibus magnum adferentis lumen, explicatio instituatur, prius per parenthesis sciendum, quod vulgò in praxi variolantes & morbillantes ante duas vel tres septimanas ab evanescencia Variolarum & Morbillorum non purgantur: ego autem in Morbillis, non autem Variolis, etiam post nonam diem aut summum decimam quartam diem feliciter levem purgationem perfolvi, præsertim in iis, qui impatientes sunt, ut se ab excursionibus contineant. Satiùs tamen & securiùs generaliter esse credo & svadeo, ut quamdiu minima nota aut vestigium, aut macula in cute appareat, non purgetur patiens, siquidem quamdiu aliquid adhuc in cute apparet, tam diu natura adhuc in expulsiōe & motu constituta esse videtur; quando ergò in Morbillis omnia vestigia in toto corpore evanuerunt, & quando in Variolis omnes crustæ in toto corpore deciderunt, tunc tutissimum est purgare.

Jam ad explicationem præfati Aphorismi, præcipit ergò Medico Hippocrates, ut in curatione diligenter attendat,

R 2

fi

tantibus
primis die-
bus alius
monita so-
licitè sol-
venda.

Purgatio
in declina-
tione utilis
est.

Rationes.
Si natura
ipsa evacu-
ationem
bene pera-
gat non est
curanda.

Tempus
ordinari-
um quo
purgatio
in Variola-
rum &
Morbillor-
um decli-
natione in-
stitui solet

Tempus
tutissimum
Explicatio
Hippocra-

tis Aphorismi, quæ in morbis relinquuntur &c.

si quid à morbo relinquatur, id removeat, ne ejusdem recidiva contingat, cum enim unus morbus facile alteri succedere possit, posteriorque sit prior priore, ne hæc contingant, Medicus & opifex & minister Naturæ id congruis remediis evitare debet. Hæc autem sæpius contingere, tum experientia, tum ratione edocemur, de priori nemo dubitat, sed exempla loquuntur, de posteriori verò nullus in re medica fundatus ambiget: clarum ac certum enim est, positâ dispositione morbigica cum virium languore, facile morbos sequi, atqui in convalescente ægro non perfecte judicato, adest dispositio morbigica cum virium languore, adest enim portio morbi prioris, ut supponimus, illa autem portio non est secundum sed præter naturam, ergò morbigica; talis autem morbigica portio, quòd facile morbum renovare possit patet, quia dispositio est ad concitandam novam putredinem, vel in humore vel in morbo ipso: præterea desumitur argumentum à contrario; nam si ideò in perfecta crisi recidiva nulla contingit, quia in ea nihil morbi relinquatur, ergò è contrario in crisi imperfecta certo certiùs contingeret, quia totum non evacuatur. Sed

Ex quibus signis possit agnosci crisis perfecta.

Signa imperfectæ crisis.

Queres, ex quibus autem signis cognosci possit, an crisis perfecta sit, id est, talis, in qua nihil relinquatur? *Resp.* quamvis hæc quæstio in Institutionibus tradita & resoluta sit, eam tamen in præsentia succinctè percurro; perfectæ nimirum crisis signa sunt, si signis concoctionis apparentibus, fiat subita & notabilis excretio & non translatio materiæ, & quidem cum alleviatione in die judicatoria seu critica, per viam aliquam effatui dignam, vel etiam per abscessum ab intro ad extra: Signa verò imperfectæ crisis seu recidivæ sunt contraria, si nempe morbus allevietur non secundum rationem, hoc est, sine concoctionis signis, quod malum esse testatur *Hippocrates* his verbis: *Non oportet fidere iis, quæ ex ratione non levant, neque multum reformidare mala, quæ præter*

rationem.

rationem contingunt; præterea si fiat extra d'em criticum, vel sine evidenti & notabili evacuatione, potius translatione seu abscessu à parte nobili ad nobilem vel etiam nobiliorem, vel ab extra ad intra. quibus adde, si relinquatur oris amaritudo, inappetentia, vigilia, somnus prætermodum, pathemata, corpus à cibo non roboretur.

Notandum autem hic est, quod recidiva alia sit vera, alia non vera: vera accidit in imperfecta crisi, quoties natura non potuit in totum causam morbificam eradicare, sed manet dispositio in materia antecedenti, vel in membro seu parte, unde morbus rursus renovatur. Recidiva non vera est illa, quæ accidit in crisi perfecta ob causam aliquam externam v: g: malam victus rationem, temporis constitutionem, &c. quæ ut non contingat, hæc evitari debent.

Notandum secundò, quòd recidivæ fiant vel in augmento, vel in declinatione: quæ in augmento fiunt, parum temporis interponunt; quæ vero in declinatione diutius. Sed

Obijcies: in declinatione non potest fieri recidiva, si enim natura in morbo superavit multum, ergò in convalescenti multò magis poterit superare parum, & prohibere, ne fiat morbus. *Resp.* esse materiam difformem, cujus pars superata à natura declinationem fecit: remanet autem altera, cum qua natura non pugnavit, vel quòd non fuerit ab illa irritata, vel quòd alia gignatur de novo: unde

Notandum tertio, quòd morbus, qui succedit morbo, vel est ejusdem rationis, quod plerumque fit in recidiva, vel diversæ, sed in hoc casu potius morbum in alium transmutari dicimus, quàm veram recidivam; idque fieri vel errore Medici, remedium intensiorem inducentis contrarium morbum, vel morbo ipso alterum gignente, verbi gratia hæmorrhæm, peripneumoniam, &c.

R 3

CAPUT.

CAPUT XII.

*De Vomitoriis in Variolis
& Morbillis.*

De Vomitoriis.

Vomitoria non nisi in primo principii tempore locum habent.

Longè major quàm de Venæsectione ac Purgatione Authorem est rixa & litigium Vomitoriorum; quod nos non multis lineis, sed paucis verbis solvemus, nimirum illa nunquam locum habere, nisi vel in primo quasi principii tempore, seu statûs decidentis, & quidem tunc in isto casu tantum, in quo saburram copiosæ materiæ peccantis in ventriculo latitare, & naturam ultrò citroque ad illam viam pronam & facilem esse advertamus, hoc enim tempore & modo data levissima Vomitoria obesse non possunt, cùm natura ipsa monstret viam, quam Medicus minister, modo citò, tutò, & jucundè faciat, omnimodè sequi debet,

Probatæ ab experientia vomitus in principio fuisse salutares.

Experientia quoque adstipulatur, quòd in principio subortus Vomitus morbum reddiderit leviores & securiores: si ergò vomitus spontaneus id potest, quid ni etiam faciet iudicio & arte factus; ità sentiunt plerique Neoterici.

CAPUT XIII.

*De Remediis in Variolis
& Morbillis.*

Post universalia adhibita quæ

Vidimus ergò hætenus, quo in casu Venæsectio, Purgatio & Vomitus in hoc morbo convenire possit: videndum nunc, quid ultra faciendum. Igitur post venæsectionem aliasque evacuationes (si tamen necessariæ fuerint) Variolarum expulsio adiuvanda est non solum remediis specificis humores ad

ad cutem propellentibus, sed etiam *diaphoreticis* & *alexiphar.* remedia usurpanda.
macis, præsertim si Variolæ & Morbilli epidemici, & summæ malignitatis adferant periculum, hæc autem in particulari Præxis hodie usitata.
 seu in praxi hodie sic absoventur, ac imprimis *Suppositoria* Suppositoria qualia esse debent.
 quod attinet, illa in hoc affectu non debent esse acria, neque ullò medicamento irritante nimium naturam constare, sed sufficit si ex solo melle ad debitam consistentiam cocto, vel ex lardo vel rad. petroselini, vel ex solo butiro in aqua frigida loto: vitanda autem illa, quæ fiunt ex Sapone, Sale, hiera, & similibus, quæ acrimoniam in se continent: Ratio, quia licet alvus toto morbi decursu si adstricta sit, blandissime sollicitari possit, non tamen nec potest, nec debet irritari.

Clysteres seu *Enemata* bona & secunda hoc in morbo sunt hæc maxime ab initio, & postmodum non nisi urgente necessitate, applicata.

Clysteres boni & tuti in principio præcipue usurpandi.

℞. Malv. cum toto. fol. Violar. Parietar. Endiv. aa. Mj. flor. Chamomill. Mj. Rad. Alib. ʒβ. sem. Fenicul. Lentium decortic. aa. ʒiij.

Coque in f. q. Aq. Hordei. Colaturæ ℞. (si est parvus) ʒiv. vel v. (si major seu provectæ ætatis) ʒix. vel ʒx.

Cassia extract. (si parvulus) (ʒβ. (si major) ʒvj.

Vitell. Ovorum. Nō. j. vel. ij.

facch. Thom. alb ʒβ. ad ʒj, plus minus.

M. f. Clyster,

Vel. ℞. Decoct. hord. cum Lentibus excort. ʒij. vel ʒiij. facchi ʒix. vel ʒx. Cassia pro Clysteribus ʒiij. vel ʒvj. facch. Thom. ʒvj. vel ʒx. Vitell. ovorum. Nō. j. vel ij.

Mc. f. Clyster, ut ante.

Vel

Aliæ mate-
riæ pro cly-
steribus.

Vel fiat *Enema* ex lhusculo vel lacte cum saccharo aut decocto bordei passul. liquirit. & vitellis ovorum, hæc & similia clysteria locum habent in Variolis, ut testatur Gremsius in *Arbore Ruinosa Lib. 2. Cap. 3. fol. 427.*

Electuari-
um puerile
purgans.

Magnificus quidam & senex invictissimi Imperatoris LEOPPLDI olim proto-Medicus Manageta, & cum illò plurimialii, frequenter à principio statim, ubi corpus scatet humoribus utitur *Electuario*, quod vocat puerile, quia tutissimum & pueris innoxium est.

℞. *Cassie rec. extract. Pulp. Tamarind, aa. ʒvj.*

Mann. el. cum Aq. Violar. solut. ʒiʒ.

Pulv. fol. senn. elect. ʒiʒ. cum syr. Violar. simpl. q. s.

℞. Elect. S. Electuarium pro pueris. Cujus Dosis esse potest in pueris ʒiv. vel ʒij. in adultioribus ʒʒ. plus minus.

Medica-
menta leni-
entia.

Huc quoque facit *Syrupus Rosar. solutivus. Electuari-um de Tamarind. Manna, Pulpa Cassie, vel Nodulus Grilini* expertus & securissimus, supra in cura prophylactica descriptus.

Mercurius
dulcis à
Michaelē
laudatur.

Michaelis in principio statim, quando infantes sunt queruli, præmittit purgans ex *Mercurio* dulci ritè præparato, & maximam laudem mereri asserit, de quo legatur ipse Author *Prax. Clinica speciali Cap. 25. pag. 576.* Denique talia scilicet remedia, quæ non solum alvum lenissimè lenire, sed & Sanguinis & liquorum fervorem refrigerando extinguere, partesque internas (subducendo materiam) moderatè adstringendo robore, & per consequens vires tueri valeant.

Possunt autem hæc pharmaca tum per se & inter se tum cum convenientibus aliis, prout res postulat, commisceri. Quæ omnia (jam recensita) tam interna, quam externa remedia laxativa & emollientia locum tantum habent in principio morbi, hoc est, tempore ebullitionis, antequam tempus eru-
ptio.

prionis (quod in quibusdam etiam secundâ, aliis terciâ, quartâ, quintâ, sextâ, quandoque etiam septimâ & decimâ die contingit) adsit, ubi satius est, ab his omnibus abstinere, nam satius est habere aluum segnem quam fluidam, & ut uno verbo dicam, consuleissimum denique est, grassantibus Variolis & Morbillis corpora infantum & aliorum periclitantium peculiari diligentia pura conservare in tempore, antequam iisdem corripiantur. Si autem durante morbo, multis diebus esset constipata alvus, tunc convenient ea, quæ infra dicam in Diata de excrementis alui, & mox supra dictum fuit.

Injectio suppositorio vel clystere, ut mox diximus, Venæsecanda, vel hirudines, vel cuburbitulæ applicandæ in locis supra dictis. Mox rursum Venâ sectâ aut factâ scarificatione ad sudorifera & expulsiva veniendum, quæ nimirum materiam magis fundant, meatusque aperiant passim omni die ad minimum bis, manè horâ octavâ vesperti horâ quartâ, vel si opus ter in die, manè horâ sextâ, horâ decimâ, & horâ quartâ vesperti.

Ego in praxi rem sic instituo, & expellentia & vitæ regimen sic adhibeo, intra 24. horas quotidie expellentia exhibeo ter, id est, omnibus octo horis, v. gr. manè horâ octavâ, vesperti horâ quartâ, & post mediam noctem semper duabus horis post sumpta expellentia, do alimenta prout infra de diata de cibo & potu specificantur & pro concoctione alimentorum naturæ semper relinquo sex horas, qui modus feliciter cessit, vires conservando, & omnia symptomata avertendo.

Præterea, si video naturam post expellentia data esse segnem, semper unâ horâ post expellentia data, do unum vel duo cochlearia alicujus confortativi, ex *Conselt. de Hyacintho*, *Alchermes Pulv.* *Bezoart.* *Sennert. spec. de Gemmis* *Zwelferi*, *Pulv. Viperar.* *Pulv. Pæoniæ*, addito *Bezoar. orientali* &c. ut infra patebit de expulsione, ubi etiam formulas reperies. Omnia remedia, tum etiam potus semper detur cali-

S

dus,

Quid injec-
tio clystere
vel suppo-
sitorio ap-
plicato &c.
agendum.
Quid post
sectam ve-
nam.
Sudorifera
expellentia
ad mi-
nimu[m] bis in
die prop-
nanda.
Nostræ
præcox
modus &
processus.

Cavenda
frigida
catu.

Sumptis
medicame-
tis diapho-
reticis à
potu & ci-
bo absti-
nendum.

cus, vel potiùs tepidus frigida autem actu nunquam, nè malignitas ad interiora revocetur.

Sumptis medicamentis *diaphoreticis & expellentibus*, ad minimum duabus horis nec supra bibat nec comedat nè vis medicamenti impediatur. Sumptis his, in lecto pannis præsertim rubris copertus & benè tectus, locoque calido permaneat, non tamen est de essentia, ut semper post hæc sudet, sed sufficit, si sic benè tectus se calidum conservet. Videndum præterea, nè patiens tam citò ad lectum damnetur, aut mox calido hypocansto inclaudatur, antequam Variolarum acies in habitum educta extet, neque etiam nimis tegumentis obruatur & quasi suffocetur, sed moderatè tegatur, & in moderato calore servetur, à nimio enim tegumento & calore extrinseco, angetur calor intrinsecus, non minùs quam si non tegatur, quod si autem non tegatur, & in frigido maneat jam semel eruptæ, iterum retrocedunt, ut experientia testatur, multos benignis aliàs Variolis laborantes, frigidioris æris appulsu, è medio sublato esse, repercussâ nimirû materiâ morbificâ ad interiores partes, ubi prava & innumera induxit symptomata; propterea etiam nulla epichemata frigida corpori sunt admovenda.

Æger moderatè re-
gendus, &
in modera-
to calore
asservan-
dus.

frigidus
per se sumè
vitandus.

Frigida e-
pichemata
non sunt
admove-
nda.

Quæ agen-
da Medico
ad ægrum
vocato
dom natu-
ra bene o-
peratur.

Vocatus igitur ad ægrum Medicus, illico consideret, an natura in expellendo sufficienter fungatur suo officio, nec ne, si fungatur debite, non opus est eam multis medicamentis adjuvare, neque multis stragulis aut cubiculis calidioribus molestare, præsertim si absint prava symptomata, cum levia per se faciliè evanescant, modò æger à frigore arceatur, & in levi calore subsistat, & quædam paucula cordialia exhibeat, cavendo à principio à *pulveribus & solo Bezoar*, qui ca-

Naturæ
non bene
agenti ex-
pellenti-
bus succu-
rendum.

perpotenter petit, quæ Dolæus & Sydenham, tanquam molesta damnat, si autem non fungatur suo officio natura, tunc ei remediis expellentibus succurrendum est.

Quod si ex dictis medicamentis sudor & expulsio Variolarum

rum

rum & Morbillorum non vellet succedere, tunc in necessitate applicatis ad latera & pedes ampullis vel vesicis aquâ calidâ plenâ, vel panibus calidis per medium scissis, vel lateribus calidis, vel levibus cum panno scarlato frictionibus denuò promoveretur: quidam sunt, qui in hoc casu cum Variolâ difficulter prorumpunt siveadeant balneum aquæ dulcis tepidum, quia meatus aperit, cutim laxat, ut facilius & promptius humores excipiat: citant pro se auctoritatem *Hippocratis*, qui in historia Simonis pustulis laborantis, probat inunctiones ad ignem resolventes & cutim laxantes, eâdem ratione inquit illi prodesse posse balnea moderata. Verum hodie importunum remedium balneum est, nec forsan adeò huic morbo commodum, quia vires maximè resolvit, quibus autem Variolâ non erumpunt, id ipsum ex sola virium imbecillitate procedit, quæ balneo magis debilitantur, sufficiunt ergò, ut diximus, foci & frictiones quarundam partium.

Dum sudor
difficiliter
moveretur,
quomodo
a juven-
dus

An balne-
um Aquæ
dulcis te-
pidum pro
adjuvanda
expulsione
Variolarum
conveniat,

Bene itaque est perpendendum, quòd natura ipsa saepe sine aliis medicamentis hoc morbi genus sanet, unde si natura suum officium faciat, & recte materiam ad cutim expellat, id est, si satis erumpere naturæ beneficio Variolas & Morbillos animadvertimus, non opus est eam multis medicamentis adjuvare, frustra enim facimus, quod natura per se facit, imò malè. Ratio; siquidem calefacientium intempestivò usu (idem dicendum de calidis nimium cubiculis & lectis teste *Sydenham*, præsertim primis quatuor vel quinque diebus, quæ quasi funesta damnat Dolaus & alii) materia nimis agitur, febrisque augeri posset.

Et hinc bene denuò Nota, quod in principio Variolarum & Morbillorum, id est, tempore ebullitionis (de quo jam supra) ægrotos *pulveribus ex solo Bezoar*, ex fortioribus & calidioribus Alexipharmacis, stragulis & cubiculis, præsertim si temperamentum, & vires non corrépondeant, obruere, teste *Dolæo* aliisque multis, periculosum sit, nisi illa ad-

modum temperata fuerint, etiam quando prava ac maligna symptomata urgent, si quidem, ut diximus, materia seu tota massa sanguinea nimium agitur, ac ocyus tota inquinatur à miasmate pravo jam fermentante, inde febris, deliria ac alia symptomata adaugentur.

Narrari hic possent casus admodum funesti, qui in multis tam infantibus quam adultis sæpius lethales successerunt, in quibus non defuere Viri in theoria ac praxi medica fundatissimi, qui asseruere, bezoarticis calidis in principio turbari magis humores, naturam ante tempus cogi in prælium, & nondum sufficienter præparatam obrui: quin imò commotis tali modo intempestivè succis, alui fluxus successisse periculosissimos, in his affectibus plerumque lethales, teste experientiâ. Pariter certum est similibus calidis ac potentioribus remediis eò usque acui humores præsertim si antea tenues sint, prout plerumque in Morbillantibus, & sæpè etiam in Variolantibus, maximè Juvenibus gracilioribus esse solent. Ut mordaciores redditi, pruritum in pruritione Variolarum ingentem produxerint, ita ut ad levissimam quamvis frictionem, cutis cum stillante cruore abscederet, non sine gravi dolore, quæ non frustra præsentibus Medicis, mali ominis istar fuere, & paulo post subsequituræ gangrænæ præludia fuisse, prodidit eventus, maculis lividis & purpureis nono die morbi subsequentibus, undè verè verificatur supra allatum ex *Avicenna* prognosticum: *pustulas nigras & Ulcerosas in infantibus apparentes lethales esse.*

Tanta nimirum est in principio fermentationis sanguinis aliquando turgescencia, ut non solum furiosò quasi orgasmò ad quasunque partes facile feratur, sed etiam contagiosum maximè venenum exinde subinde suboriat: sic Philippus Salmuth *Obs. Med. Cent. 1mâ Obs. 3.* funestos Variolarum abscessus ad articulos vidit, quando enim (inquit) *ebullitio est nimia & valde vebemens, sanguinem quasi furiosum reddit*

reddit, quemadmodum loquitur Hippocrates hinc de loco ad locum fertur, potissimum autem ad articulos, pedes, tanquam partes exsanguis, & sic imbecilliores: Idem Salmuth Cent. 2. Obs. 50. notavit Infantes Variolis detentos, matribus lac præbentibus, causam fuisse ulcerum in mammis admodum malignorum.

Ratum ac salubre ergò maneat, tempore ebullitionis ad calida & potentiora non esse statim transeundum, sed in temperatioribus esse persistendum, tempore verò apparitionis (de quo etiam supra) expellentibus severius utimur, maximè si natura videatur segnior: quæ aurem tutò tempore ebullitionis, & quæ postmodum tempore apparitionis necessariò adhiberi debeant ac possint, dicetur apertè practicè & specificè pagina sequente & subsequente.

Nota præterea, hæc expellentia tam diu esse continuanda, usquedùm Variolæ & Morbilli totaliter eruperint, & decidere paulisper ineipiant, atque urina rubedinem amittat, & tum à diaphoreticis abstinendum, & ad depurationem sanguinis est respiciendum.

Superstitiosum forsàn alicui videbitur id, quod supra diximus, cur in colore pannorum, potius rubri albi vel virides esse debeant? color enim non potest operari nisi per accidens, quatenus visum & phantasiam afficit, quæ postea similitudine caloris incitatâ sanguinem ad exteriora impellit. Verùm si hoc subsistat, tunc sufficit colorem hujusmodi oculis obiiicere, nam cùm corpori adhæreat, neque noctu neque sub lecti linteaminibus videtur. Præterea panni non educunt humores, nisi quatenus corpus calefaciunt, poros aperiunt, ab externo aëre defendunt, quod non rubri tantum, sed omnes panni præstare possunt, & omnium optimè albi, & ideò non color sed calor tegumentorum agit. Adde, plerosque Authores, qui hujusmodi pannos ex vulgari consuetudine probant, id sedulo monere, nè corpus ipsum con-

Quamdiu expellentibus utendum,

An pannus ruber ad meliorem expulsionem conferat.

Quare quidam.
Authores prohibeant ne similes panni corpus contingant

tingant, ita Amatus Lusitanus *Curation: 16. Cent. Obs. Med. 3.* Ratio datur, quia ex tinctura cocci aliquam habent adstrictionem; ideo, quamvis eos non improbem, ridiculum tamen multis videtur colorum facere discrimen, imò alii potiùs candidissimos approbant, quia color ille visum disgregat, spiritus ad externa evocat, & per consequens humorum in cute efflorescentiam promover.

Qua ratione id pannus præstare dicantur.

Nec obstat, rubicundò colore visò, quædam animalia (uti sunt galli Indici, tauri &c.) exandescere, multos visò propriò sanguine animari ad vindictam, id tamen non est perpetuum, nec omnibus sed quibusdam tantùm competit, qui id ex proprietate quadam habent, neque visò quolibet sanguine, sed tantùm propriò in iram prorumpunt. Quod si tamen contentiosis vetulis quidam hoc in casu favere velit, quæ suos variolantes & morbillantes perpetuò subuculis & stragulis rubris regunt, & vix non sepeliunt, is cum *Fracastorio, Paschali, Riverio, Foresto, Liddelio* & aliis dicat: ideo fieri, ut per ea sanguinis ebullitio seu effervescencia, mediante imaginatione promoveatur: vel dic, id fieri propter vim quandam habitum corporis corroborandi, quam scarlatino panno inesse existimant: vel (ut quædam vetulæ existimant) ad evitandas turpes cicatrices, quæ ex alio colore imaginativè provenire possunt.

Aliæ opinioniones circa operationem dictionum pannorum.

His aliqui addunt hanc rationem, quia similia rubra, analogiâ quadam sanguinem ebullientem ad exteriora movere creduntur, sanguisque ruber externos sequi colores affines, à multis pro firmo tenetur, sic quoque flamma flammam elicit, & adustam manum sanat ignis, & hinc inquit Riverius: *multo ovem vel vervecem, cattum vel canem benè pilatum in cubiculo detinere solent, quod illa animalia venenatam labem facile recipiant, & in se attrahant, unde ægris levamen ali-* quod emergere potest. Ut ut autem commentum Veticularum dixeris, tunc alienum non facis hos pannos rubros approbare

Nostra de his.

bare, non quidem ut color tantum attribuat, sed quia spe-
meliorationis freti, pueri melius ab aëre externo arcentur,
& tot & tantis stragulis non obruuntur, neque etiam calidio-
ribus suffocantur.

Formula Remediorum tam simpli- ces quam Compositæ.

Ex simplicibus aperientibus & expellentibus simulque Sequuntur
maliginitati resistentibus sunt: remedia.

Radices. *Feniculi, Diſtamni albi, Pimpinellæ, Tor- Simplicia
mentillæ, Contrajervæ, Scorzonera.* expellen-
tia & aperi-
entia.

Semina. *Feniculi, Napi, Carduibened. Aquilegiæ, Citri, Lentæ.*

Simon - Pauli in suo quadripartito botanico Class. 2.
de *Aquilegia* ita ait: sanctè testari possum, semen *Aquilegiæ* pul-
veri satum ʒß. vel ʒj. pondere in *Mulso*, vel *Aq. Card. bened.*
vel *Fumariæ* vel decoct. C. C. propinatum veluti ab orcore vo-
casse tenuioris sortis pueros *Morbillis & Variolis* laborantes.
Idipsum asserit *Dolæus*.

Flores. *Calendulæ*, quæ summè específicos extollit
Willis in decocto ordinario vel aliis Decoctis & jusculis im-
mixtos & sumptos.

Herbæ. *Scordii, Fumar. Veronica, Scabiosæ.*

*Cicera rubra, Myrrha, Crocus, Ficus seu Caricæ, The-
riaca, Mithridatum, Diascordium* (præsertim in robustiori-
bus) C. C. cum & sine igne pptum *Lapis Bezoar Oriental. &
Occidentalis*, Bezoar datur infantibus gr. ij. pueris gr. iij. vel
iv. adultis gr. vj. vel ʒß. in vehiculo. *Os de corde Cervi,
Unicornu verum, Unicornu fossile, Sal Fumariæ Carduibene-
dicti, Scordii, Fraxini*, ex ramulis unâ cum corticibus arte pa-
ratus

ratus, dicti non potest (inquit Doctissimus Thiermaier Lib. 1. Cap. 7. fol. 95.) quantopere conveniat Variolis & Morbillis laborare incipientibus, in Aq. Card. bened. cum tantillo Syr. Granator. vel Rubi Idæi dilutus pondere granorum. v. vj. vel x. Quod ipsum confirmat Simon Pauli locò ante citatò Classe 3. de Fraxino. Ego certè, inquit, pluris hunc salem facio, quàm lapidem Bezoar, ille enim cum C. C. phil. ppt. vel etiam ramentis crudis Unicornu nostratis potentissimè sudorem movet, sed selectus habendus ramulorum, nam vetustiorum si ve lignum si ve cortex frugi non sunt, fixior enim illorum sal est, quàm convenit, exiis paratus. Hoc idem fere promittit de sale Carduibenedicti præfatus Author. Adolphus Occo, Medicus Augustanus in libello collectaneorum manuscriptorum, Sal, inquit, Viperarum, seu sal Theriacale ad ʒj. in aqua vel syrupo de Fumaria ʒj. in maligna scabie, nec non in Variolis evanescentibus rursus commo vendis expertum & mirabile est remedium: descriptionem hujus salis legitimam si habere desideres, videas apud citatum Thiermaier, loco citato. Aut Zvvelfserum in Appendice ad classẽ 14. Pharmacopæe reformatæ. Ego, quia Sal Viperarum undique non prostat, & vix maximo etiam pretio comparari potest loco ejus Pulverem Viperarum verum à ʒß. ad ʒj cum aliis specificis, vel uno alterove grano Bezoar exhibui in jam dicto casu, & aliis etiam pluribus desperatis, cum maximo semper effectu; nam natura hujus Salis & Pulveris est, suâ virtute depurante potenter properare ad habitum corporis, & sic eximic materiam propellit, secumque eò rapit.

Sal Freni-
ni in expel-
lendis Va-
riolis ex-
cellens.

Sal viperarum in Va-
riolis eva-
nescenstibus rursus
commo-
vendis mul-
tum præ-
stat.

Nos loco
Salis sub-
stituimus
pulverem
Viperarum
verum,

Crocus et-
iam extol-
litur,

Laudata à
Dolæome.

Cardilucius Cap. de Variolis laudat in pauperibus, ut de-
tur pueris ʒß. vel gr. xij. adultioribus autem ʒj. Croci in Aqua
vel Decocto Feniculi. Rustici suos infantes solo lacte (sæpe
aliis omisiss) feliciter curant

Dolæus extollit Tincturam Aquilegiæ, Essentiam Myrrhæ,
tanquam Tincturam salutis multis experimentis probatam,

ita

ita quoque *Essentiam Castorei, Elixir Proprietatis sine acido* dicamenta.
vel *spiritu Sulphuris* paratum. Laudat præterea sequentem
Pulverem 7. 8. 9. die morbi pro adiuvanda maturatione ex-
hibendum.

℞. *Oculor.* 69. ℥j. ☞. sigillat. 3℔.

Myrrh. gr. ʒj. M.

Michaelis hæc habet: ℞. *C. C. phil. ppt.* ʒnii *diaphor.* aa 3℔.
vel ʒj. pro dosi. Si adsint Convulsiones.

Pulvis
pro adiu-
vanda ma-
turatione
ejusdem.

℞. *C. C. phil. ppt.* ʒiiij. *specif. Cephal.* ʒj.

Misce pro aliquot vicibus.

*Pulvis Mi-
chaelis.*
Et alius e-
jusdem si
Convulsio-
nes adsint.

Vel ℞. *C. C. phil. ppt. sine Viperar.* aa ʒj.

Bezoart. Solaris 3℔.

Misce & divide in doses Nō. ij.

Idem svadet ut omnibus remediis aliquid de *Myrrha*,
quæ tanquam appropriatum lympham corrigens est, addatur. Idem ex-
tollit Myr-
rham.

Laudantur pariter *Species Liberantes, Corallia, Marga-
rite, ☞ sigillata, Gelatina C. C. ʒnium diaphoreticum.* Species Li-
berantes.

Ubi nota Doctissimum dele Bœ Sylvium *Cap. de Variolis* §. 69. Sylvius

inter omnia medicamenta in Variolis usurpanda præ omni-
bus aliis experta habere *antimonialia*, tùm quia summam possi-
dent sanguinem à quovis humore noxiò mundandi efficaci-
am, tùm quia sæpenumero pluribus possunt satisfacere indi-
cationibus, atque pro re nata & operatione desiderata, per
plures vias humores noxios expellere. *Nec tamen sufficit, in-
quit §. 70. semel illa exhibere, quin nonnunquam per plures dies
eadem iterare oportet, donec tam febris quàm alia symptomata
sint sublata, vel saltem notabiliter imminuta, quò etiam fiat, ut
non tantum pauciores Variolæ tum erumpant, sed etiam simul.*

*Antimoni-
alia depræ-
dicat.*

sint longè benigniores, quinimò sæpe numero sunt observatæ in
meis ægris (loquitur ulterius) *Variolæ per alvum excretæ, cum*
insigni eorum levamine; qua de causa etiam prædictus Sylvius
§. 71. plurimum cominendat & *diaphoreticum, Bezoarticum*
minerale, vel simile medicamentum *antimoniale* blandè su-
dorem movens, quò quicquid adhuc sanguini mixtum est,
propellatur ad superficiem & poros, & tandem ex corpore;
atque horum medicamentorum ope (§. 72.) facilita-
tur, promovetur Variolarum maturatio, exsiccatio & casus.

Ettmuller-
us idem
laudat.

Excremen-
ta Anima-
lium-

Ettmullerus id ipsum confirmat de *Antimonio diaphoreti-*
co tam vulgari, quàm ex *§rio cum Otro* additâ modicâ
Myrrhâ, quam etiam præ cæteris omnibus laudat, & nun-
quam in Variolis & Morbillis intermittendam svadet, ita
etiam medicamenta ex *Myrrha* parata. Inquit pariter suc-
cum stercoris equini expressum summum esse remedium, præ-
fertur tamen *stercus ovulum* in Morbillis, in Variolis *caprillum*:
post eruptionem autem ut promptè maturescant, consulit
propinare *Ocul. 69. cum Myrrha.*

Sal. C. C. volat. & *Succin. volat. Confect. Alchermes,*
Confectio de Hyacintho & ejus species, *Pulvis Bezoarticus*
Sennerti.

Spiritus

Spiritus. Terræ sigillatæ, C. C. Liquor C. C.
succinatus, Spirit. sambuci, Spirit. Lign. sanct. Essent. Ligno-
rum.

Tincturæ. Antimonii, Coralliorum, Hyperici, Be-
zoartica Michaelis, Mæbii, Frommanni, Schneideri, Aquile-
giæ, Pæoniæ.

Balsamus. &ris anisatus, Balsam. &ris succinatus
Balsam. &ris juniperinus.

Conserve
& Syrupi

Conserve. Fumariæ, Syrupus Cydonior. de Cortic.
Citri, Granor. Chermes, de Pomis redolentibus, Scabiosæ, de
Scordio, Flor. Tunicæ, de Succo Veronicæ.

Aquæ

Aqua. *Carduibenedicti, Scorzoneræ, Scordii, Fumaria, Scabiosæ, Veronicæ, Succisæ, Calendulæ, Angelicæ, Imperatoris, Petasitidis, Vincetoxici, Flor. Citri, Levistici, Helenii, Farfaræ, è typhis Ceruorum, Cordialis frigida saxonica, Borraginis, & quæ singulariter commendatur Aqua de floribus Lini destillata.*

Aqua.

Succus. *Betæ rubræ, remedium simplex & efficacissimum, recenter expressus & datus infantibus ad cochlearium unum, pueris ad cochlearia tria, adultis ad cochlearia quinque plus minus, bis minimum de die potentissimè propellit Variolas & Morbillos, Petechias & ipsam Pestem.*

Succus Betæ rubræ.

Ex refrigerantibus sunt *Acetosa, Acetosella, Lactuca, Nymphaea, Portulaca, Endivia, Cichoreum, Plantago, Succus Citri, Vinum granatum, Oxisaccharum, Rob. ribium, bordeum &c.* Hæc autem refrigerantia & adstringentia commodius in initio, primò scilicet & secundò die exhibentur, antequam natura se se ad expellendum accingat, ubi etiam valent ex compositis *Terra sigillata cum C. C. phil. ppt. Spec. de Gemmis frigide, cum Pulvere Pannonico rubro correcto*, qui etiam temperatissimus est, *species de Gemmis frigid. Zuvelferi, Pulvis Bezoarticus Chobellii temperatus.*

Medicamenta refrigerantia.

Quo tempore exhibenda.

Ego in Variolis & Morbillis, ubi magna expulsiōe præsertim ab initio opus non est, contentus sum sequenti *Aqua Confortativa* quam ad cochlearia duo vel tria plus minus sæpius de die propino, cum in finem, ut paulatim putredini resistatur, & ipsa natura moderatâ hæc methodo successivè ad-juta, roboretur.

- ℞. *∇. Scorzoner. Fumar. Borragin. è toto Citro aa ʒj. Pulv. Bezoart. Chobellii, vel Bezoart. Sennert. ʒj. Manus Chsti perlat. q. s. ad gratum soporem, M.*

Aqua Confortativa nobis ab initio Variolarum usitata.

Eundem in finem do, in omnibus jusculis vel panatellis unum vel duo cochlearia *Gelatine C. C.* ordinariæ vel pretiosæ, de quibus infra in Diata. Postea verò ubi erumpere incipiunt Variolæ & Morbilli, conatus naturæ adjuvandus *Pulvere Pannonico rubro correcto* additis *gr. ij.* vel *gr. iij.* *Bezoar*, vel *Speciebus de Hyacintho*, vel aliis id genus quæ nunc sequentur, pro morbi tamen natura vario modo hæc miscenda, si enim febris & fervor sit magnus, temperatiora danda, aut frigida admiscenda; Sicut etiam hoc in casu maximè conveniunt, quæ citra calorem expellere possunt, vel quæ frigida simul vim aperiendi habent, ut *Acetosa*, *Succus Citri*, *Vinum granatum*, *C. C. Margaritæ*, *Tormentilla* &c. quæ omnia in praxi fient clariora.

Formule Compositorum.

Formulæ
Composito-
rum.

Pulvis ad Variolas & Morbillos *Timæi*, quo hætenus familiariter & summò cum effectu sum usus in plebeis hominibus, qui etiam levi pretio haberi potest, est sequens:

Pulvis Ti-
mæi.

R. *Sem. Aquilegiæ*, *Nasturtii aa* *zij.*

Napi, *Acetosæ aa* *ʒiv.* *Citri* *ʒj.*

Carduibenedicti. *ʒj.*

Rad. Scorzonæ. *ʒij.* *Distamni* *ʒiv.* *Tormentill.* *ʒj.*

Flor. Fris *ʒj.* *ʒæ sigillat.* (in *∇.* *Acetof. lot.*)

Margarit. *ppt.* *C. C. phil. ppt.* *aa* *ʒiʒ.* *Croci.* *ʒj.*

Panni scarlati usli. *ʒj.* *M. f. Pulvis.*

Dosis *ʒj.* ad *ʒʒ.* in adultis ad *ʒj.* plus minus. Vel in minoribus. 2. *Messerpsis* / in adultis 3. *Messerpsis*.

Si hunc Pulverem efficaciorē velis, aut si magna adsit malignitas, cujvis dosi addi potest *Lapidis Bezoar Orient.*

gr.

gr. j. vel gr. ij. vel Occidentalis gr. xv. vel ̄is C. C. volat.
gr. xv. vel gr. v.

Alius & quidem à multis abhinc sæculis deprædicatus
Pulvis, tam in Variolis & Morbillis, quàm etiam in omnibus
malignis Febribus est, *Pulvis Pannonicus ruber Augustanorum*
vulgo fuder Pulver / qui sic paratur :

℞. Boli armen. cum ∇. Rosar. & Acetof. ppt. ℥ij. Pulvis
∇æ Lemniæ veræ ppt. ℥ij. Pannoni-
Rubini ppt. Smaragdi ppt. Hyacinthi ppt. Sapphir. cus Rober
ppt. aa ℥β. Augustano-
Corall. rub. ppt. ℥β. Corall. alb ppt. 3vj.
Margarit. ppt. 3v. Cinamom. elect. ℥ij.
Caryophyll. 3j. Sem. Acetof. ℥ij.
Cort. Citri. Santal. alb. aa 3β.
Santal. rub. 3ij. Spodii ppt. 3v.
Rasur. Eboris ℥ij. Croci oriental. 3j.
Unicornur, vel ejus loco Ossa de Corde Cervi. ℥β.
Folior. ̄ori puriss. Nò. L.

M. f. Pulvis efficax in Peste, Febribus malignis, Variolis
Morbillis &c; Usus & dosis eadem eum priori

Pulvis Pannonicus rubens correctus, à magno Urbis
Pragensis Archiatro & emeritissimo quondam Professore, Do-
ctore Franchimond', qui longè est tutior & temperatior.

℞. Boli Armen. cum ∇. Rosar. & Acetof. ppt. ℥ij. Pulvis Pan-
∇æ lemn. veræ ℥ij. Corall. rub. ppt. ℥β. Corall. nonicus
alb. ppt. 3vj. Lap. quinq. pretiosor. ppt. aa ℥β. correctus..
Margarit. ppt. 3v. Rad. scorz. Contraier. aa 3ij.
Flor.

Flor. &ris simpl. Cort. Citri
Santal. rub. alb. aa ʒij. spodii ppt. ʒv.
Rafur. Ebor. ʒij. Croci Oriental. ʒj.
Sem. Acetof. Napi, Aquileg. Card. bened. aa ʒij.
Granor. Chermes, Off. de corde Cerui aa ʒβ.
Folior. Ori puriss. Nō. L.

M. f. Pulvis subtilissimus; *Ufus & Dosis* ut priorum.

Pulvis Bezoarticus Chobelii, svavis & excellens in delicatis & divitibus.

Pulvis Bezoarticus Chobely.

℞. *Bezoar. Oriental. gr. 1x. Hyacinth. ppt. gr. viij.*
Unicornu veri gr. x. Margarit. ppt. gr. xi.
¶æ sigillat. gr. xx. C. C. phil. ppt. gr. xxv.

M. f. Pulvis. *Dosis* à ʒβ. ad ʒj.

Pulvis Sabaudicus dictus.

Est eximius & secretissimus in casibus Variolarum & Morbillorum desperatis præsertim, ubi difficulter prodeunt, aut si prodeunt, denuò & repetitum retrocedunt, & gravia invehunt symptomata, quæ omnia hocce Pulvere aliquoties repetiro fuerê remediata. ¶

Pulvis Sabaudicus.

℞. *Cinamom. elect. ʒij. Caryophyllor. ʒij.*
Mastic. elect. Myrrh. elect. aa. ʒj.
Anthoræ, Contrajervæ, Scorzonæ,
Corall. rub. ppt. Margarit. ppt. Sapphir. ppt.
Rubin. ppt. Smaragd. ppt. Hyacinth. ppt.
Lap. Bezoar. oriental. Unicornu ver. aa ʒij.

Rad.

Rad. Diſtamin. alb. Pimpinell.

Croci oriental. C. C. phil. ppt. aa ʒij.

Rad. Tormentill. Bol. Armen. ppt.

ʒæ. ſigillat. aa ʒj. Cort. Citri. ʒβ.

Mofchi, Ambræ (ſi completum velis, ſi incompletum Moſchus & Ambra omittatur) aa gr. x.

Fol. ʘri Nō x. plus minus.

ʘ ii. diaphoret. recent. ad pondus omnium

Miſce F. Pulvis. Hic Pulvis eſt quidem magni prætii, ſed certè maximæ utilitatis, uti teſtantur famoſiſſimi Præctici, & per eosdem factæ experientiæ. Nota tamen, ʘ diaphoreticum ritè & recens præparatum eſſe debere, inveteraſcens enim ad ſui naturam & vim emeticam redit, unde conſulo, huic pulveri nunquam miſcendum ʘ, niſi eo tempore, quo quis illo uti velit, ſervatò ſcilicet utròque ſeparatim : *Uſus & Doſis* huius pulveris eſt à ʒj. ad ʒβ. ʒij. in vehiculò quocunque, bis vel ter intra 24. horas.

Pulvis löelis.

Hunc *lib. 8. Præct. ſect. 5.* deſcribit, & ſemper feliciter adhibitum conteſtatur.

ʒ. Sem. Naſturt. Napi, Aquilegiæ aa ʒj.

Unicornu veri C. C. phil. ppt. aa ʒβ.

Corall. rub. ppt. Margarit. ppt. aa ʒj.

Pulvis Jöe-
lis.

Miſce fiat Pulvis. *Doſis* à ʒj. ad ʒij. Cui ſi quis ſcobem ʘri addere velit. pretioſius redditur remedium à multis aliis approbatiffimum.

Pul-

Pulvis Höferi.

Pulvis Höferi.

- ℞. *Spec. de hyacinth. Pulv. Pannonic. rub. corr. aa* ʒβ.
vel gr. xv. Bezoar. Oriental. gr. iij. Misce

Pulvis Grembsii.

Pulvis Grembsii.

- ℞. *Bezoar. Oriental. gr. ix. ☿. sigill. ʒj.*
C. C. phil. ppt. gr. xxv. Unicornu ver. ʒβ.
Margarit. ppt. gr. xv. Hyacinth. ppt. gr. viij.
Misce f. Pulvis. Dosis ā gr. viij. ad xv.

Pulvis Ettmülleri & Juncken.

Pulvis Ettmülleri & Juncken.

- ℞. *Unicornu fossile ʒj. C. C. phil. ppt. ʒij.*
⊖ Card. ben. gr. xv. Myrrh. elect. gr. xij.

Misce pro 3bus dosibus in incremento Variolarum propinandis, quando nimis tardè erumpere observantur.

Pulvis alius.

- ℞. *Pulv. Pannon. rub. corr. ʒj. vel ʒβ.*
spec. liberant. gr. xv. vel ʒj.

Misce detur in vehiculo v. gr. in *☿. Card. bened. ʒj. Aquilegie aa ʒj.* Si in Variolis adsit malignitas, ut vulgò in Variolis epidemicis fieri solet, alexipharmacis præcipuè insistendum est, habitū virium & ætatis ratione. Præter jam supradictos Pulveres etiam in malignitate potentes.

Alius Pulvis.

- ℞. *Pulv. Pannon. rub. correct. ʒβ. p. m.*
Lap. bezoar. orient. gr. iij. vel
⊖ C. C. volatil gr. v. M. f. Pulvis.

Pul-

**Pulvis alius si adfit malignitas & si-
mul convulsio.**

Spec. de hyacinth. Pulv. Pannon. rub. corr.

Pulv. Epilept. Marchion. aa ʒj.

C. C. phil. ppt. Lap. bezoar. oriental. aa ʒʒ.

Pulv. Viperar. ʒj. Misce f. Pulvis, dividendus in

Doses Nō. iv. pro minoribus, pro adultis in
Doses ij.

Pulvis in
Variolis
malignis
alius.

Pulvis alius in hoc casu.

Rad. contrajerv. ʒʒ.

Off. de Cord. Cerui. ʒj.

Margarit. ppt. Lap. Bezoar. aa ʒʒ.

Misce f. Pulvis Dosis ʒʒ.

Alius in
eadem.

**Alius in hoc casu est Pulvis Cephalicus Lu-
dovici, qui egregias habet virtutes.**

Pulv. Bezoar. ʒj.

Succin. alb. ppt. ʒʒ.

Cinnabar. nativ. ʒj.

Laudan. opiat. gr. iij.

Misce, Dosis ʒʒ. ad gr. xij.

Pulvis Ce-
phalicus Lu-
dovici.

Alius in hoc casu, Dolæti.

Cinnab. nativ. Cranii human.

Ungul. Alcis aa ʒʒ.

Bezoartic. Iris, Smaragd. ppt. aa ʒj.

Dolæti ad
eadem.

¶

Croci

Croci ꝑß. *Ambræ* gr. ij.

Misce f. Pulvis *Dosis* ā ꝑß. ad ꝑj.

Alius in hoc casu, Jüncken.

Alius Jün-
cken.

ꝑ. *Cinnab. nativ.* 3ß.

Cran. human. ppt. succin. alb. ppt. aa 3j.

Smaragd. ppt. ꝑj.

Rad. Peonia recto tempore collectæ

Visci Corillini aa 3ß.

Laudan. opiat. gr. v.

Misce, *Dosis* ā ꝑß. ad ꝑj. p. m.

Ego in summa malignitate una cum convulsione, bonum effectum sequens cordiale adhibui.

Cordiale
nobis in
malignis
Variolis
sanum,

ꝑ. *de Scorzon.*

Hyrund. simpl. August. aa 3ii.

Pulv. Pannon. correctæ.

Marchion. aa 3ß.

Θ is C. C. volat.

Bezoar Oriental. aa gr. v.

Misce. *Dosis* cochlear j. vel ij. omni hora, vel duabus horis, plus minus.

Dolæus refert, in tenerioribus multum posse in epilepti-
cisi insultribus ~ C. C. succinat. Θ volat. *Cranii humani,*
epilepticis *Specificum cephalicum Michaelis.* Ettmullerus svadet, Lique-
insultibus, rem C. C. succinatum, vel in robustioribus Θ *Artemisie.*
Exmille, Si adsint Vermes vel magna putredo, lexpertissimum
ro, in iis- est sequens: ꝑ. : *Ærii duct. rite ppt.* ꝑß. Cum pauca *Conf.*
dem. Si adsint *Rosar.* exhibeatur. In Variolis miracula præstat, & vesperi
Vermes vel longe

longè à cibo detur, & altera die Variolarum ingentem videbis numerum; de hujus experientia vide *Ephemerid. An. 3. Obs. 56. fol. 93.* non enim solum curat, sed summè à Variolis præservat, adeò, ut qui à principio statim sumpserunt, licet cum aliis cohabitarint, correpti tamen non sint, est enim verum Variolarum, Lumbricorum & Luis Q'rez alexipharmacum. *Dosis* à ʒß. ad gr. xij.

Nota, hi omnes supradicti Pulveres, si necessitas ita exigat, sumi possunt in *Decocto meo Antifebrili*, cujus, ut candido affectui satisfaciam, genuinam hanc descriptionem trado.

Rad. Contraierue, Zedoarie aa ʒiij.

Enul. Scorzon.

Liquirit. Fenculi. ad ʒv.

Herb. Scordii, Scabios. Card. bened. aa Mij.

Cichor. Pimpinell. sylvest. Acetose aa Mj.

Flor. Calendul. Aquilegia,

Violar. Borragin.

Bugloss. aa Mj.

Sem. Napt. Aquilegia, Acetose, aa ʒß.

Citri, Card. bened. aa ʒij.

Rasur. C. C. ʒj.

Cicer. rub. ʒij.

Lentum,

Passular. minor. aa ʒiij.

Caricar. ping. Nò. xv.

Species
Decocti
nostri An-
tifebrilis.

Incisa & contusa serva pro usu Decocti. Aut si gratiorem expetis, destillari poterunt species, & sic efficitur palato gratior. Dosis ab ʒß. ad ʒii.

U 2

Aliud

Aliud Decoctum Ectimaticum dictum, extollit mox renominatus Author, & Professor meus *Franchimond*, cujus hæc est descriptio, quod in expellendis, maturandis, & in depressis & concidentibus, vel etiam retrocedentibus denuò expellendis Variolis & Morbillis, longò usu & experientiâ est comprobatissimum, ut sequitur:

Decoctum
Ectimati-
cum.

℞. Rad. Fœnicul.

Acetos.

Scorzoner. aa ʒi.

Rasur. C. C. ʒβ.

Fol. scabios.

Seord. aa Mj.

Ficum ping. Nō. vi.

Sem. Napi.

Card. bened.

Aquilegia. aa ʒβ.

Gum. lacca ʒiij.

Tragacant. ʒiv.

(Ego, si illud fortius expeto, addo huic compositioni)

Flor. Calendul. Mβ.

Croci ʒβ.

Incisa & Contusa servantur ad usum.

℞. Harum Specierum ʒi.

Coquantur in f. q. ∇æ font. ad ʒiv. Signetur Decoctum Ectimaticum tenue, pro potu ordinario, bibendo loco alterius potûs. Vel

℞. Harum Specierum ʒi.

Coque

Coque in f. q. *Aq. font. ad Brij.* Signetur Decoctum
Ectimaticum forcius.

Vel hæ species decoquantur cum ∇ hordei, & pro dosi
ʒj. vel ij. vel ʒiij. dantur cum dictis supra Pulveribus. Simi-
le quasi Decoctum habet & extollit Londinus *Lib. 1. Cap. 7.*
Obs. Med. Decoctum provocativum expertum vocat, &
Author in *tractat de Morbis Epidem.* idem Decoctum quasi
millies expertum deprædicat.

Aliud Decoctum, aut Aqua destillata.

R. Rasur. C. C. crud. ʒiv.

Rad. Scorzonæ.

Fenicul.

Gramin.

Serpentæ. aa ʒiʒ.

Sem. Napi.

Aquileg.

Nasturt.

Card. bened.

Fenicul. aa ʒj.

Lentium, Miss.

Hordei mund. ʒxx.

Caricar. ping. No xxx.

Cort. Citri rec. ʒiʒ.

Gum. tragacant. ʒij.

Aliud De-
coctum aut
Aqua de-
stillata.

Concisa & contusa secundum artem, affunde ∇ *a font.*
Bix. stent in loco calido per 24. horas, postea destilla per
balneum Mariæ. Est Aqua expulsiva egregia. *Dosis* ab ʒj.
ad ʒij. plus minus. Sed

U 3

Dices

Dices cum Fracastorio, Lentesc & Tragacantum incras-
sant & inspissant sanguinem, & consequenter cutim obstru-
unt, ergo non videntur convenire cum contrariantur indica-
tioni supra allata. *Resp.* Dictum esse sapius, ebullitione seu effere-
vescentiam sanguinis & liquorum, vel esse crassiorem, vel
tenuiorem quam oporteat, unde si crassior, neque lentes,
neque tragacantum conveniunt, si vero sit tenuior, recte
fiet si lentes & tragacantum pro attemperatione addantur.

In quo casu
possint ad-
hiberi len-
tes & Tra-
gacantum.

Aliud Decoctum expulsum.

Aliud De-
coctum ex-
pellenz,

- ℞. *Rad. Pimpinell.*
Tormentill,
Scorzoner,
Distam, alb, aa ʒj.
Herb. Fumar.
Scordij
Scabios. aa p. .ij.
Flor. Aquileg. p. iij.
Calendul. p. iʒ.
Sem. Card. bened,
Napi
Aquileg.
Fenicul. aa ʒij.
Ficuum. No x.
Coque in f. q. ∇ a fort.
- ℞. *Cosatur. ʒix.*
Syr. flor. Aquileg. ʒiij.

Tim.

Tinct. flor. Aquileg. more tinctura

Florum Rosarum parata ʒij.

Misce pro 4. vel 5. Dosis, & de eo saepe unum vel al-
serum cochlear propinetur.

Vel sumi possunt supra dicti Pulveres in ∇ Fumariae,
Veronicae, Card. Bened. Scabiosae, Aquilegiae, Theriacali &c.

Quod si aeger Pulveres renuat, possunt ordinari Potiones.

1. Dosis ex supra dictis Pulveribus subigatur cum Sy- Potio,
rup Granor. Chermes & de Scordio aa ʒβ. Aq. Card. bened.
vel Decoct. Ectimat, vel ∇ expulsiu. supradict. ʒij. vel ʒiij.
f. Potio. Velsequens Grülingii.

2. Spir. C. C. gut. x ad uliori gut. xx.

Aq. Card. bened.

Alia potio
Grülingii.

Scorzoner. aa ʒj. Misce.

Alia ejusdem. Aq. fenicul.

Sambuc. aa ʒvj.

Alia ejus-
dem.

3. Card. bened. ʒiijβ.

ʒri ʒβ.

ʒli. gut. v.

Syr. de scordio. ʒβ. Misce.

Dividatur in Doses Nō ij unam sumat manē, alteram
vesperi.

Nota: Spiritus seu Liqueur C. C. Grülingii sic fit.

Descriptio
C. C.
Grülingii.

1. ʒ C. C. volat.

2. Vini aa. ut uniatur debite & destilla,

Dosis a gut. v. ad xx. est maximum diaphoreticum.

Exper.

Expertissima sequens Dolzi *Aqua expulsiua* mihi summè placet, quia delicata, efficax, & in pauca quantitate exhibetur.

*Aqua Expulsiua
Dolzi ex-
perta,*

℞. *Rad. Contrajervæ
Scorzonæ.
Fenicul. aa ʒʒ.
Folior. Scordii
Scabios.
Flor. Trinitatis
Aquileg.
Calendul.
Bugloss.
Violar. aa Mʒ.
Rafur. C. C. ʒvj.
Gum. Lacce. ʒij.
Sem. Aquileg. ʒʒ.*

Concis: & Contus: Infunde & destilla in *Decocto Lentum* q. s. Signetur *Aqua expulsiua*, de qua singulis sex horis a. vel ʒ. cochlearia exhibenda.

Vel potio in forma Emulsionis,

*Potio in
forma E-
mulsionis*

℞. *Sem. Napi
Aquilegiæ (vel sem. Citri)
Card. bened.
Urtica aa ʒij.
Melonum ʒij.*

Con-

Contunde in mortario lapideo vel vitreo, sensim affuando
 ▽ & Fumar.

Flor. Tiliæ

Card. bened. aa ʒiij.

F. f. a. Emulsio, cui adde

Syr. Granator. ʒiij.

Quam si edulcorare velis, adijunge *manus Christi perlat.*
 ʒj. vel ʒiij. pro aliquot vicibus, cum qua etiam Emulsione poterunt & debent exhiberi Pulveres supra dicti, vel C. C. ppt.
 ʒiij. Magist. Corall. ʒj. ~ C. C. gut. x. & alia.

Alia Emulsio Dolæi.

Alia Emulsio Dolæi.

℞. Sem. Aquileg.

Napi

Card. bened. aa ʒij.

Cum Aq. Fumar. & Scorzonæ. q. s. f. Emulsio.

Alia Emulsio Jüncken.

Alia Jüncken.

℞. Sem. Card. bened.

Aquileg. aa ʒij.

Citri. ʒj.

Cum Aq. Fumar. & Scorzonæ. f. Emulsio, cui adde

C. C. phil. ppt.

Margarit. ppt. aa ʒß.

Lap. Bezoar. gr. iij.

Misce pro una aut pluribus Dosis pro ratione ætatis.

X

Vel

menta ex Theriaca, Confect. Alchem. & Ol. scorpion. Matthioli præterea simul in omnibus iusculis dissolvatur Bezoartici mineralis in infante gr. iij. in adultis ʒʒ. Hæc Riverius.

Dolæus in retrocessu Variolarum & Morbillorum cum magna anxietate magni facit *volatilia salina* intrò sumpta; ex omnibus autem eligit, quod raro illum fefellit, *Essent. Myrrhe*, cum *u* *olis* *xi* *vinoso paratam*, vel *Elixir Proprietatis volatile*, cuius usum etiam reperi egregium (inquit) in scabie retropulsâ, mensibus ac lochiis deficientibus, vel non debitè fluentibus. In hoc casu etiam conducunt *vesicatoria*, præsertim si catarrhus suffocativus metuatur, manibus & pedibus applicata.

Dolæus ex-
tolit vola-
tilia salina

Vesicato-
ria.

Nota *Primò*, *Lapidem Bezoar* non nimis frequenter esse exhibendum, quia ob suam vim mercurialem humores sursum potenter pellit ad fauces & caput, unde tumor & apoplexia fieri solet, itâ Sorbait, & Mauriceau. Alii autem contrarium defendunt, asseruntque Lapidem bezoarticum malignitati resistere, corquè & totum hominem sine noxa roborare, adeoque nimis certum esse, quòd usus & experientia aliud ostendat, modò in debita dosi & tempore cum grano salis adhibeatur, DEUS enim & experientia sunt supra probationes testium, factum enim ipsum testatur, quæ si cuilibet licitum foret negare, nullus fur vel latro de crimine convinci posset.

Aliqui ve-
tant lapide
bezoar fre-
quentem
usum.
Rationes
eorum,

Experien-
tia verò e-
jus usum
comprobat
salutare.

Nota *Secundò*, Extra pro difficultate in expellendis Variolis & Morbillis, ego felici successu & multiplici experientia *Oleum Scorpionum Matthioli* adhibui, quò inangi jubeo patientes sub axillis, in inguinibus, in junctura genuum & cubiti, quandoque etiam si necessitas urget in spina dorsi, & aliis etiam artuum articulationibus, non omitendo interrim post inunctionem usum expellentium, dictamque inunctionem bis de die, idque per duas, aut etiam tres dies continuando. Non minùs etiam miraculosè operantur frictiones

Extra pro
facili & anda
expulsionem
nebis usita
ta.
Oleum
scorpionis,

Frictiones
partium.
Vesicato-
ria,

asperæ extremarum partium & spinæ dorſi, atque ſic poris dilatatis, facilior ſit humorum expulſio. Idem etiam meâ experientiâ præſtant *veſicatoria*, quæ tamen diu aperta ſervanda ſunt.

Annotatio-
nes in ex-
hibendis
remediis
expellentibus.

Quamdiu
iis utendū,

Nota *Tertio*, quòd omnia hæcenus recensita medica-
menta quæ Variolarum expulſionem adjuvant, in omnibus
ægotantibus non ſint uſurpanda, interdum enim tanto im-
petu per ſe erumpunt, ut earum motus aliquantiſper cohi-
bendus ſit, maxima enim eſt efferveſcentia, & hæc niſi tem-
peretur, ad vitæ exitum ægotantes perducere conſuevit, ideò
frænantibus, & modicè refrigerantibus, teſte Amato Luſi-
tano *Curation. Medicar.* 18. Cent. 3. tunc temporis uti con-
venit. Ideoque *Julapia* modicè refrigerantia ſunt adhiben-
da, & potus ordinarius ex *Decocto bordei & radice Acroſæ*
confici poteſt, quæ remedia tamdiu continuanda, donec fer-
vor aliquantulum remiſerit, poſtea verò ea quæ expulſionem
promoveant in uſum trahenda, ſi natura eorum auxilio indi-
gere videatur, & tam diu continuanda, donec omnis ſuſpi-
cio mali abſit: Ego hucusque in praxi, ut plurimum ad de-
cimam vel decimam quartam diem, imò ſi malignitas aderat,
ad decimam octavam, in pari tamen doſi, hoc eſt plus vel
minus continuare ſoliuſum: hiſce enim diaphoreticis ichor
ille acris & erodens inſringitur, & ad exhalationem ſeu tranſ-
pirationem quaſi ſenſibilem diſponitur, unde exſiccata Va-
rio æ ſpontè decidunt, nullis vel exiguis poſt ſe reliſtis veſti-
giis, unde nec melius nec tutius ad præcavendas foveas com-
mendare poſſum remedium, quàm diligentem & continuatum
uſum expellentium: Itaque quamdiu minimum veſtigium
Morbilloꝝ apparet, & quamdiu non omnes cruſtæ in toto
corpor: ex Variolis deciderint, ſemper continuandum eſt
in expellentibus; imò quamdiu Morbilli evareſcere non in-
cipiunt, & Variolæ rumpantur & concidunt, tam diu eſt in-
ſiſten-

Lap. Bezoar. Orient. gr. iij.

∇æ. Card. bened. zij.

Syr. de Scordio ʒβ.

Misce f. Potio sudorifera, quæ propinetur applicatis, ut supra diximus, ad latera ampullis vel vesicis aquâ plenâ, vel pennis calidis &c.

Nota per parenthesis, quod plerique multum errent, qui Theriacam, etiam in adultis in tam parva dosi ad ʒj. vel ad summum ad ʒj. exhibent, in quâ dosi vix tria, ad summum xv. grana pulverum continentur, reliquum purum est mel: itaque tempore necessitatis satius est exhibere pro Dosi ʒij. vel ʒiij.

Dosis Theriacæ in adultis.

Riverius *Obser. Cent. 2. Obs. 2.* laudat sequentem *Potionem* in Variolis depressis ad illas expellendas & tumefaciendas sæpius expertam.

℞. Rad. Pentaphyll.

Tormentill. aa ʒj.

Fol. Pimpinell.

Scordii aa Mj.

Santal. citrin.

Rasur. Ebor. aa ʒij. 1.

Coque ad ʒix. in Colatur ʒiij. solve Ag. Naphthæ & Rosar.

Troch. Viper. ʒj.

aa ʒβ.

Lap. Bezoar. orient. gr. xv.

Potio Riverii ad Variolas depressas.

Quæ grandioribus detur uno haustu bis in die, lac verò sugentibus ex cochleari frequenter. Ego loco Radicis Pentaphylli potius *Radicem Scorzonerae*, & loco Trochiscorum Viperinor. præferrem *Pulverem Viperarum verum*.

Vel loco hujus Decocti, potest accipi *Decoctum Estimaticum Domini Franchimont*, supra descriptum.

sistendum dosi ordinariæ fortiori, postea verò expellentia dantur in minori dosi, hoc est bis, & tandem etiam semel tantum de die.

CAPUT XIV.

De Diata in Variolis & Morbillis.

HÆc secundum sex res non naturales instituenda est, ut eius exactissima ratio habeatur, quia per illam solam bene institutam, curatio citò tutò ac jucundè frequenter absolvitur, secùs verò si fiat, errores commissi morte puniuntur.

Diata.

Imò. Aër sit subcalidus, quia sic melius patent pori, & Variolarum eruptio promovetur; arceantur itaque frigora venti, janua fenestrisque bene clausis, ut nimirum nullum frigus ad decumbentis lectum perveniat, quippe si ad illum sudantem, vel in humido jacentem nimium aliquod frigus accedat, vel ipse sese jactando, aut tegumenta abiciendo denudet, aut sudorem dispellat facillimè contingit, ut cum maximo suo damno jam erumpentes Variolæ retrocedant vel derumescant, vel subsideant cum vitæ periculo. Ob hanc ipsam rationem svalet Dimerbroeck, ut ægri ante decimum quartum diem indusia non mutant, nè per illam mutationem frigus etiam admittant, ut exemplis demonstrat, sed potius ut indusia à sudore ægri madida, in lecto à corpore ægri calore rursus sponte paulatim exsiccentur, & æger per aliquot dies sudoris ac Variolarum eruptionem, ejusdemque fatores patienter ferat, quam ut periculum incurrat. Quod assertum Authoris in stricto sensu nullatenus approbo, quòd in sua experientia fundatur, cum præprimis præ madore humo-

Qualis Aër Variolaribus eligendus.

Frigus summe est nocivum variolantibus, Dimerbroeck cautela de indusiorum mutatione.

Nos Authoris assertum non approbamus.

rum

Rationes
allegantur.

Indusia sint
calida quæ
post sudo-
res induun-
tur.
Caput non
arête regen-
dum,
Rationes,

Viſtas ra-
tio debet
eſſe tenuis.

Qualis fi-
bus porri-
gendus &
quandiu
taſi uten-
dum.
Qui cibis
vitandus,

rum excrementitiorum, ſi continuo ſubſiſtant, aut in corpore rareſcant, & expulſionem poros obſtruendo præpediant, corruptionem inducant, & alia longè majora pericula minentur. Magis igitur accepta eſt hujus aſſerti limitatio, quàm Author ipſe annexit ſi forte (inquit) contigerit, ut induſium & lodices mutare neceſſe ſit, tunc procurandum ut rurfus talia dentur linteamina, quæ jam ab ipſo egro, vel ab alio ſanojam antè geſtata ſunt; nam nova ordinariè nocuiſſe obſervatum fuit, quod vel humiditati à lotione, vel ſaponis fetori adſcribendum quidam autumant. Induſia itaque & linteamina induenda aut mutanda bene ad ignem calefacta adhibeantur. Notandum etiam, ne caput arctis & ſtriſtis capitii obvolvatur, quia per hoc capitis calor augetur, & ibidem præpedita eruptione in facie adaugentur Variolæ. Imò ſub iſtis ſtriſtis ligaturis ulcera ſæpe oriuntur: Cum magno itaque moderamine hæc omnia ſiant, ne nimirum extrema tentemus, alias enim per nimium calorem externum nimiaque tegumenta febris accenditur, vel Archæus irritatur, & ægri ſæpe ſuffocantur. Medium in his tenere, beati. Quæ & qualia tegumenta in his eſſe oporteat, ſupra declaratum eſt.

Iſtæ, Viſtus ratio quoad Cibum & Potum tenuis eſſe debet, quamvis ſubinde in pueris ob conſuetudinem & plurimum calorem, in ſenibus ob virium imbecillitatem, paulo plenior concedi debet, ſicut & in peſte, in qua tùm morbus, tùm vires inedia læduntur, ſatiùs tamen eſt viſtum à principio tenuem exhibere, præcipuè à morbi exordio, uſque ad ſeptimam vel etiam decimam quartam diem. Cibus igitur ſi febris magna adſit, modicè ſit refrigerans, modicè adſtringens & incrallans, nè ſanguis in partem principem impetu quodam irruat; & hoc continuet uſque ad declinationis finem, nec carnes in principio guſtet, licè eſuriat, vitentur cibi acres, calidi, falſi, pingues, dulces, tùm etiam amari & acidi, nam tales vel ſanguinem & humores agitare credun-

tur

tur in confuſionem & fervorem, vel ſi acidi ſint, præſatos
 liquores magis congelant & adſtrictione vaſorum oſcula con-
 trahuntur, ut Variolæ minùs liberè erumpant. Carnes & Carnes con-
 ſolent.
 ovorum vitella à multis non probantur, ſaltem antequam pe-
 riculo æger deſungatur, quæ poſtmodum meo iudicio impro-
 bari non poſſunt. Ratio prioris eſt, quòd ſimilibus ſan-
 guis ob nimiam pabuli ſulphurei copiam, plus minùs debite
 accenditur, & tunc ſufficiunt avenata, hordeata cereviſia te-
 nuis &c. verbo, cibi pauci & facilis concoctionis, ideò ſolis
 ſorbitionibus alendos ægros vult Hippocrates, dentur ergò
 juſcula carnum & upeptorum & ea ſi lubet Cichorio, Endivia,
 Borragine & ſimilibus alterentur. Hordeata quoque & amyg-
 dalata ſuccis Granatorum & Limonum alterata, multum pro-
 ſunt; primis quatuor diebus, ſi poſſibile, hoc ſolo juſculo ſe
 contentare, ſuadet *Timæus*. *ꝛ. Hordei mund. Paſſul. mi-* juſculum
 Timæi,
nor. ſicum aa. q. v. Coque ſimul & factâ coctione abſtrahe
 liquidum, cui adde parum de butyro & pane, & da ægro, quod
 maximè conducit, quia expellit, probè nutrit, & facile di-
 geritur, defendit os, fauces, pectus, ſtomachum, inteſtina,
 & alvum ſervat apertam. Vel detur *panatella ex pane albo*
& brodio carnis facta, vel etiam coqui poteſt *pulmentum ex*
farina & amygdalis, vel in aſvetis *ex cereviſia tenuiore ſeu*
triticea cum pane albo bene fermentato fieri juſculum, quod
 vulgò vocant *grammaticam*, vel *jus medicorum*.

Ego ſequentes cibos in uſu & felici ſucceſſu habeo, nem-
 pe duabus horis poſt exhibitionem ſudoriferorum expellentiu-
 um, dedi vel bonum juſculum carnis, vel pulli cum ſemelle
bucellis, vel loco hujus mox memorata alimenta, vel ſubinde
 etiam globulos ex ſemella. Omnibus tamen iſtis jam memo-
 ratis alimentis, quotieſcunque aliquid eorum dedi, ſemper
 immiſceui unum vel alterum cochlear *Gelatine C. C.* cum vel
 ſine *raſura Eboris* factæ, quæ plurimum facit. Si verò dictio-
 res & delicati ſint, loco jam dictæ gelatinæ, ordinariè fieri
 cura-

juſcula her-
 bis alterata
 conveni-
 unt.

juſculum
 Timæi,

Ejus virtutes,

Noſtra ci-
 borum ra-
 tio in va-
 riol. utibus
 in ſtatu
 morbi,

curavi hanc meam Gelatinam pretiosam, in Variolis, Morbillis & omnibus febribus malignis efficacem, suavem & restaurantem:

Gelatina
nostra pre-
tiosa.

℞ Rasur. C. C. ℥ij.

Eboris. ℥j.

Cum Aq. flor. Borræg. & Aq. ex toto Citro abluantur, deinde decoque in juscule caponis q. s. & fiat Gelatina:

℞ Hujus Gelatinæ ℥iv.

Rob Ribium.

Conf. Acetosit. Citri (vel Conf. Acetosell.)

Flor. Tunice aa ℥j.

Vini Cydonior. ℥jβ.

Transcolentur cum Aquæ ex toto Citro ℥jβ. Addendo & solvendo in Celatina

Lap. Bezoar.

Unicornu ver. aa 3β.

Succi Granat. acid. q. s.

Sacchari parum, pro conservatione.

Misce f. l. a. Gelatina pro usu, datur ad vitrum

Quandoquæ etiam concedo jusculum ex vitellis ovorum & semella factum, vulgò Eyer Versil. Et si alius nimium obstructa & multis diebus constipata sit, pruna cocta, & pul-
pam seu pulmentum ex passulis exhibeo. Post eruptionem
Variolarum verò, cessante febre & pustulis separatis, crustis-
que cadentibus solidiores cibos impertior, quales sunt carnes
pullorum, agnina, vitulina, ova forbilia &c. Hic obiter
notandum, quòd de dulcibus in victu ratione seu dicta scri-
bis

Cibandi ra-
tio in de-
clinatione.

bit Mercurialis; *potissimum autem cavendum* inquit, *à dul-*
cibus omnibus, & in potu & in cibo, additque quod *Aven-*
zoar scribat, eos qui dulcibus utuntur, vix posse servari.
 Verùm hæc ejus opinio non convenit cum praxi; quã ^{An dulcia}
 docemur, *Glycyrrhizam, ficus Iujubas, passulas & similiã* ^{in Variolis}
 dulcia materiam citius coquere, & versus exteriora propel- ^{profiat.}
 lere, ergò dulcia non obesse ratio & experientia probat, &
 ipsa authoritas Mercurialis aliquantum post contestatur,
 dum ipse scribit, quod ficus aridas concedere soleat pro cibo.
 Hæc sententia meo judicio pro utraque parte adhibita, ta-
 men distinctione salvari potest, nimirum dulcia naturalia,
 & dulcia, quæ in se notabile fermentum non continent, id est, ^{Duplicia}
 quæ sub forma dulcedinis absconditum acidum, seu acorem ^{dantur dul-}
 non habent, non obesse (qualia recensita jam sunt) conce- ^{cia.}
 do, dulcia autem artificialia, seu dulcia talia, quæ in se con-
 tinent subdolan aciditatem, uti sunt omnia saccharata, vi-
 na duleia &c. non obesse, nego.

Potus in aslvetis, & ubi non adest intensissima febris, sit ^{Q-alis po-}
cerevisia tenuis, cui immergatur *Rasura C. C. Radix Scorzo-* ^{tus conve-}
neræ, Sem. Aquilegiæ vel Napi, vel *Citri* de quo plus infra: ^{niat.}
Potus sit Decoctum Lentium cum pauca *Myrrha,* ubi tamen
 probè notandum, magnam inter Authores versari litem, u- ^{Utrum}
 trum *Lentes* in his affectibus convenire possint. Qui affir- ^{Lentes in}
 mativam tenent, utpote *Avicenna* alique *Authores Arabes,* ^{Variolis}
Mercatus, Augenius, Dioscorides, Sennertus, asserunt, ^{conducant.}
 inter omnia medicamenta vel alimenta *Lentes* primum lo- ^{Affirman-}
 cum obtinere, imò occultâ proprietate huic malo opitulari ^{tium Au-}
 scribunt, *Medicosque inexpertos & ignaros* docent, qui il- ^{thoritates.}
 las improbant; atque licet uti alimentum in substantia non
 conveniant, convenire tamen ut medicamentum, ad cau-
 sam in superficiem expellendam; scribunt enim illas valere
 vi adstrictivâ, quia viscera roborant, quæ viscera roborata
 humores pellunt ad habitum corporis; imò nec desunt, qui

Alimentū
ex lentibus
incommodum
præbet, non
vero ex iis
factum me-
dicamen-
tum.

Authori-
tes contra
usum lenti-
um in Va-
riolis.

ajunt, eas humorum sanguinisque fervorem retundere, motumque compescere, quam doctrinam desumunt à Galeno qui *x. de aliment. facultat. Cap. 18.* Lentescas partes naturales roborare, & adstrictione, quæ pollent, ventris fluxum cohibere docuit: Quamobrem quæ contra Lentium usum afferuntur, ea de iis ut alimento intelligenda sunt, nam non negatur, sed verum omnino est, Lentescas cibum omnino inmodum exhibere, in quem usum ut satis elixentur, diu coquendæ sunt, interim tamen nihil prohibet, quin in medicamenti loco Decoctum, quod ex iis saltem subtilius est attrahitur, exhibitum, ad promovendam Variolarum eruptionem occultâ vi facillè facere possit, unde etiam à nonnullis signaturâ suâ seu formâ, Variolis similes esse statuuntur: ut verò in Peste & verè pestilentibus febribus exhibeantur, non undequaque svident, sed tunc potius ad vera alexipharmaca confugiendum esse putant, omnino, si exhibendæ sunt, tutius cum aliis quàm solæ exhibeantur: Accedit, quod ab Arabum tempore celebri in usu semper extiterint, Arabes autem in viribus medicamentorum explorandis, Græcis fuisse multò diligentiores. Alii verò sunt & quidem celeberrimi Practici, inter quos Amatus Lusitanus. 2. in *Dioscor. Cap. 101.* Cardanus *Lib. 2. de tuenda sanitate Cap. 12.* Ioannes Baptista Sylvaticus *Conrovers. 92.* quos sequi videtur Sennertus *Lib. 2. Instit. Medic. part. 1. Cap. 3.* (licet idem paulò aliter sentiat *Lib. 4. de febr. Cap. 10.*) Thomas Bartholinus in *Cista medica loculo 58. quest. 6.* Refutantes & damnantes Medicos, qui in pleuritide & acutis morbis *Lentes* præscribunt, idque autoritate Galeni, qui lentescas esse dispeptas, crassum succum generare, elephantiasin & caræ os excitare. Et 8. *simplicium*, earumque decoctum alvum solvere, quod in Variolis noxium esse scribit. Doctissimus Avicenna, *carve* inquit, *ne detur potus Lentium materiâ existente crassâ.* Mercurialis prodesse putat, si aliquid admisceatur, quod crassitiem illarum attenuare possit, laudatque

darque Arabes, qui illas aceto incoquunt. Alii rursus sunt, qui corticem adstringere scribunt, substantiam verò aperire, idè coquunt vel cum cortice, vel sine cortice, idque vel semel tantum, vel bis, aut etiam ter, ad sanguinis fervorem compescendum, exhibent cum cortice bis coctas, priore decoctio abjecta, sed ad modicè provocandas, sine cortice bis coctas præbent. Avicenna *Cap. de synocha febre* Lentes ad sanguinem incrassandum commendat, non ad promovendam expulsionem ad cutim, idè convenire Variolis vix possunt.

Com igitur hujus remedii facultas ignota sit hætenus & dubia, è contra certissimum sit, ab omnibus plerumque improbari, quod vitiosi sint succi, mentem turbent, sanguinem melancholicum generent, scribatque Galenus, pleuriticum ex earum usu interiisse, sanè, tam ineptum alimentum vix creditur bonum esse medicamentum, & quia certiora & tutiora nec non svaviora (salvò tamen experientia jure) suppediantur, ab eo impostero obstinendum multi judicant: vel si lubet cum Horstio tenere, *Tom. 2. pag. 309.* decoctum Lentium tunc tantum convenire posse, ubi magna est subtilioris sanguinis ebullitio, adstringunt enim & incrassant, secus tenet in aliis casibus: Præscribi igitur vel omitti à Medico curante poterunt, prout major vel minor est subtilioris sanguinis ebullitio (ubi adhibenda) vel crassæ materiæ quæ segniter ad cutem propellitur, & tunc omittenda, uti & *Tragacanthum* & reliqua, unde patet, (uti monet Riverius) remediorum formulis ab Auctoribus præscriptis, non esse arctè insistendum, sed in variis casibus variè esse immutandas, sic autem ubi concedi potest, parat:

℞. *Lentium excorticat. Mj.*

Liquirit. zij.

Y 3

Sem.

Sem. Fenicul. ʒj.

Tragacanth. ʒij.

Coque in *dimidia mensur. Aquæ simplicis* ad tertias. Colaturæ adde, si vis, *modicum sacchari.*

Ego in praxi hunc modum feliciter adhibeo:

℞. *Lentium Mj.*

Noster modus parandi decoctum ex Lentibus,

Coque in ℥. v. *Aquæ fontan.* unicâ ebullitione, quâ rursus abjectâ & decantatâ reaffunde noviter *Aquæ fontanæ* ℥. v. addando ʒij. vel ʒß. *Rasur. C. C. ficuum Nō. 2.* vel ʒ. (vel loco ficuum detur ʒj. *Passular. min.:*) coque simul ad lentium crepaturam coletur & bibatur.

Decoctum pro iis qui lentium decoctum renuunt,

Nota, in iis qui Lentium decoctum bibere renuunt, auct suffere nequeunt, do *cerevisiam, triticam defæcatum*, cum *ficubus* coctam: Si & hanc renuant, porrigo *cerevisiam albam puram*, in qua suspendo hunc Nodulum;

Nodulus pro iis qui dictum decoctum non arrident

℞. *Semin. Rapar. ʒij.*

Rasur. C. C. vel C. C. ppt. ʒij.

Sem. Napi ʒj.

Pulv. Pannon. rub. vel Pulv. ad Variol. ʒiv.

Alius nodulus pro potu in delicatâ,

Mixta & contusa dentur ad Nodulum. Vel in delicatis & Medicinam averfantibus, accipio *C. C. phil. pp. ʒij* vel ʒj. plus, minus, & includo nodulo, atque in potu ordinario suspendo. Vel *Nodulus Michaelis* in potu ordinario suspendendus;

Nodulus pro potu Michaelis,

℞. *Flor. Aquilegiæ*

Calendule

Scabiosæ aa p. iij.

Rad. Scorzonæ. ʒß.

Contra-

Contraieru. ʒiʒ.

Sem. Aquileg.

Napi

Card. bened. aa ʒvj.

Rasur. C. C. ʒj.

☿ Sigillat. ʒʒ.

F. secundum artem Nodulus.

Vel ʒ. Rad. Scorzon. ʒj.

Alius.

Rasur. C. C. ʒvj.

Terr. Sigillat. ʒiʒ.

Flor. Ulmarie

Fumarie

Enule

Calendul. aa p. ij.

Aquileg. piij.

Sem. Napi.

Aquileg. aa ʒʒ.

Card. bened. ʒij.

Misce, fiat Nodulus.

Dolzus sequentia vel potui, vel cerevisie indic?

ʒ. Flor. Bugloss.

Borragin.

Calendul.

Aquileg.

Trinitat. aa Mj.

Rasur. C. C. ʒij.

Dolzus
hæc potui
indic.

Gum.

Gumm. Lacca, ʒij.

Albi Græci ʒij.

Misce (illud ultimum in delicatis omitti judico) singulis alternis diebus, maaiulus ex his speciebus indi potest potui ordinario.

Vel fiat Nodulus ex *Sem. Aquilegiae*, *Terra sigillata*, *C. C. philosophicè* ppto. Vel detur *Tinctura* *Florum Aquilegiae* aquâ fervente secundum artem extracta, cum *Spiritu* ʒij acidulata & potui admixta. Alii, loco horum *Decoctum hordei* & *ficuum* exhibent, ficus enim insignem vim habent pellendi humores ad cutem, ut testatur, præter centenos Mizaldus *Memorabil. arcanor. Cent. 8 Num. 770.* | *Fischerus Fol. 756.* Neque metuendum est, ut ab earum dulcedine incommodum concitetur, cum id *Decocto hordei* vel *vino Granatorum* facile corrigatur.

Timæus dat *Ųam hordei* cum *ficubus*, *passulis* & *liquiritia* coctum: Vel pro majori gustu adhibet sequens *Julapium* pro potu:

Julapium,
Timæi pro
potu,

ʒij. *Syr. Violar. opt.* ʒij.

ʒij. ʒij. *ʒis. gut. xij.*

Misce exactissimè & postea adde *Aque Scabiosæ*, *Acepsæ*, *Carduibenedicti* aa ʒij. Misce.

Vel *Decoctum Avicennæ*, curat enim & optime defendit omnes internas partes, quod æquè valet pro potu ordinario.

Decoctum
Avicennæ,

ʒij. *Ficuum pinguium* ʒij.

Lentium excorticat. (hæ defendunt ventriculum & intestina) ʒij.

Lacæ lotæ (prodest hepatis & lieni) ʒij.

Træ

Tragacanth. (conducit pectori, pulmonibus & renibus) ʒiij.

Coque in *℥iij. Aq. fontan.*: ad consumpt. tertiæ partis, coletur per linteum, & æger bibat de hoc pro libitu.

Thiermayer in usu & praxi habuit sequens. *℞. Lentium* ^{Deco.} ^{Thiermayer} *excorticatar.* ʒj. Decoque in *f. q. Aquæ*, abjectâ primâ cocturâ (nam hæc teste Dioscoride *Lib. 2. Cap. 100.* alvum solvit) has Lentes jam coctas accipe, & adde *Caricar. ping. Nō viij. C. C. uſt. ʒiij.* Affunde *Aquæ fontan. ℥v.* coque ad consumptionem unius libræ sub finem inciiciendo *Cinamomi ʒj.* tandem si placet (sed opus non est) adde *Syrupi Acetosit. Citri,* vel *Granatorum: q. s.* pro potu ordinario. Vel, si alius sit nimium stiptica & febris intensa, talis *Potus* ex eodem dari potest.

℞. C. C. uſt. ʒviij.

Sem. Rapar.

Rad. Acetos. aa ʒiij.

Sem. Fenicul. ʒß.

Ficuum. Nō. iij. vel

Passul. minor. ʒß.

Œri. ppt. ʒij.

Cinamom. ʒj.

Aliud ejusdem ubi alvus est stiptica.

Concisâ & Contusa dentur. Signentur, Species pro potu ordinario. *Ab initio* inquit Crato & Mæbrius in *Concil. Lib. 3. Concil. 25.* nil melius est quàm *Aqua Feniculi edulcorata saccharo cando*, quia *vehementer expellit & defendit internas partes, maximè pectus & tussim.* Paræus laudat *Decoctum Milii, ficuum & Passularum*, cum *saccharo*, quod potenter sudorem pellit. Multi sunt, qui si febris urgeat, *Tincturam Rosarum* feliliter propinant.

Vino an uti
liceat.
Quo tem-
pore & qua
li vino.
Quibus in
calibus.

Consuetu-
dini etiam
liquid
dandum.

Explicatio
Aphorismi
Hipp. 50.
sect. 2.

Vino omnino abstinendum, teste Foresto, Lib. 6. Obs. 41.
46. & 49. Præterquam iis erumpentibus, tuncque convenit
Oliogophorum, seu aquâ dilutum, vel quod melius *Aquâ Car-*
duibenedicti vel *Scorzonæ* attemperatum, modò febris non
vehemens adsit, nec caput doleat, nec æger deliret, remit-
tantque symptomata, præsertim in instante maturatione (te-
ste Sydenham & Jüncken) singulo malè & nocte aliquot coch-
learia vini indulgeri possunt, quò sic circulantes humoris re-
liquias, vel fortè regurgitantes particulas materiæ variolose
paulò fortiùs cohibeant, & reiiciant, præsertim in iis qui vi-
no assueti sunt teste Hippocrate. 2. Aphor. 50. *Consuetudo lon-*
go tempore, etsi deteriora sint, infvetis minus molesta esse so-
lent. quare ad insolita quoque facienda mutatio. In quo apho-
rismo divus Senex duò utilissima præcepta proponit. Primò
quòd assueta minùs molesta sint & amica, nam consuetudo
est altera natura, & ab assuetis non fit passio. Secundò,
quòd ad insolita sæpe fit facienda mutatio. Ratio prioris da-
ri potest varia, quæ cum longo tempore sunt assueta, licet
deteriora videantur, naturæ tamen sunt magis amica, ergò
etiam minùs molesta; Ratio rationis desumitur ex hoc, quia
ex longo usu inter naturam & assueta facta præsupponitur a-
micitia, juxta illud: consuetudo altera natura. Vel, ab as-
suetis non fit passio. Ex prima præcepti ratione deducitur
ratio secundi, nam si minùs molesta assueta, consonum ratio-
ni videretur, ad securitatem vitæ faciendam esse ad contraria
mutationem. Quod ut clariùs pateat

Norandum Primò, Quòd consuetudo sit triplex, alia
bona, alia mala, alia pessima, si enim homo temperatus, as-
suetus est temperatis, bona est, si intemperans non multùm
mala, si vero intemperans excessivè, tunc pessima est. Prima
licet ad sanitatem commendetur, non tamen ad vitæ securi-
tatem utilis, & idèd monet *Hippocrates*, faciendam esse mu-
tationem per intervalla ad contraria, qui enim vino est assue-

tus

rus & illi conducit, confert aliquando aquam bibere. Mala consuetudo, si fuerit recens, tollenda quamprimum. Ratio: nam temporis progressu solet graviter lædere: at si mala consuetudo fuerit vetus, non est tollenda. Ratio: quia illi naturæ est bona, si tantum temporis durare potuit; facienda tamen etiam ea mutatio aliquando ad contraria. Pessima consuetudo, quando vel suâ naturâ fit excessus, vel per accidens, ut si quis aquam bibat, & illi sit assuetus, usque ad senectutem, & labore crudicibus, & sit imbecillis, mutanda est consuetudo, & transeundum ad vinum. Ratio: quia aqua senibus & imbellibus pessima est, vinum vero lac senum dicitur.

Notandum *Secundo*, Quod mutatio consuetudinis vel sit in sanis, vel in ægris: si fiat in ægris, repente facienda, nec propterea læditur. Ratio: quia corpus per morbum etiam repente mutatur, & quò major fuerit morbus, major mutatio, idè in acutissimo morbo nihil exhibemus, & provino aquam, pro cibo sorbitionem dare iubemus; At si fiat in sanis, paulatim facienda, idè dicebat Hippocrates. 6. *Epid.* Contraria paulatim adhibenda: quod enucleatè repetit *Aphorismo sequenti* scilicet 51. *sect. 2.* *Plurimum & repente vacuare vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, vel alio quo vis modo corpus movere, periculosum* (rationem addit) *omne siquidem nimium. natura inimicum, paulatim verò quod sit tutum, & præsertim si quis ab uno ad alterum transferit.* Etenim in hoc Aphorismo Hippocrates nil aliud intendit, quàm ut doceat, quod Medicus dum operatur, in mente habere debeat, ut si non prosit, modò non obsit, quod & Galenus sapissimè inculcat; non prodest autem Medicus, dum magnas & periculosas efficit mutationes. Ratio est jam in ipso textu docta, omne siquidem nimium, naturæ inimicum; medium enim tenere beati, & juxta illud vetus Imperatoris adagium: Ne quid nimis: nam virtus & natura in medio consistit.

Sciendum autem est *Primò*, Quòd mutatio vel est ad bonum, vel ad malum, 2dò vel est à negotio, vel ad contrarium. 3tiò vel à contrario ad contrarium, vel ad medium. 4tò aut est in sanis, aut ægris, aut neutris, rursus in ægris vel fit in morbo parvo, vel in magno, vel in mediocri, de quacunque mutatione vera est sententia allata, periculosa nempe esse magnam & repentinam mutationem. Nontamen idèò omittenda est extrema mutatio, quando necessitas urget. Ratio desumitur ab Hippocrate 1. *Aphorism.* 6. quia *extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt.* Ratio Rationis patet, eùm enim contraria contrariis curentur, similia similibus conserventur & remedium debeat esse æquale morbo, si ergò morbus extremus est ut supponimus in necessitate, remedium etiã extremum esse debere consequens est.

Sciendum autem *Secundò*, Quòd mutatio, quæ est à negotio ad orium, vel à labore ad quietem, vel à malo ad bonum, minùs periculosa est, quàm earum opposita, & minus periculosa in ægris & neutris, quàm in sanis. Ratio: quia sanitas mutationem non indicat, sed conservationem.

Sciendum *Tertiò*, Quòd mutatio consuetudinis, vel est ad inducendam contrariam dispositionem, vel solùm ad securitatem sanitatis; primam appellat Hippocrates mutationem ab uno ad aliud, in contextu, secundam vero mutationem simpliciter. Idèò monet vitandam esse magnam & repentinam mutationem in ambabus, sed maximè in prima, ut cum intemperiem cognatam reducere volumus ad mediocrem, in sano.

Sciendum *Quartò*, Quòd mutatio fiat per æqualia, vel in gradu vel in numero, hoc est, minori, medio, sed pluris repetito, ut est paulatim mutare. Ratio: quia totum. Ratio Rationis: quia si error contingit, minùs læditur corpus. Rationis ratio: *experimentum enim periculosum Aphor.* 1.

Idèò

Ideo semper à levioribus est incipiendum, nisi morbi magnitudo nos inducat ad magnum remedium.

Sciendum *Quintò*, Quòd mutatio fieri potest, vel in rebus naturalibus, vel etiam non naturalibus, vel etiam iis quæ sunt præter naturam, de omnibus vera est sententia, magis tamen de naturalibus, quæ nullo modo nisi paulatim fert mutationem, inde etiam non naturalibus.

Quæri hic potest, utrum temperamentum innatum possit reduci ad melius? *Resp.* breviter cum Galeno, quod non. Ratio: nam hoc solius naturæ & DEI est opus, quod nullâ arte vel casu acquiri potest, sed ipsa est certa mixtio elementorum à DEO & Natura constituta: Attamen non ideo negandum est, intemperatum corpus à natura, reduci posse arte ad melius, loquendo saltem de temperie.

In summa denique, si naturæ vel consuetudini aliquid concedendum occurrit, id summâ cum cautione faciendum esse, si enim contrarium quid accadat rationi, id factis committendum, casuque tribuendum est, ut supra diximus ex Hippocrate, non oportere fidere iis, quæ ex ratione non levant, neque reformidare mala, quæ præter rationem contingunt, quod confirmat. 2. *Aphor.* 52. *Omnia secundum rationem facienti, si non succedant secundum rationem, non est transiendum ad aliud, manente eò, quod ab initio visum fuit.*

Ratio Aphorismi huius est, ut rationale remedium non facile mutetur, licet non succedat, quod videtur contra illos leves Medicos, qui dum vident non succedere unum, ad alterum & sic ad centum alia transiunt, fulciti illo trito theoremate: à juvantibus & lædentibus optimam sumi indicationem, aut malè, nesciunt enim se unum & alterum sine ratione adhibere, quod patet, cum subinde calida, subinde frigida, & id genus contraria præscribant, quæ rationi nunquam sunt tribuenda, & consequenter ab iis nulla sumenda indicatio.

Ratio rationis probatur sequenti argumento : mutatio remedii non debet fieri cum nocumento, sed mutatio rationalis remedii semper fit cum noxa, quod patet, quia si remedium rationale mutatur fit irrationale, & sic augens ipsum morbum. Hic tamen

Observandum *Primò*, Quòd remedium multipliciter mutari potest, vel secundum genus, vel secundum quantitatem, qualitatem aut tempus. Rursus in qualitate bifariè, scilicet occultâ vel manifestâ, intensâ vel remissâ cum specie, vel contrariâ cum genus mutatur, vel est ad contrarium, vel diversum, cum quantitas vel ad magis vel ad minus.

Observandum *Secundò*, Quòd morbus aliquando habet causam manifestam & cognitu facilem, aliquando obscuram & difficilem cognitu. Si morbus cognoscatur, vel fit scientificè, vel conjecturaliter, si conjecturâ, vel illâ quâ magis accidit ac scientiam, aut eâ; quæ est prope ignorantiam.

Observandum *Tertiò*, Quòd ubi morbus non cognoscitur, licet mutare remedia omnibus modis, juxta illud Hippocratis qui *Libro de locis in homine*, inquit: si quis morbum non cognoscat, medicamentum præbeat non forte, si itaque levatur æger, demonstrativum est, quod gracilitatem inducendo, curandus est, si non levatur, faciendum est contrarium, & si non profuerit gracilem facere, tumidum facere conducat & frequenter permutare, & sic non errabis.

Si verò cognoscitur morbus, fit vel scientiâ, vel conjecturâ scientificâ (quamvis neutram dari negem, contentus opinione probabili) Medicus statim debet adhibere remedia, illi convenientia, nec mutandum (licet res non succedat) remedium in genere, sed mutari potest, vel intensiōe vel numero, in eadem tamen specie. Ratio: quia natura aliquando ab assuetudine despiciit idem remedium.

Obfer-

Observandum *Quartò*, Quòd morbus non cedit remediis etiam rationalibus, vel quia crudus est, vel quia adest obstructio, aut abcessus, vel quia morbus ex iis est, qui non nisi paulatim tolli possunt, vel quia est insuperabilis, vel ob occultam qualitatem, vel ob temporis constitutionem, quare non debet Medicus mutare remedia ad contraria, persistente morbò in suo statu, à principio & bene cognito, sed debet reiterare idem remedium vel numero, vel specie. Quod si tamen morbus est inconstans & magnus, ita ut periculum sit in morà, licet omnem obire mutationem.

Observandum *Quintò*, Quòd medendi ratio sit duplex, alia per indicationem & dogmatica, alia per experientiam & empirica. Hic sermo potissimum est de remediis, quæ per indicationem habentur, quæ semper fit secundum rationem, at experientia non semper, cum itaque adest manifestè indicans, ut obstructio apertionem, repletio inanitionem, malignitas alexipharmacum, illa adhibenda; & reiteranda, quoad persistit, & quoad signa à principio perseverant.

Observandum tandem, quòd in hac sententia reprehendantur ut diximus illi Medici, qui ut aliquid sapere videantur, & nè, si moriatur æger, diffamentur ob auxiliorum inopiam, vel nè frustra mercedem accepisse videantur, in quacunque visitatione, aliquid de novo agunt, præscribunt & ordinant, naturæ opus intercipiendo, quæ quidem desiderat. Et hæc de vino ex consuetudine obiter, sed utiliter dicta, hic sufficiant, quæ ubique & in omnibus diligenter observanda.

Sed quæres? An vinum rubrum quod à plebe & præsertim famiis à proprietate, ut credunt, caloris ma-
An rubrum
vinum tu-
to exhibe-
ri possit.

Respondet
Grülingius.

gum expulsum dari tutò possit? Ad id responderet Grülingius *Obs. Cent. 4. Curat. 37. Expertus sum inquit, quod ii qui tale vinum potarunt mortui sunt ex motu naturæ inhibito, quò minus foràs protruderentur, sed febre autè capitis dolor increveret, ac delirio subsequente, mors subsequeretur.* Cujus Viri auctoritatem judico cum limitatione à nobis factà esse accipiendam, & attendendum, ne sive rubri, sive albi vini locò mustum substituatür, quod angue pejus est vitandum.

Somnus sit
moderat
Ratio.

Vigiliae
quoque
moderate.

Excrementa
alvi primis
diebus
non sunt
stimulanda

*III*tiò Somnus sit moderatus. Ratio: longus enim somnus eruptionem impedit, sicuti etiam omnem aliam quamcunque euacuationem, materiam in centrum revocat, febrem auget, & caput vaporibus replet. *Vigiliae* sint moderatae. Ne nimium resolutis spiritibus, virtus deficiat. Neque somnus inaeatur ante sumptum bezoarticum, seu sudoriferum;

*IV*tò Excrementa alvi cardius & negligentius sunt sollicitanda quàm in aliis morbis, imò ante perfectam eruptionem, licet diutius paulo adstricta sit, intempestivè non aperiatur, imò famosissima Authores sudent, ante septimam alvum non sollicitandum, idque non nisi notabili aliquà causâ urgente, nihilominus tamen nè febris accendatur, etiam tandem est alvus aperienda, sed minime acris, ne diarrhæa Variolis Morbillisque semper noxia exciteretur, sed iis, quæ supra in initio curæ dixi, purgantia enim ut venenum sunt vitanda.

Nos sequentibus
pro aperienda alvo,
debito tempore,
contentamur,

Ego in praxi, si alvus nimis & multis diebus sit constipata, prægressò jam tempore eruptionis, me contentavi pro expellenda alvo sequentibus: *Ballæ moschatae*, vulgò *bisanti Kugel*, quarum una vel altera in alvum fuit intrusa, priùs *butyro* vel *oleo* illita, vel *suppositoria ex melle solo cocta*, vel si opus erat *clyster ex brodio carnis* vel *lacte cum melle rosato*, & *oleo amygdalarum* vel *solosaccharo Thomæ*, & *vitello ovi confectus*, vel detur quandoque *pulpa passularum*, & alia ut supra dixi de cibo & potu.

Vid

Vtò, Motus & Quies. Ager corpore & animo quiescat, nè calor natus dissipetur, qui in expulsiōe materiæ morbificæ incumbit. Incipientibus tamen Variolis, ut diximus, lenes brachiorum & crurum frictiōes non improbantur, iis enim humoris noxii, apertis poris & tubulis attractio ad cutem iuvatur, à quibus tamen erit abstinendum, quando incipiunt eminere in habitum corporis.

Quomodo
ager in
motu &
quiete se
gerere de-
beat.

Vltò, Animi Pathemata omnia sunt vitanda, præprimis ira & tristitia. Ira enim æstu nimio sanguinem turbat & inflamat: Tristitia verò sanguinem pravam ad interiora retractum circa cor detinet. Gaudium moderatum nocere non potest, animus enim pacatus hic optimum est præservativum. Terror autem tantò magis nocet, utpote ex quo plurimi in hunc morbum inciderunt. De ira sentire videtur *Mercurialis* & putare, quod illa conducere possit. Inquit enim: *neque agrè ferendum est, quòd ægri interdum irascantur, quia ira nonnihil confert ad extrudendos humores ad superficiem corporis:* Sed utinam non conferret ad incrementum caloris & febris, atque exinde evenientes epilepsias.

Animi pa-
themata sa-
pienda,
præsertim
ira & tristi-
tia. Gaudium
prodest.
Terror no-
cet.

CAPUT XV.

De Correctione Symptomatum occurrentium in Variolis & Morbillis.

Correctio
symptoma-
tum,

IN hoc affectu non solum in hoc laborare debet Medicus, luc Variolæ & Morbilli erumpant, sed etiam maximi laboris est defendere partes tam externas (ut oculos, aures, nares, os & fauces, cutem) quam internas (ut hepar, pulmones, ventriculum, intestina, renes, & ipsis annexas particulas) quæ ab hac luce potenter infestantur, in quibus tamen magnâ cautione opus est, nè dum exiguis consuli-

Medici
officium
est, expul-
sionem Va-
riolarum
non modò
promovere
sed etiam

partes in-
ternas &
externas
descendere.

mus, nimiam pharmacorum molestiam, magnum naturae o-
pus intercumbemus. Etenim toto hoc tempore una & con-
tinua est crisis, quare nihil temere movendum est, maxi-
ma semper requiritur Medici & ministrantium sedulitas &
circumspectio, quam ut penitus assequi possit Medicus,
ordine singula occurrentia symptomata eorumque remedia
proponemus.

Dolor ca-
pitis &
vigiliae
quomodo
curentur à
Timaeo.

Dolor Capitis, Vigiliae, Phrenitis & Coma.

Contra capitis dolores & vigilias Timaeus Epithema ex
semine papaveris & nucleis persicorum cum Aqua Rosa-
rum & Verbenae invicem subactis fronti applicat. Quan-
tum tamen meo iudicio, faciendum & applicandum non est,
nisi dolor & vigiliae urgeant: somnus enim longior eruptio-
nem impedit.

Phrenitis
quomodo
curetur.

Phrenitis quae in discretarum genere quandoque contia-
git, curatur à Sydenham, praesertim ubi facies non turgescit,
& pustulae magna copia apparere incipiunt, Venae missione.
Sic etiam hosce ex lecte calidiorie eripiendos autumat, ut
aeri liberiori exponantur, & sic plures à Phrenitide liberatos
observavit, quae utraque remedia, ut multis videntur gene-
rosa & experta, ita revera mihi videntur maximam cautione &
circumspectione, & non nisi urgente summam necessitate &
periculo, in usum trahenda esse. Conveniunt autem in hoc
casu Cinnabarina, mixta cum Arcano dupl. & sacchi. hni.
Comati seu Lethargo, cum plerumque ab obstructione corti-
cis cerebri dependeat, dum nimirum materia illa viscida
ptyalismum excitans in cerebro coagulatur, succurritur De-
obstruentibus, Cephalicis, Epilepticis, & volatilibus blandi-
oribus, de quibus undique in hoc tractatu agitur.

Nostra opi-
ni de phre-
nitidis cu-
ra.

Comatis
curatio.

Ocu-

Oculos defendentia & curantia.

Variolæ sunt oculis maximè noxiæ, eò quod sint pattes spongiosæ, humorum ichorosorum receptivæ, applicanda itaque sunt *Defensiva*, id est moderatè *refrigerantia* & *adstringentia*. Visum conservat *Sapphirus*, *Aurum*, *crystallus montana*, quibus oculus circa circum fricatur, ante eruptionem Variolarum & Morbillorum, seu ∇ *Rosarum*, *Plantaginis*, *Tutia ppt.* & *Camphora* his mixta, vel sequens quod excellit:

Oculi quemodo à Variolis defendantur & curentur. Visum conservantia.

\mathcal{R} . ∇ *Plantagin.*
Rosar. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}$.
Sem. Sumach. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}$.

Mixtura excellens ad defensionem oculorum.

Maceretur per noctem, additòque *Croco* & paucâ quantitate *Albuminis ovi* fiat mixtura, quâ sæpiusculè madesiat tota orbita oculi, idque tepide. Vel Franciscus Thiermair oculos commodissimè sæpius defendit sequenti *Limento*, prout etiam à suo Parente facilitatum optimo cum effectu, scribit.

\mathcal{R} . *Semin. Sumach.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 ∇ *Rosar.* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}$.

Limentum oculos defendens Thiermairi.

Infunde contusa & decoque in vase vitreo; colaturæ adde *Croci austriaci pulverisat.* gr. v. Misce pro defensivo.
 Vel Grülingii.

\mathcal{R} . ∇ *Plantagin.*
Rosar.
Euphras. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{B}$.

Aqua siphilitica Grülingii.

In his dissolve *Camphor.* gr. ij. *Croci* gr. j. F. l. a. Collyrium. Vel ejusdem.

\mathcal{R} . ∇ *Verben.*
Rosar. aa $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
Album. ovi No. j.
Croci parum. M. f. Collyrium.

A a 2

Vel

Vel præservans ejus à suffusione oculorum expertissimum.

℞. Pollin. Smaragd.

Margarit. ppt. aa gr. x.

Campbor. gr. ij.

℞. Rosar. ziiij. Misce.

Detur ad vitrum & sæpius agitur, hæcque Aqua oculis instilletur, mirificè præservat oculos à suffusione.

Vel meum Collyrium in omnibus oculorum inflammationibus, epiphorâ, panniculô, ungue, suffusione, & debilitate valde expertum.

Collyrium
nostrum.

℞. ▽ Plantag.

Rosar.

Euphras. aa zj.

Sacchar. alb. cand.

Tutie ppt. aazij.

Sieff alb. (cum Opio si magna urgeat necessitas)
fine Opio. ℥j.

Croci ꝑtis adstringent. ℥ß.

Misce f. Collyrium benè prius agitando, oculis instillandum & apponendum.

Ad nebulas abigendas, commendat Grülingius saccharum albissimum pulverisatum & oculis inspersum; Vel ejusdem Collyrium ad nebulas abigendas expertum.

Collyrium
Grülingii
ad nebulas
abigendas.

℞. Tutie ppt. zj.

℞. li. alb.

Nihil. alb.

Aloes lotæ aa zß.

Campboræ ℥j.

▽ Fenicul.

Rosarum

Chelidonii,

Pimpinell. aa zß.

Album. ovor. conquassat. No ij. Misce.

Nota

Nota, quamdiu facies & oculi tument ex eruptione, vel ex copia & dolore Variolarum, gratis est quidquam pro oculorum apertione adhibere, nihil enim efficitur, donec sponte subsideant.

Plura remedia ad affectos oculos tempore Variolarum, vide apud Sebizium *part. 6. Cap. 30. fol. 1818. & fol. 1819.* Franciscus de le boc Sylvius summè commendat ad oculorum in Variolis affectus *succum ex Chæresolio confuso in* ▽ *Rosarum & Feniculi expressum, tepide & cum linteis oculis applicatum, & subinde innovatum, quod citò & tutò curat.* Dolæus hanc *nam* usualissimam depredicat:

℞. ▽ *Rosar.*

Plantag.

Solani. aa ʒj.

Croci Orient. ʒj.

Mucilag. sem. Cydonior.

Sumach. aa ʒß.

Misce. Quâ inungantur oculi.

Crystallus montana optimè in oculi bulbo conducit in Variolarum insultu.

Timæus sequens laudat, quo ab initio vel maxime, sæpius madefaciendi oculi.

℞. *Rad. Tormentill. incis. & Conquassat.*

Onis. gr. xv.

Div.

Timæus
tatum,

Affunde ▽ *Rosar.*

Plantag. aa ʒj.

Stent in infusione in loco calido per noctem, postea filtra per chartam emporeticam.

A a 3

Vcl

Aliud Co-
lyrium.

Vel ℞. ▽ *Euphras.*
Rosar.
Plantag. aa ʒβ.

Tutie ppt.

Sieff alb. sine opio

Sacchar. Saturni aa ʒβ.

Camphor. gr. j.

Misce, detur in vitro.

Vel insperge ter in die *Aquam Ophtalmicam Maximilia-
no, Imperatori attributam, quæ sic fit:*

*Aqua oph-
thalmica
Maximili-
a ni impe-
ratoris di-
cta.*

℞. *Stercus recens anserinum junioris anseris Men-
se Majo vel Aprili collectum, destilla exinde
Aquam secundum artem.*

Hæc Aqua visum tam in Variolis, quam postea cica-
trices ab illis relictis clarificat.

In Epiphora oculorum (hoc est, in immoderata tenuis
humoris fluxione ad modum lachrymarum in oculis, quæ
in Morbillis & Variolis sæpe & potenter accidit) præter jam
supra dicta, servit *Albumen ovi* cum *Oine* diu conquassa-
tum, in spumam redactum, & cum stupa impositum. Item
▽ *florum Crani, Plantaginis, Rosarum.* *Sieff album sine opio;*
Unguent Nihili, Unguent de Tutia, Vel Albumen Ovi cum
butyro loto & Cremore lactis commixtum, Pleniùs hoc
expertissimum extollit.

*Linimen.
lum ad ocu-
los ex Ple-
mpio.*

℞. *Oli. alb. ter usti & ter exstincti*
in ▽ *Rosarum.* ʒj. *in tenellis.*
in adultis ʒβ.
Gum. Arabici

Tragacant. ustor. & exstinctor. aa ʒj.

Tutie ppt. ʒj.

Cerussæ ʒij.

Mucilag. sem. Cydonior. cum ▽

Rosar. extract. q. s.

Misce

Misce f. Linimentum, quò liniatur oculus circa utrumque angulum, & ambæ palpebræ, deinde clauditur angulus, & applicatur molle lintecolum. Si dolores urgeant, additur gr. j. *Opii* & *Croci* modicum

Aliis hoc simplex remedium auxilio fuit. Cape *bombacem* insperge & immisce *Pulv. Tabacæ*, & auribus inde.

Ad oculorum dolores ex Timæo & Scorbait.

Si dolor (ex Timæo & Sorbait) oculorum urgeat, vel intra oculum ipsum pustulæ oboriri videantur, utimur *lacte ehalibato* cum pauca in eo soluta *Myrrha*, vel quod optimum, *lac muliebre* in iustum oculum è mamma emulsum cui si *sacchari* modicum addideris, non oberit, lac autem semper sic recens, aliàs nimis facile acescit, & nocet oculis, Alii extinguunt *Opium* adens septicis in *Plantaginis* & *Rosarum*, & instillant per lim. Alii *lindrum* cum lingua factum extollunt; qui cum oculis, sed & vitam reddunt puero apud Bartholinum Cent. 9. *hisor.* 29. Ad oculos rubentes, & diu propter saniem clausos adhibetur *sanguis columbarum*, cum *Plantaginis* per linteum expressus, vel decoctum seminis *Cydoniorum*, *fenugreci*, *Lini* & *Malvæ* in *Plantaginis* facti, & eò oculi calidè foveantur, quod ego pro aperiendis oculis plurimis diebus ac noctibus, à pure conglutinatissimis per expertissimum & tutum habui. His, si vis addere poteris *Herb. Malvæ*, *Altheæ*, *Parietar. Flor. Melilot. Rad. Lilior. alb. Altheæ*, *Ruthæ*, *Verbenæ* &c.

Ad ruborem oculi sum.

Grülingius ad palpebras tumefactas commendat sequens: *Ex Grülingio.*
 1. *Ovum recens*, frige in *butyro*, postea affunde in *vinum frigidum*, ubi constitit, separa pinguedinem in vasculum figulinum vitreatum, superinfunde *vinum Rosarum*, agita bene, ut fiat instar linimenti albi. Ubi nota, hoc etiam valere pro inungendo, postquam Variolæ ruptæ sunt. Id quod etiam recommendat Gabelhoverus pag. 373.

In oculorum maculis à morbillis relictis, est remedium probatissimum Horstii sequens.

Ex Horstio
in oculorū
maculis
℞. *Pulp. pomor. dulc.* ℥ss. cum ∇ *Fenicul.* & *Rosarum* ad justam consistentiam coctæ, cui adde *Mucilaginis seminis Fœnugræci* ℥ij. *Lap. hematit.* ppt. ℥j. [Misce applicetur per dies aliquot cataplasmatibus instar, deinde lavetur oculus] ∇ *Rosarum, Feniculi,* & *tantillo Margaritar.* ppt. immixto, Ac tandem si oculus exulceretur, *Collyrio* sequenti curabitur.

Colyrium
si oculis
exceretur,
℞. *Cerussæ lotæ* ℥iij.
Sarcocollæ ℥j.
Gum. Tragacanth. ℥j.
Opii. gr. ij.

Cum *mucilagine Tragacanthi* extracta cum ∇ *Plantaginis* f. *Trochisci*, qui solvantur in *lacte muliebri* vel ∇ *Rosarum* ad usum.

Aquæ ad
Ungues o-
culorum.
Aliud re-
medium in
tenellis.
Ad *Ungues* seu *Pterygia* seu *panniculos*, valet ∇ *Che-lidonii, Melissæ* &c. Vel in *tenellis* infantibus Mater vel alia persona, seu *Nutrix* lambat frequenter jejunâ lingua suâ oculum affectum, prius masticando *semen Feniculi*. Efficaciora & aciora vide in *Plempio* in sua *ophthalmographia.* fol. 211.

Aurium af-
fectus ut
curandi,

Aurium affectus

Accidit sæpe ut *Aures* doleant, pruriant, fluant, si fluant si-
nendæ sunt, si pruriant nō facile tangenda; si doleant spon-
gia tepida & oleo rosaceo immacerata applicetur & sæpe ad-
moveatur. *Sylvius* ad aurium affectus laudat *Spirit.*
Vini cum *anis* & *micæ panis albi* & adhuc
calenti immisum & balidè applicatum. *Decoctum item*
Absinthii, Centauri minoris, Abrotani, Carduibenedicti
per

Sylvii cu-
ratio,

per vaporem exceptum; *Balsamus* *Æris terebinthinat*: *auris* *anifat*. ad *guttas aliquot* in *aurem* immissus.

Dolæus *Essentiam Carduibenedicti*, *Castorei*, vel *Essentiam* ad *auditionem*. *Michaelis* commendat.

Narium Affectus.

Remedia quæ Nares præservant triplicia sunt. *Defensivæ* in principio pro salvanda inspiratione & olfactu: *Abstergentia* seu *Emollientia* in fine pro auferendis crustis: *Abstergentia* seu *Emollientia* post crustas ablatas, si ulcus aliquod in illis fuerit relictum. Narium affectuum curatio, triplex est.

Naribus itaque male affectis, vel nè afficiantur attrahatur *posca*, id est, ∇ cum aliqua parte *acet*i mixta: vel quod melius ∇ *Rosarum* cum *aceto* & postmodum odoretur sequentem *Nodulum*: Posca ad nares affectas attrahenda.

R. *Santal. rub.*

Rosar.

Violarum aa *zij.*

Camphor. $\mathfrak{z}\beta$.

Liga in peria castei rubri, & intinge in *aceto rosarum*, & naribus obice. Vel adhibeantur odoramenta ex *Rosis*, *Myrritho*, *Plantagine*, quæ bullire poterunt in ∇ , & fumus repidus per nares attrahi. Utilis etiam est *Aq. Rosarum* cum *succo Agrestæ*, vel ∇ *Æsuccus* *burs. pastoris*, *Millefolii*, *Plantaginis*, vel *Unguentum album camphoratum*. *Ti-* Ex Timore ad crustam narium emollienda.

mæus crustam in naribus emollit *Oleo amygdalarum dulcium*, vel *butyro recenti* & insulso, vel *lacte muliebri recenti* naribus instillato. Vel etiam servit *pinguedo Anseris*, *Caponis*, *Anatis* &c.

Göllingius ad narium coalitum sequens *Unguentum* commendat:

Unguen-
tum Ciu-
lingii ad
narium co-
alium.

℞. Ol. Violar.
Gum. Tragacanth.
Cerae albæ aa q. s.

Fiat Unguentum quò inungantur nares. Vel ad ob-
structas & concretas nares sequens extollit.

Decoctum
ad idem e-
jusdem.

℞. Balsustior.
Myrtillor.
Flor. Chamomill.
Malvæ aa Mj.

Incis: Coque in f. q. ∇ ad tertias. Petiam intinctam
calidiusculè admove, vel per syringam insperge, aut sic na-
ribus attrahe. Velejusdem *Linimentum*:

Linimen-
tum ejus-
dem.

℞. Ol. Myrthin.
Amygd. dulc. aa ʒj.
Santal. rub.
Citrin. aa ʒj.

c. mucilage seminis psylli fiat Linimentum.

Nimiam
hæmorrha-
giam sisten-
tia.

Nota: hæmorrhagia in Variolis & Morbillis nequa-
quam est sistenda, ex rationibus supra de Venæsectione da-
tis, ac si nimia sit, diu duret, vires nimium prosterнат, nihil
præstantius est, quàm regioni hepatis vel lienis, vel etiam
super umbilicum (parti nempe affectæ) imponere cucurbitu-
lam siccam, hoc est, sine scarificatione, & expellentia
remedia attemperare, nè calidâ suâ vi, sanguinis efferves-
centiam, & consequenter hæmorrhagiam adaugeant, na-
ribus præterea intrudi possunt *aranearum tela*, & multa alia
quæ in Authoribus passim de hæmorrhagia narium profe-
runtur. Dolæus ad præservandas nares laudat *Oleum Lili-
orum alborum, Amygdalarum dulcium*, vel ad olfaciendum dat
acetum rosaceum camphorâ imprægnatum. Timæus, suppara-
tas nares sequenti *Unguento* inungit & curat:

Ex Dolæo
ad præser-
vandas na-
res.
Unguentū
Timæi ad
suppuratas
n. & s.

℞.

℞. *Mucilag. Gumm. Tragacanth.*

▽ *Rosar. extract.* ʒij.

Olei Rosar. ʒi. M. f. Unguentum.

Ulcera narium curat *Decoctum bordei*, *Mel Rosatum*,
Myrrha, *Aloes*, *Radix Aristolochiæ*, *Terebinthina*, *Unguen-*
tum de Cerussa vel *Lithargyrio* &c.

Oris, Colli, Linguae & Faucium Vitia,
praesertim Ptyalismus seu Salivatio.

AD os & fauces dolentes nè ulcera, vel planè aponia (ut
Avidere est in *Ephem.* | *German. Anni 1672.* & *Anni*
1673. fol. 562. 563. & 564. & aliis adhuc ibidem locis. *An-*
no. 1689. obs. 38. fol. 109. & *Fen. de scorzonera* pag. 82.
& seqq. *Fernelius Lib. 2. de abditis rerum causis* Cap.
12. *Bartholin. Cent. 2. Obs. 47.*) & alia id genus mala acce-
dant, usurpandus erit *Gragarismus*

Oris, colli,
linguae, fau-
cium vitia
ut curen-
tur &c.

℞. *Fol. Plantag.*

Rosar. rub. aa Mj.

Sem. Plantag.

Sumach aa ʒß.

Decoque in f. q. Aquæ bordei. In Colatur. ℥j. solve suc-
ci Granator. dulc. ʒij, Mel. Rosat. colat. Diamoron. aa ʒj.
Misce fiat Gargarismus.

Gargarif-
mus ad
præcaven-
da oris &
faucium va-
ria mala.

Vel *Gargarismus* pro gula. quando in illa aliquid ena-
tum est *Grülingii*:

℞. ▽ *bordei* ℥ß.

Prunell. ʒiij.

Mell. Rosat. ʒiß.

Diamoron. ʒj.

Julep. Violar. ʒß. Misce.

Gargarif-
mus dum
in gula
aliquid ena-
tum est ex
Grülingio.

Vel sequens Timæi Gargarismus

Alius Ti-
mæi,℞. ∇ *Plantag.*
*Prunell.**Rosar. aa ʒiʒ.**Vini Granator. acid. ʒj.**Rob. Ribium**Diamor. aa ʒʒ.**Aceti ex succo Rub. Idæi. ʒʒ.*

Misce fiat Gargarismus approbatus.

Aliud ex
Timæo pro-
solentibus
gargariza-
re.

Parvulis, ita & adultis qui gargarizare non possunt, prosuadet Timæus cum baculo *Liquiritiæ* lambere *Syrupum de Juiubis, Granatorum, Diamoron vel Dianucum, Syr. Violarum, de Rosis siccis, Ribium, Cydoniorum, vel solis vel cum ∇ Plantaginis, Rosarum permixtis.*

Nostri cu-
randioris
vitiæ, ratio.

Ego omnia vitia oris & colli felicissimè curavi sequenti domestico & simplici remedio, nimirum *Cremore hordei cum jusculo vel ∇ diluto, per se vel cum Syrupo de Juiubis permixto*, quo patiens gargariset sæpius, vel per syringam immittat. Cui si Gargarismum supra dictum Timæi admiscueris, expertissimum reddes remedium. Ad impediendum, nè gula & guttur intus afficiatur, extra scutum *croco* intersutum & *lacti muliebri* intinctum apponit Thomas Willis, hoc enim poros aperiendo, venenum ab intimo gutturis exteriori allicit. Imò vulgus collum & fauces evidenter præservat *silo sericeo carmesino*, intincto in liquorem in quo soluta sit *Theriaca & Crocus*, & collo à principio eruptionis imposito, & quotidie per duas tresve dies reiterato. *Decoctum ficuum simplex*, si eò os & collum frequenter colluatur & gargarifetur, multum præstat, nam ficus sicur externè omnes tumores citò ad suppurationem deducunt, ita etiam Variolas.

pro-collum
ficuum est
excellens,

Si

Si ex fluxionis acrimonia, aut copiâ Variolarum ulcus in faucibus genitum fuerit, ∇ *bordei* cum *Melle rosato*, vel ∇ *Onofa* detergendum est, & quod si in corruptionem vergat, *Unguenti Aegyptiaci* tantillum prædictis erit admiscendum. Instar omnium laudatur ∇ *Plantaginis cum lacte caprillo*, quæ fauces tam præservat quàm curat. Optimus est *Syrupus de Juiubis*, è *succo Granatorum*, vel *Diamoron*, teste Foresto in multis locis. Si nimia adsit faucium & linguæ ariditas & inflammatio, Timæus commendat *mucilaginem seminis psyllii & cydoniorum cum* ∇ *Rosarum extractam*. Vel præscribit *Rotulas Diatragacanth. frig.* vel ipsius supradictum gargarismum. Vel si panes adsit magra raucedo, optimum est, inquit, *Lactis dulcis* 15ß. ∇ *fontane lbjß.* Coque ad medietatem, semper bene agitando, & hoc se patiens gargarizet, sed cavendum nè aliquid deglutiat.

Ad ulcus
in faucibus
genitum.

Mucilago
ad nimiam
linguæ a-
riditatem
ex Timæo.
Ad aridita-
tem lin-
guæ cum
raucedine,
ejusdem.

Ego in summa ariditate linguæ & faucium, ubi imminēbat lethalis angina, nil melius inveni, quàm ore tenere subtilem particulam *Lardi recentis non saliti*, quod emollit, radice humectat, lenit, ariditatem corrigit, & omnia linguæ faucium & colli accidentia præcavet & tollit.

Juxta nos
ariditatis
linguæ cu-
ratio.

Nota, sæpissimè evenire solet, ut infantes laborantes ex Variolis, præsertim si facies ab illis copiose inficiatur, in ore, & quidem circa finem mandibularum pustulas quasdam contrahant, quæ deinde, si illarum ratio non habeatur, ulcus corrosivum faciunt & genam perforant, hoc ulcus si statim in initio medicamentis gangræne medentibus non præferretur, tandem totam genam usque ad radicem nasi inferiorem absumit, comitante lentâ sed certissimâ morte pedisequa: huic malo sæpissimè profuit Andreas Cnösselius *ad Os*, *Melle rosato* ad sufficientiam aciditatis pernixto, locò ulcerosò illitò, & licet ulcus quasi totam genam jam occupauerit, hoc juvit.

Ulcera cor-
rosiva ex
pustulis cir-
ca mandi-
bularum fi-
nem nata,
quomodo
mature
præcaven-
da & curan-
da.
Curatio
juxta Cnös-
selium.

198 Caput XV. De Corre&. Symptom.

Ad gulæ
excoriationem ex
Grülingio,

Grülingius ad gulæ ex&oriationem hoc commendat.

℞. Folior, *Myrtill.*
Rosar.
Chamomill.
Stachados
Meliloti aa Mj.

Bulliant in f. q. ▽ ad tertias,

℞. *Hujus Decocti lbj.*
Diamor, ʒij.
Syr. de ʒ. Radicibus ʒj. Misce.

Pro Gargarismo si adultiores sunt, & decimum annum
excedant, ad fortiora progrediendum.

Gargaris-
mus pro
adultiori-
bus.

℞. *Summit. Stachad.*
Melilot.
Thymi.
Hyssopi
Salviæ aa Mj.

Bulliant in ▽ vel Vino dulci.

℞. *Hujus decocti lbj.*
Oxymellit. f. ʒij.

squllit. ʒʒ. M. pro Gargarismate.

Foresti
pro&as in
hoc aff&ctu
remedium,

Forestus, cuidam Variolas in gutture habenti manda-
vit, ut continuó cum lacte caprino & ▽ *Plantag.* simul mix-
tistepidè gargarizet, quod miraculi instar profuit; præser-
vat maximè ab angina & suffocatione, estque oris tum
gutturis præstantissimum remedium, cum signa exanthe-
matum seprodunt: In eundem usum, inquit, servit, estque
expertum remedium, deglutitus sæpius *Syrupus Granato-*
rum.

Dolæi dif-
cur sus de
ptyalismo,

De Ptyalismo seu salivatione ita loquitur Dolæus nè in
principio illicò fistatur, quinimò admittendum, ut continuet
etiam ad plures dies, qui tamen si ad 13 vel 14 dies perstet,
se-

sedari potest remediis aptis; Promovetur verò salivatio cere- Ptyalismus
visi tenui affatim gargarizata (Authôr quidem habet hau- quibus pro
rienda, quod non approbo, propter periculum fermenta- moveatur,
tionis, & aliorum inde emergentium symptomatum) si-
statur verò debito tempore sequentibus:

℞. ∇a flor. Paralyseos
Lignor.

Quibus si-
statur.

Syr. de Meconio aa ʒß. Misce.

Vel ℞. ∇a flor. Trinitatis
Paralyseos aa ʒiij.

Tinct. Anodyn. gut. iij. Misce.

Quod si in Variolis confluentibus (inquit præfactus Au-
thor) salivatio eò usque excocta sit & viscida ob calorem præce-
dentem, ut tantum non suffocetur æger, prout die undecimâ
fieri solet, Gargarisma in usum ducendum, quod per syringam
in fauces sedulo iniiciendum.

℞. ∇a Cerasor. nig.
Primul. Ver.

Expulsivæ Dolæi aa ʒiij.

Oxymel. squillit. ʒj. Misce.

Gargaris-
ma Dolæi
in salivatio-
ne nimis
viscida.

Vel ℞. Mel. Rosat. ʒj.

∇ Hordei ʒvj. Misce.

Aliud.

Sic & Vertici capitis imponuntur Sacculi ex succin. Oli-
bano, sem. Nigell. flor. Rosar. cum Oleo succini irrorati.
Vel Cataplasma suspensivum ex fermento cum succino para-
rum applicetur. In metu suffocationis, Sydenham eme-
ricum exhiberi vult, quod uti violentum, ita abominan-
dum dabo.

Sacculi ver-
tici capitis
imponen-
di.
Cataplas-
ma suspen-
sivum.

Dolæus, ad colli & faucium defensionem commendat
Decoctum Aquilegiæ ʒvj. Diamoron ʒiij. Misce.

Decoctum
Dolæi.

Diemer.

Concilium
Dimerbroeck
in me-
tu Suffoca-
tionis,

Diemerbroeck, in casu desperato suffocationis svadet, ut spogia parva bacillo firmiter alligetur, eaque Syropo convenienti intincta fortiter in fauces intrudatur, ut sic Variolæ virumpantur, & angustia colli solvatur. Plura de his affectibus videantur inferius de pulmonibus affectis.

Color dor-
si & lumborum.

Dolor Dorsi & Lumborum.

TImæus, dorsum & Lumbos inungit *Oleo Amygdalarum dulcium*. Ego verò *Oleo Scorpionum simplici*, vel quod melius *Oleo Scorpionum Matthioli*.

Labia fissa
& arida
quibus cup-
rentur,

Labia fissa & arida.

Flssuram & ariditatem labiorum curat sequens; *℞. Semin. Cydonior. 3j.* Contunde crassiusculè, affundendo parum *∇ Rosarum*, stent per tres horas, & fiet mucilago, quam per linteum transcola, & inunge labia, huius si vis adde aliquid *Syrup. Violarum*. Et hæc de partibus externis; quod autem attinet partes internas, primum ac præcipuum est Cordis ac viscerum aliorum naturalium habere rationem, unde

Confortantia Cor & alia viscera.

Partium in
ternarum
præserva-
tio.
Ad palpi-
tationem &
anxietatē
cordis fa-
cientia,
Emulso
Perlarum

Icet de iis equidem actum sit superius, nihilominus tamen quædam specialiora hic pro casu necessitatis annectemus. Proinde ad cordis anxietatem & palpitationem (quæ oritur vel ex frigore admisso, vel ex recessu materiæ, vel diarrhæa) præscribitur *∇ etyphis Cervorum cum Magisterio Perlarum*, & granis aliquot *Lapid. Bezoar*, vel propinetur *Emulso perlarum Cratonis* sequens & multum efficax;

℞.

R. Sem. Card. bened. ʒj

Citri ʒj

▽ Veronic.

Card. bened. aa ʒiʒ

Fiat Emulsio, cui adde Syr. Acetosit. Citri ʒ.

Margarit. ppt. ʒj.

C. C. ussi. ʒij. Misc pro dosi.

Cratonis
ad cordis
affectus.

Quod si ingens adest calor, & ex eo veniens prostratio virium, Timæus sradet sequens, sepius cochlearia duo vel ʒ. a pro differentia personarum calidè dandum, & non nisi urgente necessitate.

R. ▽. Cordial. frig. Saxon. ʒiv.

Fragor. ʒiij.

Borrag.

Bugloss.

Cerasfor. nig. aa ʒj.

℥. Rub. Idæi.

Fragor. aa gutt. xv.

Rotul. Manus Christi. perlat. ʒiij.

Misce. His, si opus, pro majori efficacia, adde

Consect. Alchem.

Margarit. ppt. ʒij.

Lap. bezoar. gr. vj. viij. Misc.

Electuarium confortans in Variolis & Morbillis Grülingii.

R. Conf. Rosar. antiq. ʒiij.

Rad. Borrag. condit. ʒvj.

Specier. Diatrion santal.

Diamargarit. frig. aa ʒj.

Corall. rub. ppt. ʒʒ

Lap. ʒ. pretios. aa gr. x.

Folior. Ori sin. Nd. ij.

C e

Confor-
tans Timæi
in a mix-
virium pro
stratatione.

Electuari-
um Con-
fortans
Grülingii.

Cum

Vomitus & Nausea.

Vomitus
& Nausea

Quæ in principio non sunt statim cohibenda, nisi laborem faciant, inquit Dolæus. Vomitiones laboriosas Timæus sedat *Vino granatorum acidorum*, & *Miræ Cydoniorum* cochleatim aliquando assumptâ, vel si ventriculus jam est læsus, quod patet ex vehementi & continuò vomitu, & cibi omnimodo fastidio, ubi adhibet Mixturam ex *Syrupo Corallorum* cum *Vino Granatorum* & *Syrupo de Agresta*, extra verò ventriculo calide applicat *Emplastrum de Crucifpanis*. Alii panem calidum tostum, vel simplicem, vel superinducta *Theriaca* ventriculo apponunt cum magno effectu. Sed cavendum, ne diu relinquatur, ut humectetur à sudore, quo in casu plus nocet, quàm prodest. Sequens etiam Mixtum valet in vomitu; & simul potenter expellit Grölingii.

Vomitus
laboriosi
cura ex Ti-
mæo.
Ventriculi
læsi signa.Externæ
pro curan-
do vomitu.Mixture
Ventricu-
lum robo-
rans Grö-
lingii.

℞. Sem. Nasturt. ʒi v.

Raphan.

Card. bened. aa ʒij.

Contunde probè & infunde in ∇ *Fumar.* ʒi v. per aliquot horas, Colaturæ adde.

℞. ʒri. ʒj.

ʒri. ʒlat. ʒß. (hunc meo iudicio fa-
tius ommitterem)℞. ʒlis. gut. ʒj
flor. sambuc. ʒjSyr. Acetositat. Citri
de Limon. aa ʒj.Misce & Divide in 2. partes, sumat manè & vespèri.
Vel sequens ejusdem.

℞. ℞. ʒri. ʒi

ʒlis Absinth.

Perlar.

Corallor. aa gr. i v.

C c 2

C. C.

Alia

C. C. phil. ppt. gr. v.

∇æ Card. bened. ʒj.

Scabios.

Absint. ʒa ʒβ.

Manus Chri perlat.

Syr. de Cort. Citri. aa ʒβ.

Misce pro dosi, sumat & sudet.

Cataplas-
ma balsami
cum Dolæi.

Dolæus extollit suum Cataplasma balsamicum, quod
fit ex Succolada, Oleo Nucis, Balsamo Cinamomi cum Vi-
no Hispanic. Vel Theriaca cum Pulvere Pannonico rubro
& Nuce Moschata mixta, regioni ventriculi applicetur.

Quid nari-
bus obici-
endum.

Naribus ad odorandum obicere potest Panem tostum vel
aceto Vini conspersum.

Pulmonum
affectus.

*Affectus Pulmonum, Respiratio gra-
vis, Tussis, Raucedo &c.*

Syrupus
Pectoralis
Timæi re-
spiratio-
nem facili-
tans, tussim
sedans &c.

UT respiratio reddatur liberior, tussis sedetur, & pulmo-
nes non lædantur, sæpius delibandus est hic Syrupus Pe-
ctoralis probatus Timæi:

ʒj. Capit. Papau. alb. cum semin. No. v.

Rad. Liquirit. ʒβ.

Fujubar.

Ficuum aa Nō. vii.

Fol. Tussilag. Mj.

Sem Cydonior. ʒj.

Incisa Coque inf. g. ∇æ Tussilag. pro ʒj. Decocti, adde
Sacchar. Penidii

Candi aa ʒβ.

Coque denuo ad consistentiam Syrupi. Vel tussientibus
maximè prodest ∇ Feniculi & scabiosæ saccharo Cando edul-
corata.

Vel

Vel Claretum meum Pectorale:

Claretum
nostrum
pectorale.℞. ∇ Card. bened.

Scabios.

Veronic.

Tussilag. aa ʒj.

Sacchar. alb. cand. q. s.

Fiat Mixtura instar tenuioris Syrupi.

Pro parvulis etiam summe valet *Syrupus de Rosis siccis*, Syrupi pro
de Papavere, de Tussilagine, de Jujubis, Violar. &c. Rotul. parvulis.
Diatragacant. frig. Quod si vero jam præsens fluxio in pul-
 monem irruat, ac raucedinem & suffocationem inducat, non
 solum remediis prædictis cohibenda erit, sed etiam revellen-
 da per cucurbitulas tum siccas, tum scarificatas: imò sæpe
 post Variolas & Morbillos ob varias causas pulmo ita labe-
 factatur, ut etiam pus fundat: in hoc casu præter diatram fri-
 gidam, in usum trahenda sunt *antiphthifica*. Inter cætera se-
 quenti destillato feliciter usus est Dolæus, in quo exhibuit
 simul *Balsamum ʒis Anisatum* ad guttas aliquot:

Quomodo
fluxio in
pulmonem
irruens &
suffocatio-
nem mini-
tans cohi-
benda.Dolæi de-
stillatum in
pulmone
affecto, ef-
ficax.

℞. Herb. Veronic.

Hepat. nob.

Rutæ Murar.

Sanicul.

Flor. Scabios.

Papaver. Rhead.

Bellid. utriusque.

Hyperici.

Aquileg. aa Mj.

Rad. Tussilag.

Fanicul.

Scorzoner. aa ʒj.

C c 3

Con-

Concis: & Contus. Infunde in ∇ Scabios: *Papa-ver-
Rhead. Pimpinell. Beccabung. & fac f. a. destillatum.*

Riverius in mentu
suffocatio-
nis adhi-
bet vesica-
toria.
Gargaris-
mus ex Ce-
revisia cali-
da cum bu-
tyrore

Riverius Cent. 2. Obj. 45. In metu suffocationis ex materia tenui, acri & copiosa applicuit *vesicatorium* cervici, & exhibuit *Laudan. Opiat. gr. ij.* & si opus fuit, hoc remedium reiteravit. Utile quoque erit ad derivationem faciendam, ut patientes sæpius gargarizent *cerevisiam calidam* cum modo dico *butyri insulsi* vel *lac tepidum* cum *saccharo*, *Cremorem bordei* dilutiorem, vel potum ordinarium.

Morbi Renum.

Affectus
Renum.
Mictio cru-
enta.

Renes etiam sæpius afficiuntur & exulcerationem patiuntur, unde sanguinis mictus, seu mictio cruenta &c. oriuntur, pro qua dorsum & lumbos inungit *Timæus Ol. Amygdalar. dulcium*; Renes vero defendit & sanat, uti & mictum cruentum sistit sequens *Emulsio Timæi.*

Emulsio
Dolæi in
mictu cru-
ento,

℞. *Sem. 4. frig. maj. excort. aa 3j.*
∇ *e Plantag.*
Rosar. aa ʒiij.
F. Emulsio, adde
Succin. alb. ppt.
Trochis. Alkekeng. aa ʒj.
Manus Chrit. perlat. ʒij. Misce.

Trochisci
ad mictio-
nem cruen-
tam in de-
clinatione
urpandi.
Urinæ sup-
pressio un-
de?
Et quomo-
do curan-
da.

Dolæus in mictione cruenta svalet *trochiscos Alkekengi, de Carabe*, sed nunquam in principio, sed in declinatione adhibendos, in vehiculis debitis. In suppressione, quæ dependet à magna confusione spirituum excretioni urinæ inservientium, ob sanguinem & humores in primo fervore agitados exortâ serviunt *diuretica* levia, & juxta *Sydenham ægrum* ex lecto eximere, ne nimium & continuò sudet, juxta illud: *qui multum sudat, parum urinat.*

Mor-

Morbi Intestinorum

AD intestina defendenda nihil est melius, quam *lentes* bis Affectus intestino-
rum.
Coctæ in ∇ *Plantaginis* vel *Tormentillæ*; Decoctum
Lentium
est præ-
stans ad de-
fendenda
intestina.
 Prima deco-
ctio abijicitur, secunda adhibeatur pro potu, est excellens,
 teste Timæo. Item *Syrupus Cydonior. Myrtillorum, Rob-
 Ribium, Semen Plantaginis.*

Quod si alvus fiat laxior, quod ordinariè in Variolis
 confluentibus, ob materiæ copiam humiditatem & acrimo-
 niam fieri solet, in quibus tamen non nimis citò sistenda, Alvus laxa
quibus si-
stenda.
 semper superiùs dictis remediis sudoriferis *adstringentia* ad-
 misceri poterunt, utpote *Corallia præparata, Bolus armena,*
 ∇ *Sigillata, Tormentilla, pannus scarlatus tostus, Confect.*
de Hyacintho. Ego omnibus præfero *Pulverem Bezoar-* Nostri opè
nio.
ticum Sennerti, per se vel cum aliis datum, *Semine* nempe
Plantaginis, Acetosæ, & dosim sudoriferorum cum ad-
 stringentibus augeo, etiam in duplum; in omnibus juscu-
 lis & panatellis detur *Gelatina C. C.* ad cochlear j. vel. ij.
 Etiam sunt panatellæ ex *Amylo;* quod tamen (NB) sine
 calce sit factum. Amylum
quale esse
dabeat pro
panatellis.
Vehemens
alvi fluxus
ut curan-
dus.
Clyster ab-
stergens.

Si autem vehementiùs urgeat fluxus alvi, in hoc mor-
 bo funestus, ad *Clysteres*, primo *abstergentes*, mox ad om-
 ninò *adstringentes* confugiendum est, e. gr. *Clyster abster-*
gens statim iniiciendus: Alius.

℞. *Decoct. bordei.* ʒ℞.

Mell. Rosat. colat. ʒj. *vel* ʒʒ. *Misce.*

Fiat clyster. Vel.

℞. *Brodii Carnis.* ʒ℞.

Sacchar. Thom. ʒʒj.

Vitell. Ovor. Nö. ij. f. Clyster.

Vel

Vel si adsint tormina;

Clyster ubi
adsunt tor-
mina,

℞. *Malv.*
Violar.
Mercurial.
Verbasc. aa Mβ.

Coque in *Aqua bordei.*

℞. *Decocti hujus. ℥x.*
Mell. Rosat. ℥i. vel ℥iβ.
Vel loco hujus *Sacch. Thom. ℥ij.*
Vitell. Ovorum. Nō. ij.

Fiat Clyster, quò rejectò succedat alius adstringens, v.gr.

Clyster ad-
stringens,

℞. *Hordei (in frixorio supra ignem) tosti. Mij.*
Rad. Tormentill.
Bistort. aa ℥β.
Rosar. Rubear. p. ij.

Decoque in ∇ *Fabrorum*, vel in ∇ in qua lateres vel
silices igniti extincti fuerunt ad ℥v. vel ℥viij. In Colatu-
ra dissolve Syr. de Ros. ℥iβ. ∇ *Lemniæ, sang. Dracon. bo-
li Armen. aa ℥iβ.* Misce fiat Clyster.

Alius ad-
stringens.

Vel ℞. *Lact. Vaccin. cum bordeo, Rad. Tormentill.*
& *Oriza decocti ℥viij.* plus minus. Solve in hoc *sacchar.*
rub. ℥i. vel ℥iv. Vitell. Ovorum. Nō. ij.

Vel Clyster meus adstringens in dysenteria expertissi-
mus.

Noster
Clyster ad-
stringens
expertissi-
mus.

℞. ∇ *fontan. in qua lateres igniti sæpius extincti fue-
runt q. s. in hac Coque*

Caput. Vervicis Nō. j.
Herb. Sanicul.
Plantag.
Poylgoni
Burs. pastor. aa cum toto. Mβ.

Rad.

Rad. Serpentar.

Tormentill.

Bistort.

Consolid. maj. ana ʒss

Sem. Plantag.

Portulac.

Lini ana contus. ʒij.

Flor. Verbasci

Balaustior.

Rosar. rub.

Hyperic.

Papaver. Errab. ana p. ij.

Cort. Granator. pul. verisat.

Granor. Myrthi. contus. ana ʒij.

Factâ sufficienti coctione, servetur ad usum.

℞. *hujus decocti. ʒv. In hoc dissol. ve*

Gelatin. C. C. ʒi.

Syr. de Rosis siccis. ʒv j

Boli armen.

sang. dracon.

Gumm. Tragacant. ana ʒj. Misce

NB. *Clyster adstringens* semper debet esse in minori *Clysteres*
dosi, nè nimia quantitas & pondus stimulet ad excrecio- *adstringen-*
nem, quò enim diutius retinentur, eò semper melius. *tes debent*
dari in par-

Per os verò pro majori adstrictione adhiberi potest *Pul-* *va dosi,*
vis meus supradictus ad Variolas & Morbillos, vel sequens:

℞. *Panni scarlati tosti*

Boli Armen.

Rad. Tormentill. ana ʒss.

Lap. Bezoar. Orient. gr. iij.

Corall. rub. præp. gr. xv.

Pulsis aq.
stringens
intus su-
mendus,

D d

F. Pul-

F. Pulvis pro duabus dosibus, propinetur cum *Aqua Tormentilla* vel *Plantaginis*. Vel sequens quoque optimus erit:

Alius.

℞. *Rad. Bistort.* ʒij.
Magist. Perlar.
Corallor. ana ʒss.
Pulv. Viverar. ver. ʒij
Ocul. S. præp. ʒj.
Sacch. Candi. ʒj. Misce f. Pulvis,

Dosis ʒss. fumendus ut prior.

Alius ad idem.

Vel ℞. *Corall. utriusq.* ppt.
Margarit. ppt.
C. C. usti ana ʒi.
Sacchar. Rosar. ad pondus omnium.

M. f. Pulvis cum jusculis & panatellis fumendus.

Bolus adstringens.

Vel ℞. *Elef. Discord.* ʒj. p. m.
Consef. Alkerm. vel de Hyacinth. ʒss.
Bezoar. occident. gr. xv. vel xx.
Corall. rub. præpt. ʒj.
C. C. usti præpt. ʒss. Misce f. Bolus, detur cum

Gelat. C. C. vel solvatur in *∇ Tormentilla*. Est efficax *Muræi*.

Præstat in diarrhæa Multum etiam juvat in diarrhæa, si medicamenta dentur in calido jusculo loco aquarum, & si actualis calor juvat ad retentionem, faciliorem distributionem, & consequenter expulsionem.

Riverius *Observat. Cent. 1. observ. 71. & Cent. 2. Observ. 2.* plurimos Variolantes & Morbillantes hisce remediis in dysenteria & diarrhæa talvavit. In dysentericis Variolantibus & Morbillantibus præscripsit sequentem *Clysterem* bis vel sæpius de die injiciendam

Clyster imo Variolantibus dysentericis Riverius.

℞. *Rosar. rubrar. p. j.*
Santal. rub. ʒss.
Liquirit. rase &
Passular. integr. ʒj.

Coque ●

Coque in jufculo capitis *vervecis*. In colatura ꝑv. vel ꝑvj
dissolve *Confect. de hyacinth.* ꝑij.

Conserv. Rosar. per setaceum traject. ꝑß.

Vitell. ovor. Num. 1. F. Clyster.

Hunc *Julepum* dedit bis in die.

ꝛ. ▽ *scabios.*

Card. bened. ana ꝑiß.

Syr. de Rosis siccis. ꝑij.

Corall. ppt.

Margarit. ptpt. ana ʒß.

Lap. Bezoar. orient. gr. iij.

Confection. de Hyacinth. ʒß.

M. f. *Julapium.*

Et simul inguina & axillas frequenter inunxit *Oleo Scorpionum Matthioli*. In Variolantibus & Morbillantibus cum diarrhæa, & ad Variolas depressas tumefaciendas sæpius mirè profuit hæc Potio:

ꝛ. *Rad. Pentaphyll.*

Tormentill ana ʒj.

Fol. Scabios.

Pimpinell. ana Mj.

scordii. p. j.

Santal. Citrin. ʒij.

Coque ad ʒix. pro tribus dosibus, cuiq; dosi addendo *Confection. de hyacinth.* ʒß. *Trochisc. Viperin.* ʒß. *Lap. bezoar. Orient. gr.* iv. F. Potio bis de die sumenda ab adultis, Lac verò sugentibus adhibeatur frequenter cochleatim.

Quod si magis stringendum foret, ego suaderem adhuc addendum esse *Pulv. Rad. Tormentillæ* ʒß. p. m.

Vel *Grülingii* ꝛ. *Aq. Tormentill.* ʒij.

Cinamom. cydoniat. ʒj.

Dd 2

*Julapium
ejusdem.
Potio ad
diarrhæam
& Variolas
depressas,*

*Mixturæ.
Grolling
ad idem,*

Syr.

Syr. Corallor. ʒʒ.

Tind. Papaver. Errat. ʒʒ.

Laudan. Opiat. gr. ij. Mifce.

Pro doſi in adulto, in infantibus ſæpius cochleatim.

Adſtrin-
gentia, ex-
ſcinſeca.

Adſtringentia ventri quoque, ſed calidè applicari po-
tèrunt, uti ſunt *Unguentum Comitiffæ*, vel *fomenta ex de-
cocto Foliorum Plantaginis cum rubro vino facta*, cali-
dèque applicata.

Vel quod tutius & expertum, ventri applicetur *panis
calidus & toſtus*, ſed diù tamen non relinquatur, nè made-
ſcat, poteſt etiam inungi ille panis modicâ *theriacâ*, ſed
penes vehementer inſiſtendum *diaphoreticis*, ut motus iſte
ab alio ad poros deriveretur, & idè, ut ſupra diximus,
etiam doſis in duplo dari poteſt.

Potus in
diarrhæa
Variolan-
tium.

Potus ſit *Decoctum CC. Tormentill & Maſticis*, &
ſi vires ſint debiles, adde *Vinum rubrum*, vel dentur quan-
doq; aliquot cochlearia *Vini cydoniat* & acidi, non tamen
aſteri quod aluum ſtipat, & tamen Variolas & Morbillos
propellit. Debet autem attemperari *Aqua Carduibenedicti*
cum *Syrupo*, aliâſpectus ferit, & caput tentat, & conſe-
quenter difficilem reſpirationem & delirium cauſat. Ego
ſatiùs adhibeo *Syrup. Cydoniat.* cochlear unum vel alterum,
qui non tam facilè partes aggreditur, & tamen ſtipat & re-
ſtaurat.

Alui fluxus
in Vari-
olantibus à
lumbricis
ortus ut
dignoſci
poſſit &
curari.

Advertendum hic benè eſt, alui fluxum non rarò in pueris
Variolis laborantibus à lumbricis excitari cumq; toto fere
morbi decurſu perdurare, unde vitæ periculum imminet,
quoque expulſio Variolarum impeditur aut imminuitur,
idque facilè dignoſcitur ex deſectione, craſſitie & colore
albicante, tunc enim *lumbricos enecantia* exhibenda ſunt
& *clyſteres dulces* iniiciendi.

Pru-

Pruritus & Dolor ingens in toto Corpore à Variolis & Morbillis præsertim in plantis pedum & Volis manuum.

Morbô jam in statu existente, dolor ingens in toto corpore, præsertim in plantis pedum & volis manuum ægrotum torquet, quem & pruritus intolerabilis excipit, eò quod densior in iis partibus cutis, eruptionem prohibeat. Sed quæret quis quænam sit ejus causa? Antiqui respondent, esse humores acres, biliosos, serosos &c. Neoterici verò dicunt, esse acrimoniam, quam triplicem statuunt, salinam seu lixiviam, seu alcalinam seu austeram & mixtam. Ab acrimonia salina fit curis mortificatio, uti contingit in Gangræna & maculis gangrænosæ, quales in peste sunt frequentes, & nigræ sunt aut lividæ. Ab acrimonia acida corrumpitur quoque pars, sed absque mortificatione tali, ut pars tunc corrupta non nigrescat sed albescat potius, postquam prius rubuerit, ut fit in Variolis. Ab acrimonia mixta attolluntur primum tubercula rubentia & ardentia, sed albam, aliquando lividam pustulam in medio habentia, faciem fædam & lividam effundentia, & mixto modo partes corrumpentia, uti fit in anthracibus. Merito igitur censemus cum Doctissimo Sylvio, peccare in variolis acrimoniam acidam, & ab eadem pruritus & dolorem, ut jam dictum excitari. Dixi acidum intellige acidum obtusum, non acre, quod tamdiu in corpore sine noxa latere non potest.

Hisce malis occurritur sequentibus *fomentis emollientibus & anodynis*, v. gr. immittendo membra, scilicet manus & pedes in aquam calidam, quod pro secreto habet Forestus, faciem verò prurientem sequenti *Decocto* fovet Riverius?

Dolor & pruritus in toto corpore à Variolis & Morbillis. Quare dolor ille præcipue in volis manuum & plantis pedum urgeat? & quæ hujus causa? Acrimonia est triplex juxta Neotericos. Quid consequatur ab acrimonia salina. Quid ab acida. Quid à mixta. Qualis acrimonia peccet in Variolis. Quale acidum sit illud. Curatio dictorum malorum. Decoctum ad faciem prurientem Riverius.

R. *Fol. Maluæ**Parietariæ ana Mss.**Flor. Chamomill.**Meliloti ana p. j.*

Decoq; in *Aqua Scabiosæ* ad ℥ij. Colaturæ adde *℥e Caprifolii ℥iij.* Hâc colaturâ calidè foveantur Variolæ, spongâ vel gossypio intinctis.

Citatio
juxta nos
pruritus &
doloris in
Variolis,

Ego pro maturandis, emolliendis, prurientibus, & simul dolentibus Variolis sedandis, expertum habeo sequens: Accipitur bona portio *Lardi recentis*, sed non falsi, coquitur bene & rectim in *aqua* ut terveat, postmodum ablato ollæ operculo, vapor calidus emittitur in faciem, manus, pedes & ubi Variolæ dolent, quod etiam si opus fuerit, cum moderatione tamen reiterari potest. Hoc remedium etiam singulariter servit in casu illo, quando à quibusdam Variolæ ante tempus acu aperiuntur, quò fit ut dolor enormis, febris & delirium excitetur, cui obviam iri potest faciliè mox dictò remedio.

Aliorum
curatio-
nes,

Alij accipiunt *Lardum vetus non salitum*, sæpiùs in *℥ Rosarum*, vel *℥ Plantaginis* lotum, & in terreo vel vitreo mortario benè contusum, quo toto morbi tempore ad maturandas, emolliendas, & nē dolorem inferant, Variolas, partes inungunt cum summo effectu, & continuant usq; ad morbi finem. Idem præstat *vapor ex aqua calida*. Alii in hoc passu adhibent *cerevisiam calidam* cum *butyro recenti*, quâ calidâ faciem foveant, & est expertum. Alii id ipsum *jusculo carnis pingui vervecino non salito*. Alii *decocto Raparum* cum *butyro*. Alii *pinguedine porci liquefactâ* hoc ipsum præstant & optatum effectum consequuntur.

Grülingius, Riverius, Biningerus, in ingenti faciei pruritu sæpiùs sequenti *Decocto calido* suadent ut Variolæ pruri-

prurientes & dolentes cum bombace aut tenui linteo madefiant;

℞. *Fol. Parietar. M.*

Flor. Chamomill.

Melilot. ana p. j.

Decoctum
ad facies,
pruritus.

Coque in *f. q. Aquæ scabiosæ* ad ii j. Colaturæ adde *aque Caprifolii* ℥iv. Misce quò facies, plantæ & volæ manuum calidè foveantur.

Pyens de febribus pag. 228. si pruritus maximus sit, il-
linis sequenti *Mixtura*:

℞. *Ol. Amygdal. dulc.* ℥℞.

Lilior. alb. ℥ij.

Nucum

Ovorum, ana ℥j.

Scorpion. Matthiol. ℥ij.

Sacchar. Saturni gr. xiiij. Misce.

Mixtura
Picens ad
pruritus.

Si valde excruciarint, præsertim dum incipiunt arescere, inspergatur lectulo *farina lupinorum, Pisorum, Lentium, Cicerum*, dum verò inarecere nolunt, & tamen non amplius efflorescunt, & si suâ humiditate varia incommoda inferunt, tunc locus ille suffumigandus erit *Mastiche & Thure*.

Varia alia
remedia
ad idem.

Alii ad hoc ipsum utuntur *Unguento albo, pinguedine Gallinæ & paucæ cere* intermixtæ. Alii in mitigando dolore & ardore utuntur *lacte muliebri* ex lactantis uberibus in faciem patientis infuso.

Ermüllerus, post eruptionem ut promptè maturescant, extrâ spongiam cum *Saleptri* imprægnatam suadet ut blandè tangantur pustulæ, sic etiâ mortificatur acidum, & sollicitur erosio.

Ermüllerii
consilium
ad præca-
vendam
pruritum.
Optimus
modus
proceden-
di.

Sed omnium optimum in maturandis, emolliendis & dolentibus Variolis est, continuare in bona dosi *expellentium*, & si tunc prorumpat sudor tantò melius, humores enim

Quæ culpa
est quod
quandoq;
sudor non
debitè suc-
cedat,
Ægrotum
culpâ.
Adstanti-
um.

enim acres faciliùs cuti adhærent. Si sudor autem non be-
nè succedat, id fit vel ægrotum, vel adstantium, vel Me-
dicorum culpâ, cum nimirum patientes fiunt impatientes
& tegumenta sudori promovendo sufficientia ferre, aut su-
dorifera sumere nolunt. Adstantes pariter peccant, quan-
do non satis attendunt, & durante febre non rarò delitan-
tes, atque sudore prorumpente corpus denudantes ægros
non satis tegunt, aut dissuadent ex innata & præsumptuosa
inscitia, nè remediis à Medicis præscriptis utantur, quò fit,
ut farinæ hujus hominibus ægri magis obedientes esse so-
leant quàm ipsis Medicis. Medicorum itidem accidit cul-
pa, quoties ipsi parum in arte periti, negliunt necessariò
præscribenda.

Medico-
rum culpâ.

Scroti af-
fectus.

Scroti affectus &c.

SCROTUM in masculis quandoque copiosius inuaditur, &
Siquidem non sine magno gangrænz in parte exsanguis fa-
cile succedentis periculo; ut legere est casum apud Thier-
mair ex Ignatio Satlero lib. 1. cap. 9. fol. 106.

Quomodo
scrotum à
Variolis
præmuni-
endum.
Responde-
tur primo.

Queritur autem, an, & quomodo Scrotum sit à Vari-
olis præmuniendum? *Resp. Primò*, Fieri id potest, ut præmu-
niatur, si ita videbitur, sed moderatè, nè scilicet impensè
refrigerantibus ad partes illas admotis, sanguinis in toto
corpore ebullitionem, fermentationem, ad Variolas expel-
lendas necessariam, confestim sistamus & figamus, ut vide-
re contingit in periculosis narium hæmorrhagiis, à sangui-
nis fervore & ebullitione procedentibus, in quibus vix alio
medio, quàm appositis ad genitalia intensè refrigerantibus;
fervorem & effusionem sanguinis tam promptè compesci
experimur. *Resp. Secundò*. Quod si verò scrotum occu-
pantibus copiosè Variolis suppuratis exulceratum, ex ul-
cere negligentiùs attentò gangræna in sphacelum dege-
nerante

Responde-
tur secun-
dò.

nerante correptum; & metus sit ne testiculi quoque deperdantur, si sphacelus ulterius serperet, hoc præcavere omni studio, oportet, factâ partium sphacelatarum citâ separatione, ope præcipitati rubri cum digestivo Rosato mixti; quod ubi factum fuerit, ut deciduis partibus sphacelatis, nudos tunica vaginali repositos testiculos videre contingat, sine scroto operculo, tum ejus regenerationem, post ulceris canonicam curationem, per sarcotica & epulotica procurare oportebit.

Faciei Morbi.

Morbifici.

Maxima inter cætera sollicitudo & præsertim apud proceres suæ formæ fæminas, non tantum dictas modo corporis partes, ab omnibus Variolarum damnis ac injuriis vindicare, quantum omnibus viribus adlaborare, faciem à cicatricum deformitate tueri, iis enim profectò gravius nihil unquam accidere potest, quam deformes haberi, nihilque illas citius ad vindictam provocare advertitur, quam propriæ deformitatis obrectationem & subsannationem cujus rei duplex posset statui ratio & causa, una divina, altera naturalis. Divina, quia DEUS mortalium superbientium & suis credentium coloribus, pœnam in facie exstare voluit, ut formosus homo vitaret infamiam, deformis verò ut sciret rudimentum esse virtutibus, quidquid deesset corpori, prout rectè monet Seneca *Lib. 1. Naturalium quest. Cap. 17.* Naturalis causa, quam assignat Thomas Bartholinus in *sua cista Medica Lóculo 58. Quest. 3.* est, quod Variolarum maligna qualitas, faciei præ aliis sit infecta ex singulari proprietate, sicut Narcotica cerebro, Lepus marinus pulmonibus, Cantharides vesicæ &c.

Duplex assignatur Variolarum faciem potissimum de turpanti-um causa, Divina & Naturalis.

Varii varia pro tuenda præsertim fæminarum facie excogitarunt curiosiores. Tota facies ex Timæo custodietur, si statim ab initio *eueurbitule* scapulis & fenestribus applicatæ, facies omni die *Aquâ Rosarum tepidâ* in qua
E e modicum

Præservatio & custodia faciei juxta Timæum.

modicum Croci solutum fit bis vel ter lavetur. Vel frequens adhibeatur ejusdem:

℞. *Sumach* grosso modo conquassat. ℥ij.

Aq. Plantag.

Rosar. ana. ℥iij.

Ebulliant bis aut ter, postea colentur & adde

Camphor. ℥j.

Croci gr. i.v. Misce pro usu.

Inunctio
ad emolli-
tionem &
maturatio-
nem Variol-
arum in
facie &
quando
adhibenda.

Pro maturandis & emolliendis quæ duræ sunt in facie Variolis, sufficit ex Sorbait Foresto & Timæo inunctio ex *Oleo recenti amygdalar. dulc.* si, cum Variolæ jam maturaverunt, & in medio albicantes eminent (quod circa nonum, in quibusdam verò vix ante decimum quartum morbi diem solet fieri) dicto oleo cum penna illinantur bis in die usque ad crustarum casum, hoc enim remedio temperatur acrimonia ac maturatio acceleratur, & crustarum casus promoveretur id quod fidæ experientiæ commendat. Forestus *Lib. 6. Obs. 57.* & Grülingius *Obs. Cent. 4. Curat. 46.* Hoc remedio inquit nihil est præstantius, sedat dolorem, maturat, ardori confert, asperitates tollit, & excoriationem mirè sanat.

Quid ægro-
cavendum
ut evites
foveas in
facie,

Vel pro præcavendis foveis in facie, proque maturandis Variolis, ante omnia prævidendum nè æger manibus prurientem locum scalpat & excoriet, factæ enim cicatrices, ut mox dicetur adimi non possunt, quidquid Recentiorum industria hætenus excogitavit, sufficit si aliquantum emendentur.

Alii adhi-
bent ad
evitandas
foveas au-
rum.
Quid circa
hoc notan-
dum,

Alii ad evitandas foveas & maculas adhibent *folia auri*, ubi tamen bene notandum, si aurum purum hoc est illa folia quæ non sunt imposita rubris libellis (qui libelli Bolo sunt imbuti) accipiunt, tum bene fit: si verò aurum adhibent, quod in similibus libellis detinetur, pessimè faciunt,

ciunt, quia bolus refrigerat, repellit, constringit & augmentum Variolarum impedit: hinc dolores, febres & alia varia symptomata, quæ mihi apud quosdam patientes, dum me incio similia folia auri imposuissent, non sine periculo acciderunt. Digbæus in hoc casu hoc modo procedit: quamprimum Variolæ erumpunt, tota facies *Oleo Amygdalar. dulc.* largiter inungitur, hinc *folia auri* faciei & oculis applicantur, intra decem vel duodecim dies cadent crustæ, nullâ foveâ relictâ, est expertissimum. Alii pro medendis maculis & citatricibus adhibent sequens *Unguentum* probatum:

℞. *Ol. Amygdal. dulc.*
Lilior. albor. ana ʒj.
Pinguedin. Capon. ʒiij.
Rad. Peon.
Ireos florent.
Lithargyrii
Sacchari ana ʒj.

Unguen.
 tum ad
 medendas
 maculas.

Misce in mortario calido, & per linteum extrahe, tantum *Unguentum* abluc cum *Aqua florum omnium*, vel ea quæ à pedibus vituli destillata fuit, est probatum. Alii ad delenda vestigia & concavitates utuntur *axungia suillâ*, vel *axungia pisci Aschi*, cum *Camphora* non nihil alterata, quæ valde excellit in explendis foveis Variolarum. Grælingius sequens *Unguentum* pro vestigiis post Variolas in facie & manibus inungendis expertissimum recommendat:

℞. *Ol. Amygdal. dulc. rec. express. ʒiʒ.*
Lilior. alb. ʒj
Axung. Gallin. ʒʒ.
Sarcocoll.
Gum. Tragactban.
Arabici ana ʒiʒ.

Unguen.
 tum Græ-
 lingii ad
 explendas
 foveas.

Litbarg. Auri ʒij.

Farin. Lupinor.

Cicerum

Oriza ana ʒiʒ.

Pulv. Rad. Paon. ʒʒ.

Sacchar. ʒj.

Linimentum Farai
ad fœdas
cicatrices
complan-
andas.

Conterantur conterenda subtilissimè & misce in mortario, superaffundendò *Aquæ Rosarum*, *Lilior. albor. Farbar. q. s.* ut fiat *Linimentum* molle. Paixus ad fœdas faciei cicatrices complanandas & bonum colorem recuperandum, commendat sequens *Linimentum*:

℞. *Amyli triticei sine calce ppt.**Amygdalar. excortic. ana ʒiij.**Gum. Tragacthan. ʒj.**Sem. Melon.**Fabar. excorticat.**Farin. Hordei ana ʒvj.*

In pulverem redigantur omnia subtiliter, deinde incorporentur *Aquâ Rosar.* & fiat *Linimentum* ad faciei litum vesp̄i ex penna, manè verò id abstergetur facie lotâ, aquâ furturum frumenti.

Aliorum
opiniones
de delenda
foreis.

Alii ad delendas omnes foveas & ad acquirendam nitidam faciei pellem *Oleum Olivæ* optimum fundunt ad orbem stanneum & in illud per modum sæpe diu inspicunt, credentes pulcherrimam exinde nasci cutis speciem

Alii quamprimum Variolæ erumpere incipiunt, infantis pedes lacti bubulo calido immergunt, atque hâc methodo Variolarum majorem quantitatem in pedibus erumpere faciunt, emollitur enim cutis & pori dilatantur, ut feracissimè propullulent. Alii locò lactis calidi utuntur *vapore ex Decocto Herbarum emollientium* quò aliquoties pedes foveant.

Alii

Alii erumpentibus jam Variolis totam faciem foveant cum *Decocto* in quo *pisa* ad summam emolliem excocta sunt. Alii faciem plumâ his de die illinunt cum *Oleo Raparum* egregio successu. Alii *Oleum Nucum* recommendant. Alii *Lardum* in camino fumatum & in forcipe ignito seu ab igne candente aslatum seu tostum & liquatum *Aquâ Rosacea* exceptum instar mollis Unguenti, feliter illinire solent. Alii *porci masculi* recens mactati *omentum* in veru ad ignem assant, & destillantem pinguedinem suppositâ *aqua Rosarum* excipiunt, eâque totam faciem obliniunt, mox tegunt ejusdem porci lardo recenti in tenues laminas conciso, bis de die renovando usque ad perfectam Variolarum maturationem & decidentiam, est secretum Magnatum.

Aliorum
plura con-
silia.

Diemerbröeck suis ægris suadet, ut in principio molli spongia toveant totam faciem cum *jure carnis vervecinæ* ad summam molliem coctæ, ablata tamen pinguedine (pinguedo enim cutem nonnihil denigrat) idque aliquoties de die repetunt usque ad Variolarum maturationem, reliquum naturæ committunt.

*Diemer-
broeck*
consilium.

Alii cum successu inungunt *Oleo Tartari* cum *Saccharo Saturni* mixto. Alii sequentem *Pulverem* proponunt:

℞. *Farin. Lentium.*

Fabar.

Orobi ana ʒ℔.

Lithargyrij

Ceruss. lot.

Tutie pp.

Nihil alb. ana ʒij.

Conchar. Marinar. ppt.

Rad. Arundinis

Croci Metallor. ana ʒj.

*Oleum ad
faciem un-
gendam.
Pulvis ad
idem,*

Misce F. *Pulvis*, cujus usus est, postquam maturæ pu-

E c 3

stulæ

stulæ & per acum vel forcipem apertæ sunt, pulverem hunc insperge partibus, & in lectum quoque infantis eundem insperge,

Cnöffelii
remedium
contra Va-
riolas fa-
ciei,

Andreas Cnöffelius autem præsentissimum remedium contra Variolas faciei, nè tam fortiter vel confluant, vel faciem dehonestent, proponit sequens: In initio prorumpentium Variolarum statim debet facies illiniri *Spiritu Vini myrrbisato* ad 2. dies, repetitis vicibus: præterlapsis diebus *saccharum Saturni Aqua Rosarum* mixtum linteaminibus intinctis faciei calide applicetur, idq; reiterando sæpius, quod si patientes linteamina renuant, potest tota facies levi pennâ hâc mixturâ saturatâ illiniri, quod sæpius cum maximo emolumento applicatum esse observatum est ab eodem Authore, qui asserit, quod etsi Variolæ copiosæ fuerint, relictas tamen posthac cicatrices vix apparuisse, & non incongruam faciei formam effigurâsse.

Aliud ex-
perimen-
tum, ad
idem,

Sequens mihi à quodam magnæ praxeos Viro pro expertissimo concreditum est, nimirum uberem Variolarum proventum in facie inhiberi, si mox primo invasionis tempore, pedes vaporibus ex *Decocto berbarum emollientium* surgentibus aliquoties foveantur: & ratio datur; quia sanguinis fermentantis ad inferiores partes hoc modo fit revulsio; pedes enim & crura à vaporibus non tantum incalescunt, sed & emolliuntur & referantur eorum vasa & externæ partes carnosæ: hinc quia copiosius sanguis in iis colligitur, sanguinis ebullientis in partibus superioribus fit revulsio.

Hoc experimentum confirmat simile præservativum quod habet Franciscus Leboe Sylvius, *praxi Medic. Lib. 4. Tract. 1. Cap. 9. §. 76. Habent, inquit, aliqui in more positum, quod faciem à multitudine Variolarum liberent, illasq; ad pedes derivent, ut in lac bubulum calens infantum pedes immergant, & quidem cum primum emergere incipiunt Variolæ*

Variolæ, quod successu non caret, quamvis non sine notabili pedum detrimento, qui dum Variolis replentur, à quibus dolores ibidem excitantur gravissimi, succedente diuturna pedum debilitate, consulitur tamen sic forma.

Beckerus & ex eo plures firmiter credunt Variolas è capite ad manus averti posse, si *succini* armillas manibus quis portaverit. Clarissimus Mateis Archiater Bavaricus refert ad faciem à Variolis præservandam Viennæ dorso seu scapulis apponi *vesicatoria*, de quibus tanquam maximo in Variolis remedio scripsit Valentinus de Phe pag. 161. Hieronymus Velschius *Episagmate* 88. narrat Elisabetham Angliæ Reginam contractas Variolarum suppuratione maculas in se ipsa delevisse *emulsione* lacteâ ex *semine canabino*, separatis corticibus cum *aqua Rosarum* parata, & cum gossypio admora. Alii ad hoc *aquam Fabarum* extollunt. Sequens *Linimentum* teste Sorbait est instar omnium. *℞. Lardi quantumvis*, id liquefac & cola, colatum *aqua Rosarum* benè ad albedinem lava, deinde adde *Ol. amygdalarum dulcium* recenter & sine igne expressum, & *amylî* parum. Fiat *Linimentum* molle, quod inungi potest ipsi faciei usq; ad decidentiam Variolarum, imò etiam post eam.

Varia alia
variorum
præservati-
va ad de-
fendendam
à Variolis
faciem.

Linimen-
tum ex
Sorbait.

Grülingius commendat *linimentum* ex *ovo recenti* in *butyro* fixo, & *aquâ frigida* condensatum cum *aqua Rosarum* loto, de quo mox supra in accidentibus oculorum ad palpebras connatas diximus. Arabes ad Variolarum excitationem, laudabant salitionem, sed non est utendum solo sale, faciem enim totam inflamat, & dolorem infert ob acrimoniam, idè etiam hujus sæculi remedium non est. Plerique Authores in ea sunt sententia & opinione, ut, si Variolæ repletæ sunt pure, argenteâ vel aureâ acu aperiantur, aut stylo, eò quod (teste Gesnero) non tantum ad expulsiorem Variolarum conferant, sed quod glutinandi roborandiq; vi polleat, ægroq; delectet, ut pus subjectum carnem

Quidam
Authores
judicant
Variolas
acu aureâ
aut argen-
teâ aperi-
endas.

Quid de
hac aper-
tione senti-
endum.

In quo casu
possint ta-
les apertio-
nes adhi-
eri.

Unguen-
tum Mon-
tagnana ad
faciem,
dum cru-
sta imma-
tata abri-
piuntur.

Linimenta
ad ulcera
exedentia
faciei.

carnem non erodat, & foveas faciat, pus postmodum puro linteo abstergetur & exsicceetur. Sed è contra saniores Medici id sanius, ac potius naturæ relinquunt, maximè si pus album & coctum sit, cum tale nullâ amplius acredine dotatum sit, ergò superflua est apertio, quia sub talibus nova caro facilè succrescit, ut testatur *Mercurialis Lib. 1. de Morbis puerorum Cap. 2.* Experientia enim testatur, Vartolas quæ spontè rumpuntur & siccantur minores post se relinquere foveas, quàm illas quæ arte apertæ sunt; hos quidem inpraxi observavi, si illæ quæ jam per se ruperunt, vel denuo repletæ, ve non totaliter evacuatæ sint, transodantur, mediis convenientibus illinantur, rem bene successisse, sic etiam si sanies exanthematum livida, aquosa & indigesta appareat, eaque ex aëris contagione pullulârit, tum ab acredinem & virulentiam humorum nè exedant, tum ut virus exhalet, aperire oportet, exili tamen foramine, nè amplò factò, aëri extraneo locus detur. Hinc etiam per consequens nec consultum est ipsas crustas nisi optimè jam arefactæ sint, ante tempus tollere, nè immaturè abreptæ, novum post se ulcus relinquant, quod si tamen præter spem contingat, inungatur *Unguento de Lithargyrio Montagnana*, quod probatum est in hoc casu, teste Timæo, cujus hæc est descriptio & quidem correctæ

℞. *Lithargyrii* ʒij.
Ceruss. ʒss.
Aceti ʒi.
Ol. Rosar. ʒiiß.

F. Unguentum in mortario plumbeo optimè agitatum.

Quod si ulcera exedentia sint orta, unde ingens faciei turpitudine eventura esset, ungenda illa est *Unguento albo Rhafis camphorato*, *Oleo Ovorum*, *sevo vervecino albo facto*, vel *pinguedine Infantis* recens editi circa ejus dorsum reperta.

Timæo.

Timæus sequens recommendat:

- ℞. Axung. Hirco & Caponis aa ʒβ.
 Ol. Amygdal. dulc. rec express. ʒijβ.
 Lilior. alb. ʒj.
 Gum. sarcocoll. ʒβ.
 Farin. Oryzæ
 Lupinor. aa ʒj.
 Marcaffit. ʒβ.
 Rad. Ireos. ʒij.
 Bryon. ʒj.
 Sacchari. ʒj.

Linimentum
 Timæi ad ul-
 cera faciei.

Contunde omnia in mortario affundendo Aq. Rosa-
 rum & Lilior. albor. aa q. s. Contunde denuò & agita
 continuò, postmodum coletur & exprimat per lintecum
 manibus, & fiat Unguentum molle. Sequens etiam à mul-
 tis laudatur.

- ℞. Lithargyrii
 Ceruffæ
 Cadmiæ lotæ
 Pulv. Cannar. ustar.
 Croci aa ʒβ.
 Ol. Lilior. alb. ʒij.
 Cera ʒvj.

Unguentum à
 ad idem.

Misce fiat Unguentum

Ad hanc etiam rem conducunt multa Unguenta & Varia Un-
 Emplastra in officinis extantia ut Unguentum de plumbo, de
 Tutia, de Lithargyrio, de Pompholyge, Diachalciteos de Ni-
 cotiana, Tetrapharmacum, Emplastrum Sticticum Crollii, Un-
 guentum Apostolorum, de Minio, Empl. album coctum &c.

Unguenta &
 Emplastra
 eisdem usui
 inservien-
 tia.

Ulcera harum fovearum si impura sint, prius elui pos-
 sunt (ut prædicta remedia effectum meliorem, sortiri possint)

F f

cum

Aquæ pro cum ∇ Aristolochiæ, Card. bened. Mellis, Plantaginis, Rosa-
 elutione rum, Saniculæ, Gentianæ, Gratia DEI, Hypericonis &c.

faciei ulce Sed in hisce pæssè frustra desudatum est, cum cutis,
 sum. utpote pars spermatica, si profundè exesa & consumpta sit,
 nullâ arte per medium homogeneous regenerari possit, sed
 per medium heterogeneous, scilicet turpes cicatrices. Qua-

propter consilio Foresti, aliorumque quamplurimorum, nil
 Quid de remediis potius admovendum esse, maximè quod pingua &
 his pingui- bus & ole- olea (excepto Amygdalarum dulcium oleo) concernit; quia
 osis juxta Forestum facile inflammantur, eaque vetat Galenus in Erysipelate. I-
 sentiendū. dem dicendum videtur de *Narcoticis* & *Emplastris*, atque
 Quid de etiam *suppurantibus*, quia prima repellunt humorem ad in-
 Narcoticis teriora, Emplastra humoris distensionem prohibent. Sup-
 Emplastris purantia putredinem & corruptionem foveat, ut quotidiana
 & suppu- docet experientia, sine maturatione spontè sapissimè
 rantibus. exsiccari.

Cavendum Svadent & alii ut Medici & Patientes præsertim fæminæ,
 à repellen- indiscretæ formarum suarum amatrices caveant à repellen-
 tibus circa tibus circa partes nobiles: nam hisce mediis sæpe factum est,
 partes no- ut reliquiis morbi intus repulsis, spe evitandarum fove-
 biles. arum, mortem sibi acceleraverunt: ut testatur Borellus *Cent.*
i. Obs. 64. Claudius ad foveas Variolarum pellendas summo-

Clandii li- pere hoc *Linimentum* commendat:

nimentum.

- ℞. Ol. Oli-var. ζ ijβ.
 Succu Limon. ζ v.
 Lilbarg. lot.
 Cmerum Testudin. combust. aa ζ β.
 Pingued. Gallin. ζ β. Misce.

Post hoc Linimentum facies abluatur *Decotto Lupino-*
rum.

Aliud Cos- Dolæus ad rubedinem & maculas tollendas laudat *Pulv.*
 meticum *Specificum Mynsi chti.* Vel potiùs sequens *Cosmeticum.*
 ad idem.

℞.

- ℞. ▽ *Spermat. Ranar.*
Sigill. Salomon.
Lilior. albor.
Flor. Fabar. aa ʒj.
Fæcul. Aronis. ʒj.
Camphor. ʒβ.
Cosmetic. Clauui. ʒj. *Misce.*

Interim tamen absolute non nego, quædam maturantia postulare, sed ad id *fotus*, ut dixi, sufficiunt emollientes; aut denique, hisce non obstantibus ad promouendam & accelerandam crustarum ex Variolis decidentiam, pro colore naturali recuperando, tollendaque rubedine quæ solet perdurare, in gratiam Virginum & Muliercularum tanquam Medicorum fauricum, quæ pulchritudinis conservandæ studiosissimæ sunt, usus sum hæctenus in praxi sequenti expertissimo & ab omnibus laudatissimo, atque ab honorandissimo meo quondam Professore Nicolao à Franchimond mihi communicato.

- ℞. *Ol. Ovor.*
Amygdal. dul. rec express.
Nucum Jugland. aa ʒβ.
Servi Cervin. ʒiij.

M. Sig. *Blatter Salben vor das Angesicht.*

Mercurialis ad fædum cutis colorem in Variolis laudat, ut singulis manè & vesperi facies & manus abluantur hoc *Cremore*:

- ℞. *Lupinor.*
Fabar.
Hordei aa piij.

Contunde grosso modo, & in *f. q. Aquæ* bulliant, donec aqua crassa maneat instar pulvis, & sicuti in se est, eadem facies abluatur, cui mirificum colorem reddit. Idem Au-

Nostrum li-
 nimentum
 ad tollen-
 dam post-
 Variolas
 reliquam fa-
 ciei rube-
 dinem ex-
 pertissimè.

Remedium
 Mercuria-
 lis ad tol-
 lendum fæ-
 dum cutis
 colorem.

Aliud ejus-
dem.

thor extollit *aquam* ex duobus pedibus vituli, duobus pomis citri & duobus pugillis *Serpentariæ* destillatam. Alii utuntur solo *seruo vervecino recenti*, liquatò & pennâ inuncto. Alii *Aquam Florum omnium*, id est ex stercore vaccino mense Majo destillatam quæ est cosmeticum universale. Alii *Aquam Fabarum, Lapat. acut. Sigill. Salomon. Lilior alb. Ag. Mellis, Linariæ.* Alii *succum Aurantior. Citri, Limonum* cum jam dictis Aquis mixtum.

Plura si quis desideraverit hujus farinæ remedia, in Foresto, Quainero, Valefio de Taranta, Marcello Donato, Sennerto & aliis, abundè inveniet.

Quidam
hic optimū
tutissimum
ad omnes
Scopos in
Variolis
obtinendū
dicunt.

Pro fine hujus mox dicti puncti bene notandum, meò judiciò in Variolis & Morbillis nullum melius nullum tutius nullum certius remedium, tam ad defendendas partes externas & internas, quàm etiam præcavandas foveas & vestigia ullâ ratione & experienciâ commendari posse, quam diligentem, proportionatum & continuatum *expellentium* usum, quem ego hætenus usque ad 14. & si malignitas adfuerit in 18. & 20. diem impari tamen dosi & tempore, ut supra dictum, cum felicissimo effectu solitus sum continuare: Nam hisce diaphoreticis, ichor ille acris & erodens infringitur, & ad exhalationem seu transpirationem insensibilem disponitur, unde exsiccatæ Variolæ sponte decidunt, nullis aut exiguis post se relictis vestigiis.

Morbi cap-
pillorum.

Morbi Capillorum.

Remedia
eosdem re-
nasci faci-
entia.

Capillos post Variolas & Morbillos deperditos, renasci facit cinis Allii cum Melle mixtus: *Decoctum Abrotani, Capill. Qris, Rutæ Murar. Politrub. Ceterach, Marrubii, flor. Rorifinarin. Nymphææ, sem. Nasturtii, Eruce, Staphisagriæ.* Plura vide in Sebitzio *part. 6. Cap. 30. pag. 1819.* Et sistem. Gifweini suo loco.

Fe-

Febris post Variolas.

Diligenter attendum est, an non accedat febris continua post eruptionem factam Variolarum & Morbillorum, quæ patet ex ariditate linguæ circa decimam vel undecimam morbidie apparente ex iactatione totius corporis, calore & siti &c. Hoc in casu, plerumque desperato, etsi omnes Variolæ exstent, contra vulgi opinionem, si corpus undique sit plethoricum, ob indicans febrile seu calorem præternaturaliter urgentem, phlebotomia, vel vicaria ejus scarificatio in parvulis celebrari jure merito potest. Itâ tamen, ut immediate post venæsectionem *diaphoretica* vehementiora porrigantur, ut supra dictum est, quin imò & interdum *modicè refrigerantia*, habito ad febrem respectu, exhiberi possunt, præsertim ea, quæ supra, de phreotide diximus.

Febris post
Variolas
erumpen-
ter.
Unde co-
goscatur.
Quid tunc
agendum.

Quid post
sectam Ve-
nam.

Convulsio, seu Motus convulsivi.

Convulsivi
motus,

DE remediis hujus accidentis, diximus superius inter Pulveres expellentes: Extra autem laudatur sequens *Unguentum*, cui eximie adscribuntur virtutes contra omnem epilepsiam præsertim Variolis, Morbillis, & febribus malignis supervenientem.

Rx. *Cinnabar. nativ. rectif.* ʒß.
Lapid. Ophitis ʒiß.
Magnet. ʒij.
Ol. destil. Macis.
Nuc. Moschat.
Quajaci
Lign. Corylini, aa gut. iij.
Confect. Alcherm. ʒi.
Ung. Alabastrin. q. s.
 F f 3

Unguen-
tum contra
Epilepsiam
in Var. his
fronti ap-
plicandum

M.

Oleum vd
idem.

M. f. *Unguentum* ad frontem &c. Huic non impar
est *Oleum Scorpionum magnum Matthioli* ut supra diximus,
etiam dictis partibus inunctum.

Tumor
post aures.

Tumor post Aures.

Qui quandoque Parotides mentitur, curatur sequenti
Fumo, quò lintea suffumigentur & applicentur:

Suffumigi-
um ad eun-
dem curan-
dum.

Rx. *Spic. Ind.*

Oliban. aa ʒʒ.

Succin. alb. ʒiʒ.

Myrrh. rub.

Storac. Calam. aa ʒij.

Flor. Rosar. rub. ʒiʒ.

Lavendul. ʒx.

Cheiri

Menth. sylu.

Antirrhin.

Origani

Primul. Veris. aa p. ij.

M. f. *Pulvis grossus*, in omnibus tumoribus & etiam
doloribus magnis expertus.

Tumor Pedum.

Tumor pe-
dum qui
bus curan-
dus.

Curatur eodem *Suffumigio*, addendo *Flor. Sambuci*, &
Spoliorum serpentum. Vel adhibeatur *pediluvium* ex her-
bis emollientibus ac discutientibus, *Malva*, *Verbascum*, *Lau-
ro*, *Flor. Sambuci*, *Chamomill.* in lacte vel Aqua factum.

SK-

Sudor nimius & colliquativus.

Sudor nimius & colliquativus. Remedia varia eundem curantia.

IN hoc profunt *Flor. Papaver. Errat. Grana Chermes, Radices Acetof. sylvest. Tormentill. Bol. Armen. Corallia, CrySTALL. montan. Conserv. Acetofell. Syrupi & Succu Granator. Corallorum, Acetofell. Emulsio Amygdalar. Margarit. ppt. Spec. de Gemmis frig. &c. ex quibus varia, remediorum formulæ præscribi possunt.*

Alia & quidem plura symptomata & morbos Variolas & Morbillos antecedere, comitari & subsequi testatur Fehr. de Scorzonera pag. 79. Jonstonus Lib. 7. pag. 321. quæ quia nimis multa sunt & rarò inveniuntur, atque etiam ab Auctoribus propriis & dilucidis capitibus abundè tractantur, quò lectorem mittimus, idèò solum eorum meminimus, quæ vel semper, vel ut plurimum obvenire solent.

Fungos plurimos post Variolas in corpore enatos & enatos, refert Borellus Cent. 1. Obs. 34. cum Decocto Scorzonera, Tormentilla, Carduibenedicti, Angelica, Scabiosa & aliorum Cardiacorum & sudoriferorum, quorum frequentius usum æger curatus est.

Fungorum in corpore post variolas enatorum curatio, juxta Forellum

Consonum duxi utilitati publicæ, huic opusculo annexere observationes quasdam rariores, in casibus extraordinariis & quandoque quasi desperatis, feliciter peractas.

OBSERVATIO. I.

Observatio I.

De Puerpera variolante, cum immoderato Lochiorum fluxu.

ERat quædam Mulier, quæ parturitico tempore, quò in eadem domo illius proles Variolis detinerentur, quibus & ipsa per quoddam quasi contagium affici inceperat, nam

nam secundaâ partu die, cum incalescentia febrili & dolore in lumbis, pustulæ erumpere cæperunt, quæ quidem per triduum lochiis moderatè fluentibus mollesceri & ritè assurgere videbantur, tamen autem purgatio uterina eò tempore copiosa obtigisset, Variolas tamen in toto corpore confitissimas habuit, æquè non tantùm in cutis superficie, verùm etiam in oris & uteri cavitate loca implevere, adeò ut vix loqui aut deglutire potuerit. Die puerperii sexto lochia immoderatè fluebant, unde statim cum Variolis flaccescentibus, syncope, convulsiones crebræ, aliæque mali moris symptomata Ægram accesserunt, quæ mortem brevi minabantur. Accersitus Medicus, præscripsit *Pulveris sequentis* 3ß. è cochleari *Julapii* subsequentis, trium horarum intervallis constantè assumendum:

Pulvis ad
inmodera-
tum fluxum
lochiorum
cohibendum.
Julapium
pro Pulve-
re.

℞. *Pulv. rad. Tormentill.* ʒij.

Boli armen. ppt. ʒi.

Spec. de Hyacinth. 3ß.

Misce f. Pulvis.

℞. ∇ *Scord. Comp.*

Tracont.

Ulmæ. aa ʒii.

Acet. Theriacal. ʒj.

Syr. Corallor. ʒii.

C. C. usti. 3ß. *Misce F. Julapium.*

Insuper iussulis, sicut & potulentis quibusvis *Radices Tormentillæ* incoqui præceperat. His remediis purgatio uterina mox in totum sistebatur, & Variolæ sine graviore symptomate sensim maturatæ decidebant. Durus revera hic est casus, & idè cum magno discrimine absolutus, nam & lochia, & Variolas intus cohibere, periculosum erat, & tamen alterutrus plenior eruptio, alterius motum impediabat, quamdiu utraque inordinatè procedebant, res naturæ permissa

missa moderatè se habuit, cum verò alterà invalescente, ar-
cis opera requirebatur, lochijs fræna, Variolis autem stimu-
los adhibere oportuit, ut vita salvaretur.

Nota: Miror, hunc observationis Authorem frictiones in habitu corporis non adhibuisse, quæ motum humorum ad habitum prolificere, & Variolas feliciter elicere solent.

Frictiones
in dicto ca-
su fuissent
præficuæ.

OBSERVATIO II.

Observatio
II.

De Pueri 3. annorum Variolante.

Puerulus trium annorum boni habitus & plenus, cœpit fe-
bricitare cum capitis dolore & rubedine faciei, cum tussi
quadam sicca & pruritu narium, dolor dorsi aderat, febris
magna, calor intensus, pulsus magnus, celer, frequens, va-
lidus, lachrymæ involuntariæ, punctiones & pruritus per
cutem vagabatur, eratque eò tempore, autumnus scilicet, quo
febris in puerulis cum Variolis ac Morbillis vagabatur.

Casus,

Affectus est febris *Synocha putrida acuta*, quic quid aliî
suscitant, de genere earum, quæ mediæ sunt inter malignas
& non malignas, quæ tertio vel quarto die transmittet exan-
themata ad cutim. Est autem de genere Synocharum, quæ
dicuntur *ἐπιδρωσις*, id est, quæ statim à principio vigorem
habent, in eoque perseverant serè usque ad finem, & ex illis
morbis est, qui epidemii dicuntur, quia vagantur in pueros,
licet non negem, quòd aliquando sporadici sint.

Resolutio,

Causa antecedens, est *abundantia sanguinis* in toto cor-
pore, qui fervorem concepit & ebullitionem, non solum ob
plenitudinem factâ obstructione, sed ob malam qualitatem
ipsius fermentum excitans.

Causa an-
tecedens,

Causa procacitica, fuit *præcedens austrina constitutio*,
quæ humores ad putredinem concitare poterat: Nec tamen
credendum est, malam qualitatem sanguinis menstrui ab

Causa pro-
cacitica
ca.

Sanguis
menstruus
non est
semper Va-
riolarum
causa.
Probat.

utero in partibus relictam semper esse causam hujus mali, nam hoc concessio, fuisset semper hic morbus à principio mundi, sed nullus Antiquorum hujus mentionem fecit, nisi rarissime, ut, Hippocrates 6. *Epid.* in Simone, ubi Variolarum meminir, nec earum Galenus unquam mentionem fecit; secus esset, si adeo frequentes fuissent, sicuti nostris temporibus. Præterea si ab utero penderet morbus, in omnibus regionibus & mundi partibus semper fuissent, sed constat, apud Indos occidentales nunquam visas Variolas, nisi proximis temporibus, quibus ab Europa ad eas partes per contagiū in Æthiopum affectorum apparuere, unde magna strages illorum hominum facta est: Quo argumento constat, uteri affectionem non esse causam necessariam hujus mali, sed potius ortum habuisse ex mala constitutione aëris epidemici, deinde continuasse sicut de petechiis & maculis malignarum febrium contingit, ita ut Variolæ & exanthemata dicendi sint potius morbi novi, licet aliquando earum vestigia apud antiquos visa sint.

Prognosis.

Quoad eventum & *Prognosin*, morbus judicabitur intra septem dies, est enim *satis acutus*, & in puero, ubi adest magna copia sanguinis; utrum verò ad bonum vel ad malum, non possumus primâ die distinctè prædicere, nam periculosus & gravis est affectus, & magna habet symptomata: quia tamen statim à principio mali vocati sumus, bene sperare licet. Modus solutionis erit per crisin, non per evacuationem, sed per metastasin, transmittente naturâ materiam ad ipsam cutim, excitando Variolas, ita ut si viscera relictâ fuerint munda, quod cognoscetur ex mediocri Variolarum copia, ex bono illarum colore, quod sint albæ vel rubræ, nec retrocedant, spes salutis est, at si magnâ copiâ extiterint, & adsint non solum Variolæ, sed etiam Morbilli & maculae nigræ, violaceæ, virides; si retrocedant, concidant, aut viscera inficiant, periculosus vel lethalis erit morbus. In magno etiam periculo versantur, quando post Variolarum apparitionem febris declinat, & postea redit & intenditur.

Ad

Modes fu-
turæ solu-
tionis mor-
bi.
Signa bo-
ni eventus.
Signa mali.

Ad curationem venientes, intentiones erunt *Primo*, Corpus evacuare. *2do*, Naturæ motum adjuvare. *3tio*, Corrumpere malignitatem humorum. *4to* Membra defendere, in quæ solet fieri decubitus. Quoad evacuationem, illa vel maxime convenit, quæ fit per sanguinis missionem, quæ plenitudinem & simul fervorem minuit, sed quoniam obstat ætatis trium annorum, præsertim in hac patriâ, ideò nullâ interpositâ morâ cucurbitulas apposuimus, cruribus & natibus cum scarificatione, & extractus sanguis ad *ziii*. manet. Vespere autem duas hirudines ad venas brachiorum internas affiximus, quibus sanguis ductus est ad *ziz*. Nam si major fuisset puerulus, & adstantium inepta resistentia non vetuisset, sanguinem ex vena educere oportebat: atque hoc remedium nullâ interpositâ morâ, in quacunque diei vel febris hora fieri debet statim à principio, nec speranda est declinatio, quia febris uniformis est.

Indicationes.

Prima intentio, quibus pernicienda.

Sanguinis missio è vena non convenit ob ætatem, idcirco cucurbitulæ cum scarificatione subititutz fuerunt.

De Purgatione, hoc malo præsentē non est cogitandum, nè humores commoti ad ventrem educerentur, & dysenterias lethales efficerent. Secundâ die Puer in eodem statu perseveravit, febris ingens, difficultas respirandi. Tertiâ die jam per cutem apparebant maculæ quædam admodum rubræ, quæ cum pruritu elevabantur, & continuo augebantur, adeò ut quarta die jam per totum corpus & faciem pustulæ latiores conspicerentur, coloris albi & subrubri, cum facili tolerantia: nec hucusque medicamentum laxans dedimus, nec clysterem adhibuimus, licet alvus semper sicca exstiterit, quia materia transferebatur ad curem, sed quintâ tantum die clysterem applicuimus, ex juscule pulli, Oleo Violaceo & saccharo.

Secunda intentio erat, motum naturæ adjuvare ad curam, & præcavere, nè materia ad viscera repat, sed tamen cautè hoc opus faciendum est: jam factâ sanguinis missione, statim à prima die speculandus est naturæ motus, ubi enim

Secunda intentio. Quibus ab eo vi debeat, & quomodo.

natura rectè judicat, finire oportet, nec irritare, nec movere, teste Hippocrate 1. *Aphor.* 20. Contra autem fieri solet ab imperitis Medicis, qui indifferenter semper motum hunc adjuvare conantur; id tamen procurandum est, ut statim in principio Puer degat in ære tepido, in thalamo clausis fenestris, & operiatur levibus cooperimentis, nè calor febrilis augeatur, qui magnus est, & cavendum, nè frigiditas aëris eum percutiat. Errant etiam, qui puerulis Variolis correptis statim vinum exhibent, ignemque igni addunt cum magna eorum pernicie.

Potus. Potus potius sit *Aqua Feniculi cum Rasur. C. C.* Vinum etiam non exhibendum, usque ad integram morbi solutionem. In casu nostro cum natura bene judicare morbum

Cibus. videatur, nutriendus puer est jure pulli per se, vel alterato *Radicibus scorzonera*, vel panatellæ in jure dicto cocta exhibendæ. Et quia etiam primis diebus siti magna afficiebatur, & non bene se habebat ad oblata, *destillatum pulli cum Aqua bordei* lymphatum dabatur per intervalla.

Quid primis statim diebus accuri.

Quinto die jam totum corpus pustulis scatebat latioribus, & septimum diem febris imminuta est, & pustulæ partim maturæ, partim etiam jam exsiccabantur. Toto hoc morbi tempore, hoc est à prima statim die semper miscebamus cibis & potibus cardiaca v. gr. *Lapidem Bezoar, Pulverem Perlarum & Corallorum* in *aqua Scorzonera*, ut malignitas infringeretur. Tertia quoque die *levem chysterem* exhibebamus, & hæc ratione tractatus, decimâ die immunis à febre fuit, siccabantur reliquæ Variolæ, & resolvebantur absque ullâ manus operâ. Illud tamen maximè procuravimus à principio & per totum morbi cursum, ut membra à malignitate humorum defenderentur; nam Variolæ interdum in partibus internis non minus quàm externis fieri solent.

Quid maxime procurandum.

In *gulture*, unde rauseo, tussis, aphonia, strangulatio &c. In *Ventriculo, Intestinis, Thorace*, intra *Os, Nares, Oculos*,

culōs, itā ut aliquando cæcitatem afferant. Igitur ad defen- Oculus de-
 sionem oculorum utebamur *Aquā Rosacēā* mixta cum *ovi* fendit iā.
albumine & parum *Croci*. Ad defensionem faucium gargari- Fauces,
 zabat *Decoctum Hordei* cum *Diamoro*. Nares ungebantur Nares
Oleo Cotoneorum & *Rosaceo*, & aperiebantur *butyro* solido
 & coagulato: ad gingivas tuendas colluebat os *Aquā Plan-* Gingivas,
taginis cum *succo Granatorum*: nè ventriculus læderetur, Ventricu-
 dabatur per intervalla *Syrupus Granatorum in Decocto Lenti-* lun.
um. Intestina verò ut non paterentur, defendimus *clysteri-* Intestina.
bus attemperantibus; Solet enim dysenteria aliquando suc-
 cedere huic malo, ex pustulis intus ruptis, ex malignis fluxi-
 onibus, quod ubi accidit, est periculosum, idē evitamus
 omnia medicamenta acia, nè causam occasionalem huic ma-
 lo procuremus. Ultimò procurandum erat, nè cicatrices pu-
 stularum in facie remanerent, quod sæminis alias propriè fa- Maculæ fa-
 ciendum est, id quod solent facere aliqui inungendo notas ciei quæ as
 relictas *Oleo de Vitellis Ovorem* cum *alumine*, sed melius præcaver.
 est, uti *Oleo Fri per deliquium facto*, id est, in loco frigido sub
 terra posito, pulverisato *Fro* in panno lineo sub terra sus-
 penso, & vitreo vase supposito & cum eo inungendo macu-
 las. Sed nihil præstantius est *Oleo Talci*, si haberi poterit,
 inungendo cicatrices, & parum eas fricando.

OBSERVATIO III.

De Juvene 20. Annorum Variolante.

Juvenis quidam 20. Annorum, temperamenti calidi & hu- Casus.
 midius, nullo unquam morborum genere confectus, autum-
 nali tempore grassantibus Variolis epidemicis, subitò circa
 vespèram sentire cepit virium debilitatem & inquietudinem,
 calor per totum corpus erat dispersus, pulsus magnus, respi-
 ratio frequens & celer, cordis quādoque palpitatio, insoli-

tus corporis sudor, gravis capitis sensatio & dolor. Noctu svasu cujusdam amici exhibitâ dosi Aquæ sambui cum pulvere quodam cordiali, exacerbabantur omnia. Altero manè maculæ morbis pulicem similes seu petechiales, undique apparebant. Secabatur igitur illico dextra brachii vena, & mox Variolarum tubercula prorumpunt. In consilium vocatis Medicis, ab iisdem inquisitum fuit, quid revera affectus sit? quid ex eo sperandum, an & quomodo, quibusvè remediis curandus? *Affectus*, quò æger affligitur, sunt *Variolæ*, ad morborum acutorum intemperiem, febriumque continuarum & malignarum classem referendæ, varia, eaque multiplicia symptomata secum ferentes, quas à Morbillis & aliis similibus exanthematibus distinctas, Germani speciali nomine vocant die Kinder Blattern. Adesse autem revera Variolas, signa infallibilia in casu proposito adducta demonstrant, eaque petuntur *Primò* ab essentialiter in hærentibus exanthematibus per totum corpus & essentiam consequentibus symptomatibus, qualia sunt: Virium debilitas, inquietudo, calor totius corporis, ac sudor copiosus, pulsus magnus, respiratio crebra, & cordis palpitatio, quæ Epygenemata Silenum illum apud Hipp. *Epid. Lib. 1. Egrot. 1.* affligebant, ex quo pariter patet, hoc genus morbi non esse novum, cum Divo Seni Hippocrati olim notum fuerit, ut testatur allegata auctoritas: & ratio quoque convincit, siquidem eadem causæ & causarum circumstantiæ, quæ de factò assignantur, antiquis quoque fuisse, nemo negabit, nec contrarium evincet.

- Secundò*, causæ prægressæ tantarum fuerunt virium, ut ad hunc morbum efficiendum sufficere faciliè potuerint. *Tertiò* similitudo rei veritatem demonstrat, quamplurimos eò tempore eodem quasi modo affectos, observatos esse, quos Variolis laborare, ratio firma & effectus confirmavit.

Signa ex quibus notatur & confirmatur hæc affectum esse Variolas,
I.

II.

III.

Subiectum Variolarum primum.

Subiectum Variolarum primum sunt externæ partes cutis totius corporis, vel potius cuticula, faciei potissimum, quæ præ

præ carnis his tuberculis infestatur, idque ob cutis in facie teneritudinem, vel humorum ferventium versus superiora ascensum, sunt tam æ, qui experienciâ edocti, non externam solum sive faciem, sed viscera quoque interiora fere omnia pustulas has occupare testantur. Patiuntur autem ab calore præternaturali & consequentem palpitationem non solum cor, sed reliquæ etiam partes plurimæ, mali sunt participes: Pulmones quidem ob respirationem auctam, Cerebrum ob co, huiusmodi & vigilias, Ventriculus ob symptomata in omnibus malignis febribus eidem communia: Totum denique afficitur corpus, quatenus ebulliens & malignus sanguis effervescentiam ac qualitatem suam venensum singulis microcosmi partibus beneficio circulationis communicat.

Causa immediata & continens est materia maligna, à peculiari *masse sanguineæ* & liquorum circulantium corruptione & effervescencia proveniens. *Causa* antecedens seu *mediata* est partim *sanguis* in toto corpore contentus, partim *liquores* in & extra sanguinem contenti, qui sanguini, musti instar, fermentum & inde effervescenciam subministrant.

Causa remota naturalis est primo temperamentum calidum & humidum, putredinis mater & morborum calidorum author. 2do Ætas juvenilis. 3tio Quod æger nullo hactenus morbo laboraverit, unde materia impura diu collecta & occultata, tandem Naturæ robur suum exerente, à bono separari & expelli debuit. 4to Connata denique impuri sanguinis materni impuritas, quæ foetui iam in utero communicata, per totam se substantiam occultè diffuderat, si Veterum vestigiis insistere licet, secus verò si Neotericis, uti fufius in Tractu dictum est.

Causa remota non naturalis, ut multas reticeam, primaria merito videtur esse aer corruptus, atque à peculiari quadam malignitatis specie contaminatus: Accedit tempus Autumnale, quod acutissimos morbos & maximè exiiales ge-

Cur faciem potissimè occupent.

Quomodo etiam interna viscera afficiantur.

Quomodo cor.

Pulmones

Cerebrum

Ventriculus.

Et quomodo reliqua.

unus corpus.

Causa immediata &

continens.

Causa antecedens.

Causa remota naturalis.

1. H.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

Vitæ ratio, gnit, unde etiam hæc luc epidemia! per totum grassante, facit
Motus, Animi Pathemata, le huic malo fomes existere potuit: *Vitæ pravus* ex cibis va-
 rii generis, fructibus præsertim inordinate assumptis & inge-
 stis: *Motus* & agitatio corporis continua, propensio denique
 ad iram, in puero calidioris temperamenti, sanguinis fervo-
 rem excitare, fermentum quasi eadem addere, atque ad ex-
 ternas partes propellere valuerunt.

Causa remota præternaturalis, nulla hic locum habet,
 cum, ut dictum, noster patiens nullo hætenus morbo labo-
 raverit.

Rationes symptomatum in hoc casu allatorum, Ex dictis ergo causis sensim generatus affectus, subito
 in actum erumpens, mirum non est, quod prædicta, quæ sig-
 norum loco fuere enarrata, habuerit symptomata: Quorum
 singulorum hæc ratio dari potest.

Unde virium debilitas, Virium in agro nostro adest debilitas, partim ob labo-
 rantem partem principem, nempe ipsum cor, cui præsertim
 malignitas hæc est infesta, partim ob calorem vires resollen-
 tem, & spiritus vitales dissipantem, partim ob materiæ mo-
 lem & copiam, quæ à venis in musculos exonerata, & imbe-
 cillitatem illam consavit.

Unde inquietudo, Inquietudo excitatur à calore insolito, tenuiorumque
Unde Calor, vaporum acrimonia corpus undique lacerante. Calor to-
Unde pulsus magnus, tum corpus quasi adurit ob nimiam sanguinis ebullitionem &
 fervorem ab humoribus biliosis & acerbis accensum, ac per
 totum corpus late diffusum. Pulsus est magnus ob virtu-
 tem fortem arterias dilatantem, usum itidem & calorem au-
 ctum, qui id, quod noxium, extrusurus, naturam ad magnam

Quæ causa frequentis & celeris respiratio- nis, dilatationem cogit. Respiratio adest frequens & celer, vel
 quod ipsam pulmonum substantiam Variolæ occupant, vel
 ignea in Corde & Pulmone accenditur caliditas, quæ cum
 usum augeat, respirationis celeritatem excitat: quia verò
Quæ pal- pitationis cordis, celeritas usui satisfacere non potest, exigit frequentiam.
 Cor per intervalla palpitat, ob malignam materiam, quæ eor
 irri-

irritat, unde laborat, illud palpitatione expellere, quod sibi noxium est. Sudor copiosus erumpit, ob humiditatis excrementitiæ copiam & humiditatem, calorem præsertim auctum & virtutis expultricis robur, quod dum superfluum illud simul & confertim excernere nititur, multos sudores facit. Dolorem capitis producunt tum halitus calidi & acres sæd caput ascendentes, tum humores biliosi & serosi per arterias ad meninges delati, easque velut aculeis pungentes. Aucta sub noctem sunt omnia, quia pulvis ille cum Aqua Sambuci propinatus robur interdum auxit, atque ad hostem expellendum quasi armavit, unde majori mox cum impetu bellum aggressæ vires ad exteriora morbum propulsarunt, maculæ ergo mox in toto apparuerunt corpore, dum natura à medicamine adjuca, vel à copia irritata materiam à parte nobili ad ignobilem à centro ad circumferentiam, pellit: Inde maculæ parvæ quasi petechiales existunt, mox verò natura per venesectionem levata in expellendis maculis exsuscitatur & fortior exsurgit, & Variolas protrudit.

Quæ sudor
copiosus

Quæ causa
doloris
capitis.

Cursus
noctem
omnia sunt
aucta.

Prognostica salutis & mortis nulla quidem hic certa dantur signa, cum verum sit illud Hippocrat. 2. Aphor. 19. Morborum acutorum non omnino esse certas mortis aut salutis prædictiones, si tamen ex morbi magnitudine, & viribus ægri collatis iudicium facere licet, non omnino hic desperandum, cum naturæ robur adhuc se sufficiens vincendo morbo exhibeat. Quò verò vires fortiores, & symptomata mitiora sunt, eò melior morbi eventus sperandus. Brevem fore morbum hunc colligi potest, vel solum ex eo, quòd acutus sit, qui dicente Galeno 2. Aphor. 59. & 23. velociter atque cum impetu ad statum movetur, præterea facultatis robur adhuc præsens, ætas juvenilis, sudor, imò totus morbus calidus & reliqua signa simul sumpta brevitatem prænunciant.

Prognostica.

Brevitas
non solum
de colligitur.

H h

Modus

Modus
eventus,

Modus evendū etiam considerandus, non lentā, sed subitā mutatione, nempe crisi ægrum sanitatem recuperaturum, colligere licet ex morbi & motus ejus vehementia; bonam verò fidem & perfectam crisin denunciant materię ad partem aliam & quidem ignobilem ac distantem translatio, quæ quia in totam sit corporis substantiam & circumferentiam materię totalis ejectio, atque sanitas mox illam subsequetur.

Curatio.

Curatio citissimè est aggredienda, cum periculum sit in mora, nè plura mox propullulent symptomata, quibus postmodum penitus eradicandis neque natura, neque ars sufficiant: Nititur autem curatio suis indicationibus, quæ triplicis sunt differentię, *Curatoria*, quæ morbum ejusque causam immediatam tollere jubet. *Præservatoria*, quæ causarum antecedentium & symptomatum etiam oblationem postulat. *Vitalis*, quæ virium adhuc præsentium aut amissarum aut debilitatarum restorationem attendit. Triplici huic indicationi ut satisfiat, materia præsidiorum externario fonte Chirurgico, Pharmaceutico, & Dietetico crit haurienda.

Materia
remedio
enim ex
triplici
fonte de-
sumitur.
Qualis ex
Chirurgico
& ob quas
causas:

Chirurgico, recta ratio venam secare jussit, cum febris adsit continua & maligna, sanguis calore præternaturali accensus ferveat, æger sit plethoricus, & viribus adhuc valens, ætas sit item juvenilis, nec alia symptomata obsteterint: Hæc venæ missio naturam ab onere, quò opprimebatur, liberavit, ut, quod molestum est, facilius vincere ac expellere licuerit; quamvis verò inter initia exanthemata hæc parva apparuerint, attamen consuetum erat, venam incidere, cum morbus adhuc fuit in principio & laboranti naturæ, quæ imperfectè maculas protrusit, spiritibusque suppressis, fuit succurrendum.

Qualem
materiam
præbeat
pharma-
ceuticus
fons.

Pharmaceuticus fons exhibet *Evacuantia* & ebullitionem mitigantia, *Diaphoretica*, quæ naturam pellen-

do

do adiuvent: *Alterantia* & *Confortantia*, quæ noxium à Corde propulsent, *Partes reliquas defendentia*, & tandem ipsa exanthemata penitus auferentia: *Laxantia*, quæ cacochymix copiam imminuant, hic non sint validiora, sed talia, quæ leniter tantum aluum subducant, nè humorum vehemens fiat commotio, aut ad interiora attractio, in quem scopum usus clysterum & suppositoriorum sufficet, attamen tantum lenientium; declinante autem morbo, ubi Variolarum nullum amplius supersit vestigium, earumque crustæ à corpore deciderint, ad expurgandas reliquias (nè recidivas faciant, vel pejus malum procurent) per os exhiberi possunt Infusum Rhabarbari cum agarico trochiscato in aqua Fumarix, vel Infuso Folior. sennæ in Cerevisia: vel pruna vel Passulæ laxativæ. Diaphoretica ac expellentia, quæ noxios humores versùs exteriora protrudant, præscribi possunt sequentia:

Qualia
conveniunt
ex laxanti-
bus in
principio.

Qualia sa-
declinatio-
ne.

℞. ① *Card. bened.*

C. C. phil ppt.

Terr. sigil. ana ʒβ. *Misce F. Pulvis*, pro
Doli in aq. *Card. ben.* dandus.

Diaphore-
tica.

Vel ℞. *Aq. Cordial. Saxon. seu camphorat.*

Aliud.

Flor. Borrag.

Card. bened. ana ʒj.

Syr. acetosit. Citri ʒvj.

Confect. Alcherm. ʒj.

Tinct. Bezoartic. ana ʒj.

Pul. Viperar. gr. xij.

Misce F. Potio, dividatur in duas doses.

Vel ℞. *Elect. Diascord.* ʒj.

Aliud,

Aq. Cordial. Saxon. ʒiv.

Syr. Card. ben. ʒj.

Tinct. Bezoar.

Misce F. Mixtura, Dosis Cochlear unum sæpius exhibendum.

Hh 2

Sudor

Sudor diligenter abstergatur, & lintamina mutentur, calefactis prius aliis indutis.

Decoſto Lentium ab antiquitate commendato ſæpè favet experientia & ſignatura, expulſionem enim juvat. Intuitus pannorum chermefinorum ob ſimilitudinem colorum juvare ad expulſionem, à Mulieribus cenſetur.

Præcipi-
fantia.

Præcipitantibus, ut *C. C. uſto*, *Coralliis ppt.* *Ocul. S* &c multum tribuitur à nonnullis: ſed cavendum, nè dum ſig-
tur materia, ſeparatio quæ ſit vi fermenti à naturali mi-
ſtionis modo recedens, turbam majorem exciter. Alte-
rantia & Confortantia uſurpari poſſunt internè ſequen-
tia:

Alterantia
& Confor-
tantia:

xy. C. C. phil. ppt.
Unicornu ver. ana. ʒß.
Terr. Sigill.

ſpec. de Gem. frig. ana gr. xij.

Misce F: *Pulvis Doſis ʒj. in Aq. Cordial. frig. Saxonie.*

Externa
cur. ca-
venda.

Oculos
deſcenden-
tia.

Nares,

Guttur.

Quomo-
do totalis
eradicatione
Variola-
rum pera-
genda, &
quid in in-
unctione.

Ab externis ob metum expulſionis abſtinendum. His igitur ritè ſic adminiſtratis, ipſa quoque ſymptomata facilè ceſſabunt, utpote quæ pleraque cum morbo curationem indicant. Reliquas corporis partes ab ulcuſculis his deſcendimus, oculos circumcirca ʒ optimo confricando, vel *Aq. Plantaginis* & *Euphraſie* cum pauxillo *Croci* illinendo, vel denique clauſos *calido lacte* vel *Decoſto Hordei* fovendo. Nares nodulò ex *Campbora* cum *aceto Roſarum* immiſſo præſervando, vel ocluſas *Oleò amygdalarum dulcium* illinendo. Guttur *decoſto hordei* cum *Melle Roſar.* eluatur, vel etiam *Cremore hordei* dilutiorè, aut alio tali *gargarisma- te* v. gr. *xy. Aq. hordei ʒß. Aq. Plantag. ʒij. Syr. Myrtin. Diamor. ana ʒj.* Miſce. Ad totalem eradicationem Variolarum pertinet, ut ad maturationem perfectam deveniant, quæ promovetur inunctione crebrà *Olei Amygdalarum dulcium*, *lactis muliebris*, cui parum *Croci* ſit permix-
rum:

tum. Probatum etiam præsidium multi extollunt, frustum *lardi recentis*, fronti & hinc inde partibus faciei applicatum. Maturis pustulis, si materia contenta sponte sua prorumpere nolit, non diuturnam moram ulceris profunditatem inducat, *Variola.* aut subjectis etiam partibus noceat, acus argenteas vel *tum aper-* aureas applicare jubent multi, sed satius est intactas relin- *tione,* quere, dolor enim quandoque major excitatur.

Dieteticus fons in sex rerum non naturalium legitimo *Dietæ,* usu consistit. Primò in *naturali*; cibus eligatur tenuis, *Primò in* boni succi, facilisq; concoctionis, ut sunt juscula pullorum, *Naturali* gallinarum, caponum, hordei, &c. Videntur è contra cibi *Cibus qua-* pravos succos generantes. Secundò in *Vitali*: Aer eligatur *lis eligen-* ad caliditatem & siccitatem vergens, quò & natura me- *dius.* liùs expellere malignitatem possit. Vitetur frigiditas ex- *Quò vitan-* terna omnimodè, utpote quæ maculas omnes mox facit *Secundò* disparere, atque hæc sola sæpe mortis præsentaneum in- *in Vitali,* ducit periculum. Animi pathemata cane pejus & angue *Aër.* fugiant ægri; iram præsertim, timorem & mæstitiam, ut- *Animi pa-* pote quæ ad cor revocare malignitatem, & ingens pericu- *themata.* lum afferre solent. Tertiò in *Animali*, somnus & vigilia *Tertiò* moderatis se excipiant vicissitudinibus, quietus æger jace- *in animali,* at, nè vires prosternantur, alius semper teneatur in offi- *Somnus &* cio prona, non tamen nimis præcipitetur decoctis expul- *Vigilia,* sive, nè noxia sequatur Diarrhæa. *Excreta.*

OBSERVATIO IV.

Observa-
tio 4ta.

Herula 14. propè Annorum.

NOna Martii Herula Illustrissima plethorica, Austriacâ *Casus,* natione cepit conqueri de lumborum gravitate & tussiculâ eam molestante, quam horror & calor reciproce concomitabatur, idq; non procul à menstruatione,

H h 3

Ei

Curatio
quibus
peracta,

Ei præmisso *Clystere*, hâc ipsa die mihi sanguinem ex brachio ad minuendam plethoram, altera die ex pede, simulque præscripsi sequens Apozema pro potu ordinario:

Apozema,

℞. *Rad. Fœnicul.*

Acetos:

Scorzoner. ana ʒj.

Rasur. C. C. ʒß.

Fol. Scabios.

Scordii. ana Mj.

Ficum ping. par. iij.

Sem. Napi.

Card. bened. ana ʒij.

Lentium excorticat. ʒß.

Gum. Tragacant. ʒiß.

Concis. Misce scq; *Species Eðymatic.*

℞. *harum Specierum ʒj.*

Coque in f. q. *Aq. ad lib. IV.* signetur *Decoctum Eðymaticum*, de quo pro potu ordinario, continuo bibendum loco Vini & Cerevisiæ.

℞. *harum Specierum ʒj.*

Coque in aq. q. s. *ad ʒij.* Signetur *Decoctum Eðymaticum fortius.*

Potio su-
dorifera,

℞. *Decocti bujus fortioris Eðymatici. ʒij.*

Syr. de succ. Citri. ʒj.

Pulv. Rub. Pannon. correct. ʒij. Misce pro dosi.

Detur in triplo in tribus vasculis diversis, singulis octo horis unum sumendo, v. gr. manè hora octavâ, vesperti horâ quartâ, & de media nocte; duabus horis post porrigendo alimenta convenientia.

Aqua Con-
fortativa,

℞. *Aq. Cordial. frig. Hercul. Saxon. ʒijij.*

Signetur *Aqua Confortativa* cochleatim sæpius sumenda.

10. Mar.

10. Martii ordinata sunt sequentia : *1. Ol. Scorpion* ^{Oleum.}
magn. Matbiol. 3ß. Sig. *Oleum* pro inungenda spina dorsi,
 axillis & inguinibus.

2. Magist. Perlar.

Corallor.

Pulvis,

Ebor. ppt.

C. C. phil. ppt.

Bezoart. mineral. ana ʒj.

Misce f. *Pulvis* dividendus in 4. doses æquales, quarum
 quævis singulis iusculis imponetur.

3. Decoct. Edymat. fortior. ʒiij.

Pul. Pannon. rub. correct. ʒij.

Potio,

Bezoar. Oriental. gr. i.v.

Misce pro dosi. Detur in triplo in tribus vasis diver-
 sis, sumendo ut ant.

11. Martii *4. Decoct. Edymat. fort.* ʒiij.

spec. de Hyacint. 3ß.

Alia potio.

Bezoar. Orient. gr. vj.

Misce pro dosi, in triplo, in tribus vasis diversis (hic
 fluxerunt menses)

12. Martii. Repetatur *Pulvis Cordialis* pro iusculis, Re-
 petantur *apozemata* ultima Num. 3.

5. Saccb. cand. alb.

Tutæ ppt. ana 3ß.

Sumach. ʒj.

*Nodulus
 pro aqua-
 ophthal-
 mica.*

Include in Nodulo, infunde in *aqua Rosar.* ʒiß. Sæpe
 instilletur gutta in oculum.

13. Martii. Repetantur *Apozemata* Num. 3.

6. Julap. Violar.

Syr. Jujubin. ana ʒß. sumat cum baculo li-
quiritiæ.

14. Martii. Repetantur *Apozemata* Num. 3.

Repetantur *Pulveres Cordiales* pro iusculis.

7. Aq.

Gargaris-
mus,

℞. *Aq. Plantag. Malvæ ana* ℥ss.
Julap. Violat. Mellis Rosat. ana ℥ij.
Misce pro Gargarismate.

15. Martii. Repetantur *Apozemat.* Num. 3.

16. Martii. ℞. *Decoct. Ectymatici fort.* ℥ij.
Pul. rub. Pannon. ℥ij.

Misce pro dosi, detur in triplo in tribus vasis diversis.

Ad impedienda Variolarum vestigia deformia, ubi jam Variolæ inciperent maturescere & albescere, hoc linimentum præscripsi, quod, modò Variolæ non attingantur digitis, nunquam me fefellit: eò ter vel quater per diem plumaceolo gallinæ nigræ subtili inungendo Variolas in facie usque ad casum,

Linimen-
tum Ecty-
maticum
ad delenda
deformia
Variola-
rum vesti-
gia.

℞. *Ol. Orvor express.*
Nucum Jugland.
Amygdal. dulc. ana ℥ij.
servi Cervin. ℥j.

Liquefiant simul, & serviat pro inunctione Variolarum incipientium maturescere & dealbari.

17. Martii. Repetantur *Apozemat.* Num. 3.

18. Martii. Repetant. *Apozemat.* Num. 3.

19. Martii. Repetantur *Apozemat.* Num. 3.

20. Martii. Toto tempore usa est pro poru ordinario *Decocto Ectymatico tenui*, uti sub die nonâ Martii describam. Nora bene, si segnius prorupissent, loco *Pulveris Cordialis* admiscuissem singulo jusculo *Bezoard. mineral.* ℥j. Sub hac Cura cautè processi, quia tum temporis febres malignæ petechiales grassabantur, ac ideo verebar, ne quid maligni admisceretur.

Unguen-
tum aliud
Ectymati-
cum,

Grana Chermes sola sunt sufficientia ad foras pellendum a ʒb ad ʒb. *Unguentum aliud Ectymaticum*, ne Variolæ destruant faciem, sic concinnari potest: ℞. *partem posteriorem Vervæcis*, assetur ad medietatem, ei cultrum infige & exprime

exprime succum ad 8. cochlearia, quibus adde *Cremoris Lactis cochlearia i-v. Vitell: unius ovi, sanguinem unius Columbe junioris*, Misce omnia simul & plumaceolo gallinæ ei intincto, unge variolas, quando incipiunt maturari, est probatum. Vel: Aliud.
R. Crem: lactis & Olei lini ana Misce & plumaceolo intincto inunge.

Emusione Edymaticâ si opus fuisset, sequens multum profuisset

R. Sem. Napi. Aquileg. aa. 3j.

Citri, Card. bened. aa. 3ß.

Aq. Card. bened. scorzonæ. aa. 3v.

Emulso
Edymati-
ca.

F. l. a. *Emulso.* Colaturæ per linteum expressæ adde
3nii Diaphoret: ritè & recenter ppt. 5j.
C. C. sine igne ppt. 3j.

Misce Sig. *Emulso* expellens cochleatim pro libitu sumenda. Si eam gratiorem reddere desideras, adde sacchari perlat. q. s. ad gratiam.

Pro Gregariis.

R. Lentium 3jv.

ficum No. xvj

Decoctum
pro Gre-
gariis.

Ficus secentur per medium, & fiat decoct. in *Aq. B. xij.* ad tertiæ partis consumptionem, bibat ad libitum. Signetur
Ordinari Trans:

R. Hujus Decocti Ordinarii 3ij. iij. vel. v.

stercor. recent. Verveç: oder Hamels-Roth.

Misce cum Decocto & percola per linteum, de hoc exhibe singulis octo horis, vel bis per diem, & desuper sudet.

Nè autem Variolæ lædant vel deturpent faciem, subito in principio assistens scemina accipiat medium cochleare *Cremati* ad os, ex quo emittat halitum in faciem Variolantis.

Ad præ-
cautionem
nè faciem
deturpent
Variolæ
Aliud.

Ii

Quando

Quando sunt fastigiatae & maturari incipiunt, accipe *Lardum recens insulsum*, in tenues lamellas conficissum, quas applica faciei. Vel tale *Lardum* coquatur in Aqua sine sale, supernatantem pinguedinem Aquae collige, & eâ inunge faciem Variolatam.

Der weisse Ruben: Saamen ist auch sehr gut zum Austreiben/ wann man ihn mit gesottenen Linsen: Wasser eingiebt.

Vide plura Euporista apud Adrianum Nasser, *Pag. 651.*

Aliudad
depellen-
das cyc-
trices.

Variolarum cicatrices nè remaneant: ꝛ. *Lardum vetus albissimum*, conscinde in partes longas ad crassitiem parvi digiti, quas involve charta albâ, has unam post alteram accende ex una extremitate, & quod guttatim decidit excipe: Aquâ munda, quâ etiam aliquoties lavandum. Ea Variolas maturescere incipientes obline, est secretum Doct. Monnier Medici Monspelienſis Galli; si addideris aliquid *Olei Ovorum* efficacius reddetur.

Linimen-
tum Ety-
maticum.

Linimentum aliud Etymaticum: ꝛ. *Ol. express. Nuc. Jugland. Ovorum. aa. ʒi. sacchar. tñi. ʒss.* Misce exactè & fiat *Linimentum*, quod plumaceolo-perdici Variolis in vigore jam positis cum cutis inflammatione conjunctis, quæ à salibus corrosivis & acribus dependet, sæpe inungatur. Hæc non repellendo, sed mitigando ac edulcorando compescit, prout sæpe expertus est Frid. Hoffman etiam in Illustrissimis Ducalibus subjectis, quibus etiam cum *Emplastro de Spermate Ranarum* non veretur applicare. Vid. Frid. Hoffman.

Notar.. in Schröder. Pag.



APODIXIS MEDICA

De

Infantum bona & legitima educatione,
 eorumque vera & sincera, benè vel malè con-
 constitutorum providentia, atque solerti, tuta, ac jucun-
 da imminentium & accidentium Morbo-
 rum curatione.

*Tradita ingenuæ & avidæ Juventuti Fa-
 cultatis Medicæ Pragensis*

Ab

EODEM AUTHORE.



PROÆMIUM,

Seu

*Compendiosa Introductio in universum
hoc Opusculum.*



Ragilem humanæ vitæ vanitatem, & vanam fragilitatem, ac miserrimam ejus conditionem, ab ortu ad occasum, variis calamitatibus, assiduis laboribus, & millenis ærumnis continuo agitari, nostri olim abundè concestati sunt Veteres, & nos hodiernis ferrèo ac spinoso accatenati sæculo, infortunati Adæ filii ultra experimur, cum vivere nostrum nihil aliud sit, quam pati, gemere, & tandem mori; dum crescimus, vita decrescit, & diem quem vivimus, cum morte dividimus. Id quod multis abhinc sæculis *Cous noster Hipp. epist. ad Tamageth*: totum hominem ab ipso ortu morbum esse, asseruit, quem imitatus Poëta sequenti modulamine confirmat:

*Cor nisi cura, nihil, caro nil nisi triste cadaver,
Nasci egrotare est, vivere sepe mori.*

& D. Augustinus *egrotare* inquit, *incipimus, mox ubi nascimur.*

Non ineptè profectò vitæ nostræ, ejusque fortunæ instabilem statum ac fugax imperium, in rota pinxere Veteres, quæ ostenderent, quàm illa, quæ alto nunc monstrat apice coruscantia

tia, duræ vicissitudinis inexorabili ratione calamitosè cadant revoluta, & cuncta tristem subeant mutationem: nihil proinde æternum, nihil immutabile, quàm DEUS; nil durabile, nil stabile, nisi Mundus, & in Mundo nihil; minimè omnium ipse Homo, de quo Justissimus ille Legifer Solon, *putredo in exortu, bulla in omni visa, esca vermium in morte*: Sophorum Princeps Aristoteles: *Homo imbecillitatis exemplum, temporis spoliū, fortunæ lusus, inconstantiæ imago, trutina calamitatis, speculum corruptionis*; Disertissimus Plautus: *Homo mancipium mortis, viator transiens, pila quâ ludit Deus*: Divinum Os Sapient. 5. *Homo hospes unius diei*. Singulæ profectò horæ, imò singula instantium momenta, notabilem exiguæ vitæ nostræ portionem deprædantur, dum verba facimus, vitam terminamus: aprimè sanè curiosorum quispiam vitæ nostræ typum cum candido Ligustri flore comparavit, qui surgente sole floret, occidente marcescit: talem faretur Job. 14. *Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miseriis. qui quasi flos egreditur, & conteritur & fugit velut umbra, & nunquam in eodem statu permanet*. Hæsterni quippe sumus, & ignoramus, quoniam sicut umbra dies nostri super terram, & numquid non paucitas dierum, meorum finietur brevi? cui Poëta accinit:

*Uit rosa manè viget, tamen & mox vespere languet
Sic modò qui fuimus, cras levis umbra sumus.*

Inde alius:

*Unde superbit homo? cujus conceptio, culpa,
Nasci pœna, labor vita, necesse mori.*

& tandem illud Parnassi Decus Ovidius 4. de Ponto:

*Omnia sunt hominum tenui pendencia filo,
Et subito casu, quæ valuere, ruunt.*

Plinius quidem perfectissimum & absolutissimum DEI opus; *Mercurius*, miraculum magnum ac simillimum DEO; *Tullius*, animal plenum rationis & consilii, mundi epitome, & delicias naturæ; Sapiientissimi *Aegyptii* adorandum & admirandum animal; *Pythagoras* omnium rerum mensuram & exemplar Hominem appellavit. Sed revera, qui genuinam hominis appellationem, dignissimâ consideratione ex Hebraico genuinè eruerit idiomate, per Hebræos Eofchæos, hominem miserum mortalem, variisque ac gravibus morbis, imò libitinæ & immaturæ mortis (sic jubente Divino Numine *Genes. 2. cap. 3.*) addictum, ejusque vitam in terris non aliud, quàm morbum perpetuum, miseriam inextricabilem, & cursum indefinentem ad mortem & sepulchrum pronuntiavit. Fatetur hoc universum mundi chaos, confitetur humana mortalitas, & omnis in terra natans & transitoria ætas, omnium maximè labilissimæ Infantia teneritudo contestatur: de qua *Ovidius in metamorph.*

Editus in lucem jacuit sine viribus Infans.

& *Lucretius*:

*Tum porro Puer ut sevis projectus ab undis
Navigat, nudus humi jacet Infans, indigus omni
Vitali auxilio, cum primum in luminis oras
Nixibus ex alvo matris natura profudit.*

Homerus in Iliade:

*Non quidem certè est aliquid miserius homine,
Omnium verò qui spirant & serpunt.*

Difficile enim inquit Idem, omnium Hominum servari genus & proles. Quamobrem si quis alius, certè mellifera illa Medicorum apis, & Neo - Artis Apollinæ Divinum ac plebeium Oraculum

colum *ab Helmont*, de tenera Infantum valetudine est sollicitus, dum enutritionem eorum, non solum ad vitam sanam, sed & ad vitam longam instituendam docet: motus sanè plurimis ac urgentissimis rationibus & motivis; nam etsi mutabilis ista & instabilis vitæ nostræ conditio, utut communis omnibus hominibus, præprimis tamen Infantibus magis propria ac execrabilis esse solet, quatenus sub tenera eorum constitutione, minusque validâ viscerum structurâ, & fermentorum (speciatim istius, quæ primæ cœu fundamentalis inservit digestionis) nondum sufficienter exaltatô vigore, quoscunque tam animi quàm corporis, à parentum semine contractos morbos & defectus, juxta tritum:

*Qui vires in foliis venit à radicibus humor,
Sic Patrum in Natos abeunt cum semine morbi.*

Sed & sub nutritione, vitiô lactis & alimentorum commissos errores, graviter luunt, indeque fecunda miseriarum ac calamitatum semina suscipiunt, quæ per totum subinde vitæ cursum, perniciosos fructus progremiare solent. Talis enim ac tanta malorum strages imminet pueris, ut meritò cum *Plinio* didendum sit; à suppliciis, vitam auspiciari hominem, unam tantum ob culpam, quia natus est: ità revera cum ipse inevitabilis vitæ terminus, Divinitus pariter ac naturaliter præfixus videatur, qui ex radicali vitæ, seminalique ut diximus primordio, secundum causarum naturalem inviolabilem legem quibusdam brevius imminet, ab aliis longius abest, quousque primordiales in semine radicatæ potestates vitales se extendunt: quem terminum amplificare, mediis hætenus quidem cognitis & usitatis impossibile attingere, legitimò tamen causarum effectuumq; regimine, prævenire & anticipare ex inverso earundem usu facile possumus. Ac proinde si ad vitam longam pertingere, non aquareat quibusvis, saltè sanam hanc ipsam pro viribus confer-

vare

vare annitatur, quo annutu, minimis inserviando, à Magno Cœli Archiatro majora speremus & expectemus.

Curam igitur Puerorum suscipientes, tantò diligentiores in eorum morbis nos præstemus, quantò minus certos & difficiles, de suarum affectionum idea reddere nos solent: imò cum Pueris tanquàm mutis ægris (si clamores & lacrymas eorum exceperis) nos rem habere existimemus, ut quoniam ex relatione, quæ tamen in dignoscendis morbis plurimi facienda est, nihil certi, nihilq; pensi habemus, aliis conjecturis, signis & symptomatum observationibus nitamur, alioquin Puerorum salus valde periclitatur: huic difficultati accederet altera, si nimirum Medicorum quispiam absq; nominis atque ætatis, nec non morborum ratione, computu, ac diversitate in eorum curas incidere, quæ tamen ut à Medico in praxi magni ponderis evitetur difficultas, & tenerorum patientum avertatur periculum, ac inde emergens utrinque præcaveatur labes ac dedecus, opere pretium duximus (si quidem laudabilis hætenus consuetudo obtinuit, & dicendi & docendi ratio semper exegit, ut in cujuscunq; operis ingressu, quædam generalia præmittantur, quæ veluti lucem sequenti materiæ præbeant) præprimis nominis, moræ ætatis, & tandem ipsorum morborum discrimen proponere.

Non hic audienda est vana illorum opinio, qui Puerorum curam naturæ tantùm & mulierculis committendam volunt, asserentes: naturam esse morborum medicatricem teste *Hipp.* & pueriles morbos per crisin solvi; imò quod plus est, Medicus in curando tria exigere solet, confidentiam, patientiam, & obedientiam; & hæc omnia in Pueris defunt. Verum enim verò Dux Ratio, & Comes Experientia, aliud distant & ostendunt, necessariam omnino esse Artem Medicam in curandis affectibus Puerorum: concedimus quidem, naturam esse morborum curatricem, juvari tamen à Medico: accedit, quod non omnes morbi per crisin solvantur, addit enim ipse *Hipp.* magna ex parte: Reliqua quia levia sunt, non

non nos tangunt nec angunt. Ut verò hæc omnia tantò utiliora & clariora evadant, necesse erit dilucidare prius, quid per pueros intelligamus.

Notandum ergò, D. Hipp. *Seç. 3. aph. 24. 25. 26. 27.* per ly. Pueros, non factus adhuc in utero existentes intelligere, sed eos hoc ipsissimo nomine indigitare, qui jam sunt in lucem editi, eosque in *quatuor* classes distinguit: in Prima collocat parvos & recenter natos, *Seç. 3. aph. 24.* & hi propriè Infantes dici merentur, in Secunda reponit eos, qui ad dentitionis tempus accesserunt, *Seç. 3. aph. 25.* & hi etiam proprius Infantes dici possunt, quia fari nondum sciunt; in Tertia comprehendit qui jam facti grandiusculi *Seç. 3. aph. 26.* in Quarta iis sedem assignat, qui jam grandiores facti & ad pubertatem aspirant. *Seç. 3. aph. 27.* Galenus, fidissimus Hippocratis Interpres, has memoratas Puerorum classes, majores intelligentiæ causâ, certis annorum limitibus circumscribit: *Primam*, incipit à die natiuitatis, eamque ad Septimum usque mensem extendit. *Secundam* à tempore dentitionis inchoat, & illam ad annum usque quartum protrahit. *Tertiæ* initium facit ab anno quarto eiisque finem imponit annò duodecimò. *Quartam* numerare incipit ab anno duodecimo, & eandem decimo-quarto finit, quo anno ætas Secunda, quæ pubertatis nomine venit, initium capit; liquet ergò per Pueros palàm inaudiri eos, qui duobus primis annorum septenariis, id est in Prima ætate constituti sunt, quæ die natali orditur, & anno ætatis decimo quarto terminatur.

Nota 2dò. Morbos, eorumque causas, quibus Pueri afficiuntur; idem Hipp. *lib. de octimesi. part.* exponit, duplicesque facit; qui vel in utero, vel extra uterum afficiunt: hi rursus ratione sitis sunt duplices: interni qui foris non sunt conspicui, externi qui in corporis superficie cernuntur. Ratione subjecti, sunt universales, qui totum corpus, vel maximam ejus partem

Kk

occu-

occupant; & particulares qui unam duntaxat partem obsident: ratione ætatis, qui recens natos, vel ad dentitionis tempus progressos, vel grandiusculos, vel grandiores, seu pubertati vicini infestant.

Universales externi sunt, variolæ, morbilli, scabies, pruritus, impetigo, macies, maculæ volaticæ. Universales interni sunt febres. Particulares externi, in omnibus propè corporis partibus externis observantur. In Capite: hydrocephalus, syriasis, tinea, crusta lactea, achores, favi, tyriasis. In Oculis: ophthalmia, strabismus &c. In Auribus: otalgia, inflammatio, fluxus, intertrigo, vermes, parotis &c. In Labiis: fissuræ, labia leporina &c. In Naribus: ozœnæ, hæmorrhagiæ, humiditas &c. In Scroto: hernia intestinalis seu enterocele, hernia carnosæ, seu sârcocœle, vel hernia flatulenta seu bubonocœle, vel hernia aquosa seu hydrocœle &c. In Ano: prolapsus, pruritus, clausura &c. In Artubus: paralyfis, convulsio, verrucæ &c.

Particulares interni etiam secundum partes affectas distribuuntur: In Capite: catarrhus, coryza, vigilæ, epilepsia, sternutatio. In Ore: aphtæ, ulcera, uvulæ relaxatio, dentitio, ranula sub lingua, odontalgia, balbuties &c. In Collò: strumæ, scrophulæ, tonsillarum tumor, angina, phlegmone &c. In Corde: terror seu pavor, tremor, palpitatio; In Thorace: tussis, asthma, phthisis, pleuritis, peripnevmonia &c. In Abdomine: vomitus, nausea, singultus, tormina, diarrhæa, dysenteria, tenesmus, constipatio, inflatio, vermes, calculus, dysuria, ischuria, urinæ incontinentia &c.

Ex his alii rursus sunt verè & simpliciter pueriles, ut dentitio; Alii, qui licèt non sint simpliciter & solum pueriles, quia tamen frequentius Pueros quàm alios exercent, ideo à potiori pueriles dicuntur, & sunt lumbrici, variolæ, morbilli.

Hos

Hos igitur & plurimos alios Pueros affligentes affectus eâ , quâ licet brevitate dilucidabimus, & præfixâ prius illorum ideâ & idenditate, causarum efficientium & præcipuè procatharticarum, erutione, curam eorundum non tantum methodicè, sed etiam mechanicè, nè à nasutarum muliercularum (quarum præsentiam in curandis Pueris rarò evitant veri Medici) consuetâ norma recedere videamur, ad nulum proponemus.

CAPUT I.

*De providentia, custodia & cura, aliisque
necessariis circumstantiis observandis, Infantis
recenter in lucem editi.*

EGressò factu, obstetrix secundinam educere mox debet, eâ, quâ potest dexteritate, diutius enim inibi relicta, tanto difficiliorem parit & permittit exitum, eâ verò educâ, Infans expediendus est, & ante omnia ab impuro aëre & à ventis arcendus: duplici igitur filo, quod crassitudine aliqua donatum sit (nè à fili teneritudine præsecetur) vinciendus est pollicis, alii trium vel quatuor digitorum, ab abdomine latitudine umbilicus; vinculum arctius non sit, neque ultra ipsum umbilici pars est, citius quàm par est excidat, nec laxius, ne funestâ hæmorrhagiâ sanguis per vasa umbilicalia diffuat, & aër frigidus intrò in Puerum subeat, nam sæpe contingit, etiamsi prima vice benè ligetur, nihilominus postmodum si umbilicus flaccescat, ligatura relaxatur, adeò ut si non debitè attendatur, sanguis copiosè effluat, non rarò in perditionem Infantis. Nexu, ut decet peractò, refecandus umbilicus novaculâ vel forcipe peracutâ, duobus infra nexum digitis; sectioni imponendus pannus lineus duplex in oleo rosar. aut amygd. dulc. rec. & sine Δ express. maceratus, ad doloris sedationem & accidentium

imminentium præcautionem: alii verò resectio umbilicò cruentò, subtilissimum *Pulverem cretæ*, vel *boli armen.* vel *crocì* *is adstring.* inspergunt & postmodum *butyrum recens*, salem & aquam non expertum, vel prædicta olea imponunt: Alii *pulv. myrrhæ* & *sarcocoll* eidem aspergunt.

Obstetrix Gallica, singularis virtutis esse asserit *farinam arboris nucis jugland. verminosæ* (alii cujuscunque arboris farinam similem recipiunt) quæ aspergatur umbilico Infantis, sic enim egregiè sicatur, & facit usus talium rerum, ut justo tempore, paucis nimirum diebus post, quod infra nexum est, unâ cum vinculo decidat, constrictâ nempe venâ & arteriâ, nutritionis & vitæ beneficio destitutum: postquàm verò decidet, denuò aspergantur prædicta media, & inde firmior reddetur. Sed nota: hanc decidentiam (quæ ordinariè septimâ vel octavâ die fieri assuètur) nullatenus vel ullâ re esse accelerandam, nè ante perfectam consolidationem hæmorrhagia, vel ulcus ægrè sanabile oboriatur. Hoc opus obstetrices vulgò nudo fætûs abdomini Incumbere faciunt, sed malè, nam inde dolorifica tormina infanti accedunt propter frigiditatem ejus actualem, utpote quod calore vitali destitutum sensim emoritur; melius igitur est ipsum linxilo involvere, donec gangrænâ corruptum, deciderit.

Prognosis obstetricem de umbilico Infantum hæc statuitur: Si ea ejus pars quæ ventrem proximè respicit, rugosa vel nodosa conspiciatur, quamlibet rugam vel nodulum, matri portendere Infantem adhuc ex ea pernascendum; nimirum tot Pueros, quot rugæ rubentes; tot Puellas quot rugæ albescentes adfint: quoties verò absque rugis appareat, toties matrem sterilem futuram.

His peractis, *Ol. rosaceo* extergendus à sordibus sæculentis Infans, quæ cuti tenacius adherent: sic enim præterea cutis spiracula coarctantur, & corpusculi habitus magis roboratur;

notum

notum enim est insensibilem transpirationem impeditam, fontem esse etiam morborum infantilium, ut infra de causis morborum in genere, abundè dicetur : hoc verò transpirationis impeditæ vitium, ut emendetur, solent nostrates mulierculæ recens natos Infantes immergere *balneo aq. dulc. tepido* (non verò prout asperimus, & sanæ rationi pariter ac constitutioni saniori reluctans, teste Sennerto, Veterum Germanorum mos fuit, aquæ frigidæ, aut flumini) ut hujus medio abluantur fordes viscosæ, lanuginis instar investientes teneram epidermidem sive cuticulam, & accedentè blandâ frictione itâ aperiantur, & magis paruli reddantur conniventes aliàs cutis pori ac tubuli ; Non ineptum est, quod in more & consuetudine vulgari positum, ut *saponis* adjumento removeatur hæc fordium coadervatio, & hujus alkalina lixiviali acrimoniâ promptius detergantur hæc caseosa quasi concrementa extracutanea, sicque simul hujus alkalini salis beneficio, præcaveantur maturæ cutaneæ Infantum efflorescentiæ.

Nota 1. has efflorescentias seu caseosa concrementa, quædam credulæ mulieres arbitrantur oborta esse, quod gravidæ mulieres casei usui nimis indulserint ; quæ mulierum opinio etiamsi explodi tanquæm anilis debeat, illi tamen ansam præbuit Aristot. lib. 7. cap. 4. *bist. animal.* ubi inquit: *fatum sæpe nasci obductum alimentis, quæ in gravitate mater usurpavit ; in crustatumq; nasci mucos quodam mucido, si octavo mense coitu mulier usa sit.* Verum enim verò, etiam tyronibus certum & notum est, alimenta Matris ad utrum non pervenire, & membranas fatum involventes obflaculo esse, etiamsi uterus hiarer (id quod nunquàm octavo mense accidere Authorum docent exempla) nè semen virile & faminei m ad fatus usque corpus deferantur, atque exinde ejusmodi sordes prodeant ; Soli igitur aquarum limo (intrâ quas natat fatus) has efflorescentias adscribendas judico.

Nota 2. non rarum esse, flavedine quodammodo croceâ, adeoque icteritiâ decoloratione tinctos in lucem prodire Infantes, quæ extraordinaria tinctura vix melius quàm dictis balneis penitus detergi & deleri poterit. Huic ab aliis etiam succurri solet *croci gr. j.* optimè triti in *lacte Nutricis*, vel alio conveniente liquore vel vehiculo exhibiti, & bis vel ter in die propinati, quò dicta cutis defædatio promptis extingui potest. Gallicæ mulieres *aquâ calidâ & vinò adstringente* Infantes abluunt, deinde commemoratò *oleò* oblinunt; alii non simplici *vinò* abluunt, sed in eo *rosas, folia myrthi*, addito pauco *sale* incoquant, & inde lotionem per quinque vel sex dies repetitâ, non modò sordes eluunt, sed si quid in tenello Infantis corpusculo contusum à duro enixu collisumque est, digerunt, & carnibus robur addunt. Nostræ matres familiâs *aquâ simplici* pro ablutione utuntur: ditiores alteram partem *lactis* affundunt, & simili aqua dulci tepida per se, vel lacti mixtâ, quotidie abluunt & moderatè fricant, quæ frictiones, coctiones juvant, & locò exercitii Infantibus sunt; à balneo Infans fasciis linteis involvendus, nè manus & pedes liberè movere, & ossâ quæ adhuc fluxibilia sunt, distorquere possit. Post menses quatuor, manus & brachia solvi & fasciis liberari possunt: thorax autem & venter seu abdomen etiam ultra annum involvendus, ad illum firmandum & tuendum: aliàs quoties expergiscitur Infans, à sordibus excrementorum alvi & urinæ mundandus, nè inde pruritus vel excoriatio contrahatur.

Nota: nec defunt quædam mulieres, quæ prima vice Infantem, ut deinceps ab omni epilepsiæ insultu tutus sit, tali *Decoctione* abluunt. *℞. Herb. beton: Mj. rad. pæon. ʒß. castor. ʒij. coq. in mensura j. vini, colatura addatur aque lavacro dicatæ*, quæ balneatio omni die, quousque virium permittat ratio & mundus videatur, idque primâ septimanâ quotidie, ut dixi, reliquis, secundâ vel tertiâ die, reiteranda. A balneatione Infans

fans lactatur. Interea singuli manûs pedumque digiti tractandi & leniter explicandi, crurum & brachiorum articuli modeste extendendi & contrahendi, pluribus diebus pluries, ut, quod humoris excrementitii in articulis & membris, id est, capite, palpebris, auribus, naribus, inguinibus, podice, vulvâ, scroto, pene & aliis meatibus & orificiis, ore, faucibus, lingua oculis, (qui NB. linteo sicco solummodò abstergeri sunt, nequaquam aquâ & vino mixta, nè ab acrimonia dolor excitetur) residet, id motu concalescens & agitatum resolvatur.

His omnibus factis, constitutio Infantis inquirenda: unde 1^{ma}. Si mater & pater probatæ sanitatis sint, de Infante bene sperandum. 2^{da}. Si color Infantis neo-nati est subruber per totum corpus, qui postmodum sensim in floridum mutatur, optimum est signum: secus qui vix editus est Infans floridus & albidus, ii exiguo temperamento & vivacitate sunt præditi: 3^{ta}. Bonum est, si Infans vagitum edat clamorose & clarum, robur denotat & partium debitam conformationem: è contrâ, si submisè plorat. 4^{ta}. Bonum est, si omnium partium constitutio, magnitudo, numerus, figura, meatus, situs, connexio, se bene habeat: è contrâ malum, si hæc non ita sint, unde in hoc casu obstetrix hæc vitia examinet, & vel ipsâ dexteritate juvet, vel peritum Medicum in auxilium vocet. 5^{ta}. Bonum est, si omnes Infantis partes, nullâ luxatione vel rupturâ laborent, nasus ritè sit formatus, frenum linguæ liberum, tumor in capite ex contusione partûs non adsit, cranii ossa sint bene composita, via urinæ & alvi pateat.

Statim, ac ab obstetrice elotus fuerit Infans, & observatæ cunctæ illius partes fuerint, ut suprâ monuimus, tunc (ut rem adhuc clariùs tyronibus Medicinæ, ac juvenculis sæminis, hoc in casu minimè adhuc practicis, magis fundatè proponam) fasciis & linteis ipsum sequenti modo ac ordine involvere debet, initiò ductò à capite, cui levis ex linteo calantica imponi debet,

super

superimpositò pileò lineò admodò prius fontanellæ , linteò molli triplicatò, vel quadruplicatò, quatuor digistos latò, quod nè hinc indè declinet, per aciculam calanticæ adnecti debet, ab externa parte affixam, nè Infantem compungat; usui est illud linteolum, tam in præservando à frigore, quàm ab aliis injuriis Infantis ecrebrum, quod hoc in loco, ossè nondum contactum est. Aurium ambitum munit linteolis, absorbendarum sordium causà ibi congeri solitarum, quò factò iterum aliis linteis pectus munit, admovendo præterea alia axillis & inguinibus mollia & calida, antequàm fascias superinducat. Et quamvis involutionis hujus modus afferendus non foret, omnibus quippe notissima mulierculis, id solùm tamen in genere pro neo-practicis & primiparis faminis monendum: non nimis arctè linteis stringendum esse Infantem, præsertim ad regionem pectoris & ventriculi, tum ut respiratio ipsi sit facilis, tum ad præcavendum, nè præ nimia compressione impellatur ad vomitum lactis exsucti, impedità nimirum liberâ ventriculi dilatione ad id concipiendum, unde nonnunquam malum in habitum transit temporis decursu, non levi Infantis damno, quæ cautio non levis est momenti.

Brachia & crura obvolvi debent linteis substratis directè posita, quæ demum obvolvenda, ut in illo situ contineantur; brachia videlicet juxta corporis truncum, femora autem sibi proxima, particulâ linteî interpositâ, nè à contactu & attritu mutuo, incalrescant. His peractis caput firmandum erit, nè muter imposito linteò, quod vulgò vocant capitellum, quod hinc inde linteis obvolvuntibus adnecti debet, superadditis velaminibus ad calorem conciliandum. Prædictâ ergò hac ratione debet involvi fasciis, ut corpusculo figura erectâ & decora concilietur homini omnium convenientissima; ut & sensim inducatur consuetudo pedibus insistendi, alias futurum fortè ut quadrupedum more incessurus esset.

Siqui-

Siquidem verò cæterorum animalium corpora expedita sunt, nullis involucris præpedita, facilè excrementa deponunt, à quibus neque inquinantur neque oblāduntur, quæ statim ac alvo ejecta sunt, Mater extra nidum vel cubile projicit, (si id ex se juvenenes nequeant) aut certo in loco congerit, ubi nocere nequeant. Verùm Infantum eadem non est ratio, qui fasciis & linteis involuti & constricti (ad conciliandam rectam ut diximus figuram) excrementa ejicere nequeunt, quin universum corpus illis inquinetur, quibus immerfi sæpe latent (quod evacuari & deprehendi nequeant propter involucria) donec fædus odor nares Nutricis feriat, vel advertat ex Infantis ejulatribus tali proluvie & acrimoniâ laceßiri: propterea fasciæ solvendæ sunt, bis aut ter saltèm de die; imò etiam noctu si res exigat, munda lintea fordidis permutando, quæ tamen sint bene lota etiam lixivio, cum simplici elotioni sæpe vix talis impuritas cedat, & postmodum corpusculum tenerum magis inficit. Tempus ergò maximè idoneum solutioni fasciarum & linteaminum toties erit, quoties alvi & vesicæ onus deponitur, dummodò non dormiat, idq; tamen mox ac expergiscitur, præstandum: hæ autem exsolutiones & involutions fiat juxta ignem vel fornacem linteaminibus calefactis & siccis, nè frigus vel humiditas gravia accidentia producant.

Tenellos Infantes sub formatione & nutritione in utero excrementum colligere, vulgò mæconium dictum, nemo dubitat, idque in tenellis intestinis reconditum habere; hoc originem ducit à nutritione imprimis per os, quam ultimis accipit diebus, & cum diutius quam par est, detineatur, magis accescit, & nigrum, & ex viridi nigrescens efficitur, hinc existit author plurium atrocium malorum, unde Etmüllerus dicit; *Mæconium nihil aliud est, quàm crudior caseus à reliqua nutritiva substantia sequestratus, qui postmodum bili in intestinis junctus, ex nigro viridescentem colorem acquirit, hinc Solon inquit, homo*

LI

est

est putredo in exortu, bulla in omni vita, esca vermium in morte; ob quam causam Medici ministri naturæ, antequam pulicula, vel lac præbeatur Infantulo deglutiendum, aut ejus ori ubera nutricis admoveantur, optimum & utilissimum judicant, cochleare unum *ol. amygd. dulc. rec. Et sine Δ expressi* degludiendum propinare, non modò ad alvum lubricandam, & impuritates quasdam, ipsumque mœconium deturbandum, sed quoque ad faucium & trachæ arteriæ gulæque asperitates leniendas, diluendamque viscositatem & materiam quasi piccam, quæ epilepsiam, tussim, imò & dyspnœam & alia molesta accidentia Infantibus plerumque inferre solent; utut verò sit, hoc tam mulierculis quàm Medicis familiare remedium, meo tamen judicio soli huic oleo non semper esse fidendum, cum vel rancescendò facillimè Infanti propinatum non leve incommodum in primis viis inferat, vel licet non rancidum, vix tamen omnia tam exactè eliminet, quin subinde aliquid sordium nocivarum remaneat.

Hinc alii faciliori sanè successu in usu habent, *mel rosatum simpl. vel solutivum* (quod melius) tantillum propinando. Doctissimus Etmüllerus felici usu compertum habuit sequens: si *pulpa passularum min.* cum æquali parte *Syr. de cichor. cum rhab. mixt.* addito pauxillo *pulv. corall. rubr. ppt. & ocul. 69. aa.* horum \mathfrak{zj} . vel $\mathfrak{z\beta}$. ad illorum $\mathfrak{z\beta}$. addendo, cum parvo cochleari leniter infundatur; & sic optatè rejiciuntur omnia excrementa tam per inferiora, quàm interdum per superiora, & vitiosa mœconii aliarumque sordium accescencia, futuro lactis succui perquam nociva, optimè simul & rejiciuntur & coëreentur. Doctissimus Heurnius in *meth. ad prax.* usu comperi, *inquit*, à seminis anisi \mathfrak{zj} . crassè comminuto jam recens natos puerulos commotissimè à viridi materiâ seu mœconio purgari, cum pulvrem saccharatam sumunt, primo cochleari indicur, ac illis exhibetur, clamorosos quoque ventris dolores sedat. Alij optima ratione

ratione ducti, *ol. amygd. rec.* ad præcavendam rancescentiam *pulverem sacchari Penidii*, ea quantitate jungunt, quâ puliculam æmulantur, de qua cum digito Infantulis semicochleare indunt; quia verò & saccharum absconditum in se continet acidum, non omni ex parte & tempore tutum hoc videtur esse remedium. In Galliis & Italia, os puerulorum interius *melle*; addito momentulo *theriacæ* leniter fricari, & ita agi, ut inde aliquid deglutiant; sic enim multa ab ore prolicitur viscosa & excrementitia humiditas, cui si aliàs lac suctum admisceatur, facile corrumpitur, à quibus simul corruptis, elati ad cerebrum vapores perniciofa pueris inferunt symptomata.

Nonnulli ad torminum materias (sive mœconium sive cujuscunque generis sint) maturè evacuandas, non tantum jam dicta exhibent sed & *ol. amygd. dulc.* cum *manna* mixt. vel idem *ol.* cum *cassia*. Alii *Syr. laxat.* è *rosis pallid.* vel *Syr. flor. persic.* vel *Syr. d. cichor. cum rhab.* qui summè laudatur; vel *Syr. de spina, Cerv.* cum *melle* mixtum, additis *ocul. cancr.* quod remedium etiam acorem & congrumescenciam futuro lacti tenello nocivam impedit, de quo remedio Etmüllerus inquit: vix unquam fallere, & esse laxans Infantum convenientissimum. Alii *pulv. March.* cum *Specif. Cephal. Michaël*: pro acido absorbendo & præcipitando porrigunt. Burgeois seu obstetrix Gallica, recens natis propinat unum parvum cochleare *vini*, nam spiritus Infantis recreat, & reficit, pituitam in faucibus discutit, facitque ut postea non faciliè inebrietur, & ab epilepsia præservat. Grülingius, *stercus de vacca nigra* (est Principis cujusdam secretum) adhuc calidum indatur ollæ & calcinetur, datur ʒß. vel ʒj. ad ʒß. Infanti recens nato, sic tandem evomet pituitæ copiam in utero collectam quæ est causa multorum malorum. Kunrad, primis duodecim septimanis quotidie Infantis totum corpus, *succo absynthii expresso* illinatur, & fricetur, & præservabitur per totam vitam ab omni frigore, calore, lepra, scabie, fursu-

ribus & pediculis. Hæc & similia plura toties & tam diù danda, quousque Infans à prædicto mœconio sufficienter repurgatus videatur, quod in quibusdam una, in aliis duabus, quandoque etiam tribus diebus fieri solet.

His itaque ritè observatis, tutò deinceps Infans mammis admoveri poterit, cui optimè consulēs, si lac illi sapius è papilla in os exprimas, ut sic sensim assvescant lacti fibræ ventriculi attrahendo. Optandum quidem esset ut lac etiam proprium seu maternum exhiberetur post elapsum omnimodè peccantis materiæ & concrementorū tempus, quod sapientiores Medici primo ostiduo integro à partu exhibendum suadent (imò si securitati studeremus, amplius intervallum requireretur, trium nempe aut quatuor septimanarum) ut sedatâ omnium humorum in matris corpore agitatione à partu inducâ, nec non omnibus impuritatibus eductis beneficio lochiorum, lac eò purius evadat; accedit, quòd papillarum foramina nondum sufficienter reserata sint, mammae pariter primis diebus Infanti sugenti vix cedant, imò opus sæpe sit permittere depleri mammæ ab aliquo valide fugente puello, vel fæminâ, vel in defectu horum ipsa mater instrumento vitreo, vulgò, Vitro suctorio, Germ. Saug = Glas / ad id concinnato id ipsum præstet, quousque lac fluidius factum & effectum, & absque ullo impedimento exsugì possit: & licèt quidem (ut multi doctiores existimant Medici) lac noviter factæ magis congruum esse, quàm si purius foret, ac conferre lubrificando ventri, & expurgando intestinorum mœconio, verùm enim verò credo ego tormina ventris induc̃ta ab ejusmodi fæculento lacte majoris esse ponderis, quàm utilitas emergens ab illius potu, quare satius existimo abstinere Infantem à tali lacte (dummodo fieri possit) quousque correctum & aliquàlter saltèm in melius dispositum sit, quod intra paucas dies, ut diximus fieri potest.

Hic

Hic obiter notandum : quòd si Infans vel ob ignaviam , ut mox diximus, vel debilitatem , vel aliam causam ubera sugere recuset, impellendus est , si nimirum nutrix lac in os Infantis instillaverit, quo labia ejus dulcedine afficiantur, postea stillantem adhuc mamillam præbeat , quam manu tantillum comprimat, posteaquàm papilla ori indita fuerit, quo fiet , ut lac facilius influat, & Infans adhuc debilis facilius quoq; trahat & sugat, donec sugere sufficienter assvescat.

Postquàm Infans lac sufficienter hauserit, quieti & somno se tradat nutrix , non tamen in eodem cubili seu lecto, nè per inadvertentiam (ut sæpius in praxi lamentabiliter observavi) inter dormiendum Infantem suffocet, illi superincumbendo , sed in cunis deponet lecto proximis, quibus imponendus arculus velamento quopiam aperiendus, tùm ad impediendum nè quid fordium in faciem incidat, tùm ad præpediendum nimium luminis appulsus. Dorso incumbere debet Infans, ità tamen ut caput sit paulò elatius substrato pulvinari. Ad somni autem provocationem faciliorem cunas leviter agitabit nutrix, motuque æquali, evitatà vehementiori agitatione, nè impediatur lactis in ventriculo concoctio, inductà illius fluctuatione, & sic quoque concitato vomitu. Sed nè nimis etiam assvescat Infans, cavendum nè cunæ nimis crebrò moveantur, & ut somnus spontè obrepât, citra illud adminiculum procuretur : nullum quoque determinatum tempus esse debet ad quietem, nam è re est , ut dormiat quavis diei vel noctis horâ, quoties in somnum propendebit, ac ut plurimum quò probrior illi est valetudo, eò magis somno indulget: si tamen somnus mediocritatis leges excedere videatur, tantisper moderandus erit, quapropter nutrix ulnis arreptû ad lucem deferat, canendo & voce amœna exhilarando, oculis quidpiam lucidi objiciendo, quod oculos oblectet, & sic somnum excutiat: à nimio enim somno calor na-

curalis ad interiora adeò vergit, ut quasi sepultus jaceat, quo fit ut totum corpus, ac præsertim cerebrum inundetur, sensus hebescant, functiones langueant, & non ritè perficiantur.

Præterea benè observandum, ut Infans in cunas positus, eò modò jaceat, ut è directo oppositum habeat ignem aut candellam, vel lumen cubiculum subiens: à lateribus enim si sapius adveniat, strabismus faciliè accidit, quare optimum est si cunarum arcus superinjectum habeat velamen lumini objectum: hoc enim pacto visus, neque hac neque illac decurrans, validior futurus est.

Puello lac è mamma præbetur primis post partum mensibus, omnibus quasi bihoriis, post tres vel quatuor menses sexies, postmodum bis vel ter de die. Hoc lactis potu alitus per anni unius curriculum, vel ultra (uti quidam biennio, imò triennio) ultimis diebus assuefieri debet potui usitato, donec à lactis usu removeretur, & sic ablactatur. Tempore lactationis quoque pult^{is} ex farina ut plurimum triticea ex lacte vel aqua parata, quam salivâ humectatam, bis terve in die nutrices exhibent, nutriuntur, de quibus autem omnibus plura infrà suò locò.

Hic tamen obiter & benè nota, quod si ipsa Mater sit nutrix, tunc tot & tantis remediis pro mæconio expurgando opus non est, sed solum colostrum matris propinatum, pro hac intentione omnia alia antecedit; est enim alimentum (teste Spigelio & multis Recentioribus) medicamentosum, quod natura eum in finem generavit, ut modicè nutriendo leviter pro Infantis imbecillitate purget per aliquot dies: Nota 2dò tenello neo-edito Infantulo, etiamsi sanissima mater sit, ipsius lac probè excoctum, crassius, spissius, adeoque uberioris nutrimenti, non æquè primo statim haustu convenire, idque ex eo fit manifestissimum, quod in utero materno adhuc conclusus

factus

factus nutrimentum lacteum (ut dictum) per os hauriat admodum subtile, perque duplicem chorii & amnii membranam probe filtratum & depuratum, quò teneriora facilius perluat abdominis viscera: ob id provida mater natura, post partum in salutem editi factus, non statim lac perfectum, pinguius & spissius subministrat, sed præmittit colostrum, hoc est serosiorum, tenuioremque in mammas chylum, ut hic ipse minus stomacho facessat negotii, quin potius serositate salina, abstergat blandè stomachi mucum, intestinorumque suggestionem collecta excrementa repurget, ac virtute diurética, organa urinaria probè eluat, ut ità supervenienti successivè magis alimentoso lacti, facilitetur digestio, & impediatur facillima ejus corruptio, cum reverà, ut mox diximus, tale colostrum sit alimentum medicamentosum: hinc istud quod prima die scaturit ad mammas, potentius quargat, quod secundà & tertià minus, donec succedat vi purgatrici vis nutritrix: quod si verò per prædictum colostrum non succedat debita expurgatio, studiosè ergo incumbendum erit, ut mœconium & cæteræ sordes, suprà dictis fufius remediis evacuentur.

CAPUT II.

*De Lacte & potu Infantis, ejusque vitiis & cura, Nutritisque electione, & ejus
dieta.*

PAlam & in confesso est, inter omnia lac ad alendum Infantem esse saluberrimum, & ejus naturæ accommodatissimum, præsertim maternum, utpote ad quod in utero ipso jam dudum est assivefactus. Suppono enim *Primò* factum in utero materno, non solum nutriri per umbilicum, sed etiam per os, ut
fufius

fufius Courvee & Harvæus. Suppono *Secundò* nutrimentum utrobique non effe fanguinem, fed lac, feu lacteum chylum cum fanguine per arterias (aliæ enim adhuc non funt repertæ viz, factâ in vaccis anatomicâ inquisitione) ad uterum delatum. Suppono *Tertiò* lac mammarum & ipfum, revera effe chylum in mammarum glandulis fecretum, & duëtibus particularibus exinde ad papillam delatum. Suppono *Quartò* unicuique mulieri fuum proprium effe lac, feu fpecialis lactis proprietas, & ideo fyncrafia (imò lac diverfum in una mamma quàm fit in altera obfervatum eft) oriunda ex fpeciali fermenti digeftivi ftomachalis differentia, fecundùm quod, ficut in unoquoque individuo tam naturaliter quàm præter naturam conftituto, diftinëtus eft appetitus, ita etiam diftinëta eft digeftionis ratio, licet eorundem affumptorum. Diverfum ergò lac mammarium nutricis, à lacte uterino matris in ftomacho infantuli, ipfi aliàs non affvæci, non poteft non fubire corruptionem, & lædere infigniter primam digeftionem, mox diftributionem, & tandem nutritionem. Manet ergò firmum in curfu ordinario, lac maternum feu Matris fanæ effe optimum: ficut enim plantæ in eo fole, in quo natæ funt, facilius crefcunt, ita etiam proles à matre nutrice facilius evadunt: fi verò matri lac deficiat, aut corrumpatur, aut ægra fit, aut malis moribus dotata exiftat, neceffitate urgente nutrix eligenda eft.

Primis aliquot menfibus fi copîa adfit, fatius eft fi fole lacte contendatur, idque de die & nocte toties, quoties poftulat, modò non vomitu, vel alvi fluxu laboret, & ventriculus inde patiatur: præfertim primis diebus ubi nondum affvæcus eft. In lactando Infante hoc obfervetur, ut ei nunc una nunc altera mamma præbeatur, præfertim fi Infans manus liberas habeat, nè uni affvæfactus mancus fiat, & ut alterutrius mammæ corruptio lactis impediatur. Vinum & faccharata, quia acidum in finu gerunt, nulli conducunt Infanti pro ordinario potu. Quòd

Quòd autem non cunctis Infantibus lac conveniat, matrum, & dispositionis lactis culpa est, quòd sæpe corruptum, acescens, & consequenter nocivum observatur.

Nota: quòd licet varia instituantur lactis examina, ejusque bonitatis scrutinia, fallunt tamen Practici, quòd præcisè ex consistentia, colore, sapore, odore, pinguedine &c. lac judicare velint; cùm insensilia ut plurimum sint vitia, quæ lactis miscelam corrumunt, id quòd patet dum non tantum semina morbosa per lac transplantentur, sed enim in specie vitia moralia per lac ipsum insensibiliter communicentur, adeò ut revera lactis conditiones, & vires, potius metiendæ sint ex sanitate Nutricis, vita, ejusque cibis. Hinc neque etiam lac nimis excoctum, crassius & pinguius semper est optimum, teste Hoffmanno: sed illud lac (saltè quoad sensum, rationem & experientiam, communique Medicorum consensu) est optimum, quòd eos sicut vinum habet, id est; colore candidissimum, sapore dulcissimum, odore suave & jucundum, consistentiâ mediocri. Contrà verò vitiosum æstimandum est, si degeneret in aciditatem & grumositates, colore flavum, vel lividum, subnigrum, cæruleum, tenue, acre, falsum, amarescens & acescens, tale enim ventriculorum tenellis fibris munitum facilè lædit, & multos morbos inducit. Ut autem cognoscas lac esse bonæ consistentiæ, illud patinæ, ungui, vel speculo instilla; si subsistat & nec statim defluat, nec reclinatum in motum hæreat, est bonum: vel pilus lacti immergatur, si æqualiter pilo adhæret est bonum, si planè defluit est tenue. Quomodo autem lac vitiosum corrigi possit dicetur proprio Capite. Infantem per annum, ad summum per biennium lactasse vulgò sufficit.

Nutricibus vel Matribus non adhibendi sunt Infantes, si mater vel nutrix denuò concepit, sed ablaſtandi potius & ad solidiora alimenta assuefaciendi. Si mater Infantem nutrire nequit, eligenda est nutrix, si verò mater perfecta vel mediocri

Mm

fani-

sanitate fruitur, melius est, Matrem ipsam proprium Infantem lactare & nutrire. Nam *consueta longo tempore, etsi deteriora, insuetis, minus molesta esse solent.* Hipp. 2. aph. 50. tacendo rationes partim jam dictas, partim adhuc dicendas. Nutrix autem debet esse habitus inculpati, & sana, ætatis mediocris, id est ab Anno 20. ad 30. floridi coloris, qui color optimi temperamentum signum est, moribus honesta, & ab omni voracitate & ebrietate aliena: cum enim Nutrices asciticiæ, sint ut plurimum pauperculæ, & quibuscunque eduliis latranti stomacho respondeant, vix fieri potest, quin & cacochyliâ, & inde oriundâ cacochymiâ laborent, quæ morbosæ proprietates postmodum Infanti per lac communicantur. Nutrix ad minimum bis pepererit, & potius filios quàm filias, eosque feliciter educaverit; nullosque sit passâ abortus, cum Matris propriæ constitutione corporis conveniat, nisi forsitan Mater & Infans non sint bonæ constitutionis, ut eam corrigere & meliorem eligere oporteat: præterea non sit lusea, nè Infans eidem vitio alliveat, sitque bono animo, pacifica, non iracunda, non melancholica, non salax, sicut enim morbosæ dispositiones, (ut mox diximus) per lac communicantur, ita etiam non minus vitia moralia; de quibus conqueritur Helmont. fol. 523. & Gal. mores (inquit) *sequuntur temperamentum corporis.* Sic observantur Infantes bibuli, iracundi, à Nutrice bibula, cholERICA, enutriti. Lac non habeat nimis recens, id est, infra duos menses, nec nimis vetus, id est, non ultra decimum mensem à partu absit. Mammæ habeat mediocres, benè formatas, non laxas, non pendulas, papillas elegantes, & quas Infans in sugendo benè apprehendere possit, & licet etiam sanissima sit Mater, vel Nutrix, tamen renello Infantulo ipsum lac vetus, nimis excoctum, crassius, spissius, adeoque uberioris etiam nutrimenti (præsertim statim pro haustu ut supra diximus) non convenire, & hoc ipsum præter dicta eò manifestius sit, quod in utero materno adhuc

adhuc conclusus fœtus, nutrimentum lacteum per os hauriat, admodum subtile, perque duplicem amnii & chorii membranam probè filtratum & depuratum, quò teneriora facilius perfluat abdominis viscera: ob id provida mater Natura, post partum in salutem editi fœtus, non statim lac perfectum, pinguius & spissius subministrat, sed præmittit colostrum, id est, serosiorum & tenuiorem chylum, ut is ipse minus stomacho facessat negotium, quin potius serositate salina abstergat blandè stomachi mucum, & sub gestatione collecta recrementa intestinorum expurger, ac virtute diuretica, organa urinaria probè eluat, ut ità supervenienti successivè alimentoso magis lacti, faciliter digestio, & impediatur facillima ejus corruptio; cum reverà tale colostrum sit alimentum medicamentosum, Hinc illud, quod die primo decurrit ad mammas, potentius purgat, quod secundo & tertio die minus, donec purgatrici, vix nutrix succedat. Quàm malè ergò suis consulunt Natis, qui robustis, aut obes, aut qui jam diutius lactarunt, Nutricibus, mox Tenellos tradunt, à quarum lacte butyroso & caseoso, nimis gravatur tenellus stomachus, & digestionis opus inde insigniter retardatur, & acidæ cruditati lactisque coagulo promptissima occasio subministratur. Cujus rei exempla, insulcus epileptici frequentes & lethales contestantur.

Quod si ergò Matres nutrirè intendant suos Fœtus, quò quæso consilio corrigunt naturæ prudentissimos conatus, & tam studiosè emulgent salutare hoc colostrum, quasi nocere possit Infanti, quod instar Divinæ Medicinæ ipsi propinatum foret? de hoc vide Vesling. in *observ. & epist.* 28. pag. 123. & Spigel. *de formatione fœtus cap.* 13. pag. 16. Sed tolerabile adhuc, quia facile corrigibile, esset hoc erratum, nisi aliud longè gravior, licet familiarissimum se offerret, nempe superflua & inordinata, & utinam! non coacta lactis infusio, qua Matres, Pueros suos nimis alendo, sæpe necant, & dum lactant, maectant, teste Ger-

tring. *Spicilegio Anat. obser.* v. 40. dum nimirum ad quemlibet ex quacunque causa excitatum Infantis ejulatum, ipsi, renuenti licet, subinde de papillis in os trudent, & lac sugere cogunt, priori licet crudo adhuc, subacido & nondum concocto in stomacho hærente, unde novi superingesti necessaria congrumescencia, caseatio, ac utriusque in pastam acidam & viscidam corruptio succedit; unde pylorus indignatus, vel se pertinaciter stringit, qui alias de se ipso in Pueris arcto munitur sigillo, & planè non, vel difficulter saltèm talia caseata & grumosa transmittit, ut ulteriori mora in loco isto tepido in deterius, ac ex cruditate acida in corruptelam putredinosam labantur, inque liquamina putrida, flavescentia, viridescentia, nitrosa &c. tandem degenerent; vel graviore furore percitus idem pylorus, salutari licet effectu, per gulam seu vomitum omnia ista vitiata remittit.

Præstat sanè hic peccare in defectu, quàm in excessu, cum repletiones ad extremum perductæ, graves esse solent. Teste Hip. I. aph. 4. & sicut omnis repletio, in specie panis in adultis, ita sanè lactis in tenellis est pessima, hinc consequenter impura corpora, quò plus nutrieris, plus læseris. Hip. 2. aph. 10. hoc ipsum periculosum fatum misellos lactantes urget, ex perversa & sæpissimè inordinata lactantium diætâ, alimentorum nimirum promiscua ingluvie, affectuum neglecta restrainatione, & excernendorum pariter ac retentorum peccato: quæ omnia cap. de caus. morb. Infant. in genere, clarè & abundè deduximus, ibidemque legi & relegi possunt. Redeamus hic iterum ad propositum de constitutione Nutricis, nimirum quod mammas concernit, eas habeat mediocres, bene formatas, non laxas, non pendulas, papillas elegantes, & quas Infans in sugendo bene apprehendere possit.

Maturè ergò, factus in hanc lucem editus, tradatur tali Nutrici; videmus etenim, quòd plurimæ Matres cacochymicæ & scorbuticæ, citrà vitæ periculum suos Infantes lactare non possunt.

sint, unde si illos conservare velint, Nutrici tradere debent, & si hoc negligunt, vel ob sumptus impendendos, vel ob mariti severitatem, tunc Infantes plorando, supervenientibus tormentibus ac epilepticis insultibus ad Patres abeunt.

Hinc si Mater vel Nutrix calculosa, lue venerea, epilepsia &c. affecta est, tales & similes affectus per lac communicari facile Infantibus, quis dubitat, adeat & consulat Authorem volumina, & inibi observationes exstantes, sed proh dolor deplorandas. Illico ergo Fetus à mammis Matris & Nutricis valetudinariæ abigatur, & alii tradatur, quo temporato lacte opprimuntur facile omnia morbosæ semina (quæ alias in lacte & ad coagulum apto, vel sale scorbutico imprægnato reperiuntur) & corriguntur sanguinis dyscrasiæ, & constans & firma sanitas oritur,

Quas parvuli etiam sæpius pœnas luunt, à Nutricum & Matrum mala diæta, quam nec in quantitate, nec qualitate, neq; in modo, more & tempore observant, tristitia docent exempla; caveant ergo Nutrices & Matres à purgantibus & acidis, quæ Infantum tenellas fibras stomachi, valde vellicant, & convellunt, & multa mala inferunt: nocent quoq; iis aromata, vinum & alia spirituosæ potulenta, in se enim habent acidum occultum, authorem multorum malorum: vitent porro omnem aërem inclementem, nimias vigilias, orium, & somnum longiore: studeant munditiei, & sordes in corpore & vestibus præcaveant: si somnus nocturnus non sit quietus & sufficiens, illum de die suppleant, & quidem matutino tempore, nec desistant à laboribus mediocribus; à venere, toto lactationis tempore angustæ pejus abstineant, cum coitus lac corrumpat, & malas qualitates imprimat; imò si concipiat, Infanti, qui alicui, multum obest, partim ob lactis & alimentii defectum, partim etiam ob dictam pravam qualitatem; accedit etiam quod coitus menstrua provoker, & lac per consequens imminuat. Cibi sint euchymi & eupepti, id est, boni succi & facilis digestionis, bonæ & substantiosæ carnes, hædinæ, vitulinæ, pulli, capones &c. Si Nutrices sint rusticæ & plebæ,

cibi non sint delicatiores, aliàs ipsis sunt peiores, & in eorum stomacho corrumpuntur, quia non sunt assuetæ ejusmodi deliciis, hinc in cibi fastidium & febres ac in similia accidentia incidunt: caseum non comedant ex quo lac grumescit in mammis; nimis salsa, legumina & pisces &c. evitent, in quibus faber latet epilepsia; abstineant à cerevisia non probè cocta & fermentata, quæ fermentum ventriculi inficit, & mala procurat; omnia quoq; graviora animi pathemata fugiant, quæ spiritus animales, genus nervosum, & his mediantibus massam sanguineam, & reliqua corporis contenta liquida commovendo, maximè alterant, hacque ratione lac corrumpunt: imprimis verò terrorem & iram, ideò à domesticis nulla detur occasio; terror enim ex spirituum animalium impetu, lactis coagulum producit, ut patet in exemplo Etmülleri, cum casu graviter terrefierit puerpera, & repensè ad se rediisset animus, catellum mammas exluggere permittit, nè alteratum lac fœtui noceret, quò factò, catellus, brevi post epilepsia correptus, qui adhibita theriacâ convaluit. Sic etiam ira nocet, quæ ideò parva epilepsia dici meretur; terror enim & ira turbant digestionis primum opus, & iræ furor facit sanguinem ebullire, & excitat effervescentiam febrilem cum bilis orgasmo. Quoad excreta & retenta, omnia legitimo modo se habeant, id est, alvus nec laxa sit, nec adstricta. Si verò propter victum liberaliorem, voracitatem, aut alia de causa, materia peccans in Nutrice collecta sit, levi aliquo pharmaco nutrix evacuanda, quæ eo die, aut maxima diei parte, à lactatione abstineat, nisi eadem operâ forsan Infans purgandus sit.

Menses in lactantibus ac gravidis sint suppressi, quoties enim mensium contingit excretio, toties advertitur in tenellis alteratio, quâ languidi, lacrymabundi & debiles fiunt, donec sedato hoc fluxu dicti languores remittant. Insignis etiam lacti imprimitur alteratio, ut suprà dictum, per facundum coitum, inde lac corruptum generatur, & horridam acquirit impressionem, quod

ab Infante postea suctum, degenerat in ejus ventriculo in vitiosum casei coagulum, Tenello funestum, adeò ut exinde eidem stigma per totam vitam imprimatur, inde casei aversionem, tam multis solennem deducit Etmüllerus & Alii.

Notandum pro coronide: cum hætenus de lacte tanquam potu & alimento homogeneo Infantis abundè egerimus, restat nunc occasione hujus exuclendus nodus Gordius; *an acceptanda & approbanda sit illorum sententia, qui consideratione facta facili corrupti-
onis lactis in Infantibus, indeque natorum variorum malorum, aliò
potius nutrimento quàm lacte tenellos cibare & educare malunt?*
Resp. Hanc sententiam & opinionem ex hætenus deductis & adhuc deducendis, à veritate, ratione, & autopsia alienam: licet enim hordeata vel crepatura hordei, additò vitellò ovi, vel juscula avenacea, vel amygdalata, vel nutrimentum Helmontii, ex pane modico cum tenui cerevisia bullitò cum melle, & similia substituantur; his non obstantibus dico, nec frustra, nec sine pragnanti ratione, mammæ mulieribus, & in iis mox post partum lac, non secus ac reliquis brutis sylvestribus & terrestribus; uti & quibusdam aquaticibus concessum fuit à natura, quin hæc ipsa potius intentò quasi digressò hanc fatuum nutritionem monstraverit, hinc aves mammis carentes earum defectu grana deglutita, & in ingluvie aliquali morâ macerata, ac ita ad fundendum citius lacteum suum nutrimentum prædisposita, evomunt denuò pro meliori pullorum sustentatione; tenerior autem certè est Infantum stomachus, minusque exaltatum fermentum eorum digestivum; unde quæcunque ferè ingesta laboriosam, si non & defectuosam penitus redderent digestionem, quæ facillima & summè nutritiva erit, dum lac seu ebylus in Nutrice jam antè elaboratus ipsi suggeritur. Talis scilicet succus ex quo & primitus machina eorum corporea constructa fuit, & ipse Fetus jam in utero matris sustentatus, & quem

& quem tanquàm jam assuetum facillimè digerere & concoquere potest ; quod si tamen quædam ex lactis alteratione in Infantibus metuenda forent pericula , ea sanè in se sunt faciliè corrigibilia , modò maturè & legitimè iisdem occurratur : accedit quòd rarissima eorum observata fuerint exempla , qui defectu Nutricum feliciter adoleverint.

CAPUT III.

De Pulticula & cibis Infantum , eorumque vitiis & cura.

Nostræ mulierculæ statim primis mensibus , imò diebus , parant pulmentum ex *farina* , *lacte* , & adjecto quandoque *saccharo* , inferunt ori Infantis , quod pulmentum gluten viscosum & bibliopegis pro glutinandis chartis magis aptum , quàm Infantis nutrimentum appello , loco enim hujus nutrimenti renellorum stomachus aggravatur , pappâ tenaci , crudâ ac viscidâ , unde non potest non fieri , quin prima digestio vitietur , & consequenter etiam secunda & tertia. Inde periculosissimam pylor à tali pappâ notat obstructionem Hildanus , & plures cachexias & obstructions ; panis non ritè fermentati & cocti esu , tali pappæ non multum dissimili in adultis observamus : ast robustus est adutorum ex spirituosiori & acriori fermento stomachus , debilis è contrâ infantilis :ingere tale pulmentum glutinosum & viscidum , & superaffunde lac , butyro & caseo pingui turgidum , quid putas futurum indè in stomacho infantili ? tenax nempe viciosoque tinctus intenso acore , emerget mucus , mille malorum parens : experientia enim docet , spontè & faciliè quamlibet farinam liquore subactam , & in loco tepido servatam insigniter acescere , fermentari & turgescere , etiam citra fermenti additionem : id quod si fiat in Infantis stomacho ex
pultis

pultis ingesti acore, corrumpitur superingestum lac, & in grumos abit digestionemque depravat.

Hæc pulmenta (si tamen præter rationem, & Medicorum rationabilium suatum) muliercularum ineptus abusus concedat, hoc saltem caveant obstinatæ medicatrices, nè ante horam post assumptum pulmentum ipsis mammæ ad sugendum præbeantur, nè lac cum pulte diutius detentum corrumpatur. Præterea caveant etiam mulierculæ, talem pulviculam non nisi correctam adhibere, ejus autem correctio in hoc consistit, ut omisâ farinâ, loco ejus *panis triticeus*, vel ut vocant, *similagineus* non nihil exsiccat, vel induratus, minutim tricus, cum *lacte bono* vel *aqua* in pultis mollêm consistentiam coquatur, addico tantillo *seminis anisi pul-verisat*: experientia (inquit Etmüller) me hæcenus docuit, optimè conducere tenellis tale pulmentum, ubertimque eos nutrire. Fermentatus enim panis adeoque facile resolubilis, promptiusque in stomacho digestibilis, quidni farinaceæ pastæ præferendus erit? pauciores flatu indè elevaruntur, & liquidior mucus post ejus usum restabit, faciliusque longè qui abstergi queat, quàm è communi pulte fieri solet. Quibus ritè observatis, nullum dubium est, quin Infantes vitam sanam diutius sint conservaturi.

Mauriceau verò pulviculam ut coctioni aptior fiat, sic conficiendam suadet: farina prius in furno leviter excoqui sive exsiccare debet, vasi fictili imposita, postquam panis expositus est aliquoties eam versando & movendo, ad æqualem exsiccationem, & sic puls ex hac confectum citius excoquitur, & vulgari præstantius, non ita viscidum, & ventriculo coquenti aptius est, præsertim si lac recens emulctum ad id coquendum (uti necessarium est) accipiatur, suadetque prædictus Author, ut tale pulmentum semel aut bis aut summum de die, & ab initio seu primis diebus, paucillum tantum detur.

Nn

Non

Non paucae sunt Mulieres, quae Infantibus recens natis, etiam primis diebus pultem porrigunt, id quod Nutrices Infantibus infestissimae factitare solent, ejularis à fame prodeuntis compescendi gratiâ; verum hoc solum interficiendis Infantibus satis est, à subsequente cruditate & obstructionibus inde natis, id enim alimentum consistentiâ, crassius & viscidum vix permeat ventriculum, & intestina mucò repleta meconico, parum firma, & nec adhuc sufficienter expansa, unde obnoxii fiunt Infantes primò nativitatis momentò, gravibus obstructionibus, dyspnæa, torminibus, doloribus, & inflationibus ventris, morte sæpè subsequâ. Quare melius facerent primis præsertim duobus, tribus, vel quatuor mensibus, à tali pulmento arcere teneros Infantes, & eos solummodò lacte materno (quod commodissimum Infantis est alimentum, utpote quod ex eodem sanguine generatur, & quò in utero formatus jam enutritus est) vel in defectu materni, lacte Nutricis contentare, postea verò iisdem omnivaria juncula præberi possunt, ex *pane triticeo* cum *jure carnis* debitè cocta, vulgo *panatella* dicta, & sic res melius succeder.

Malè pariter consulunt Infantibus Matres vel Nutrices, quando pulmentum in ore tenent, & salivæ commixtione ipsi fluiditatem conciliant, cum autem salivæ, peculiaris sit vis fermentativa, quæ si debitè & ab exactè sana muliere institueretur, hæc cum pule salivæ miscela proficua esse posset, non diffiteor, quia tamen communiter & frequentius observatum est, ex hac fermentativa commixtione & ingestione, plurima morbosa contagia miscellis communicari, adeò, ut per hanc salivam Infantibus morbi nutricum innocenter (innumera testantur Authorum exempla) infusi fuerint, ideò eam conscientiâ & experienciâ ductus, magis reprobò, quam approbo.

Curatio.

Curatio.

Cum ergo ex acido & viscido pulmenti, tot affectus Infantibus propulsolent, quod aliàs Galenici *pituitam crassam* ac acidam, Paracelsistæ *Sal acidum*, sive *Tartarum*, nos cum recentioribus simpliciter *acidum viscidum* vocamus; hinc omnia medicamenta hoc corrigentia, Infantum morbis sunt proficua, uti sunt omnia *alcalia*, tam *volatilia*, quàm *fixa*, *aromatica*, *salina volatilia*, & etiam *oleosa*, imprimis *volatilia oleosa*. *Spiritus Salis æci. aromatizatus*. vel *amsat*. vel *sassafrasatus*, vel quocunque convenienti aromate reëtificatus. *Liquor C. C. succinat.* &c. quæ tam Nutrici quàm Infanti in vehiculo conveniente, v. g. ∇ . *menth. fenicul. lacte materno*, à gutt. j. ad iij. vel iv. dari possunt. Idem acidum mirè destruitur per *salia acria aromatica volatilia*, ut sunt: *Semen anisi, fenicul. castor.* quod elegans temperans est acidum austerum: Sic & *myrrha*, & *succinum*, *Cinnabar. nativ.* eundem absorbent acorem.

Ex *fixis* & paulò *terrestrioribus* sunt. *Ocul. 69. corall. margarit. Bezoar. ebur, unicornu verum & fossile. Pulv. polycbreft. Ettmüller. pulv. absorbens Wedelii.* Sequens *Pulv.* ad imitationem Ettmülleri in corrigendo acido & flatibus, raro fallens est *Dolæi*.

℞. *Ocul. 69. 3ß.*

CC. phlicè ppt. 3j.

Corall. rubr. ppt. 3ß.

Myrrhæ rubr.

Castor. aa. gr. v.

Theriac. Celest. gr. iv.

M. f. Pulvis. Dosis 3ß. ad 3j.

N n 2

Quod

Quod si ex torminibus vel alia ex causa acidi, metus sit Epilepsia, detur sequens.

℞. *Aq. flor. tilia.*

fenicul. aa. ℥j.

Spir. sal. armon. anisat. ʒß.

Oculor. cancr. ppt. ʒj.

Cinnabar. nativ. ʒß.

Tberiac. Celest. gr. iij.

Syrup. d. menth. ʒß.

Misce detur cochleatim.

CAPUT IV.

De Lactis vitiis emendandis.

LActis & lactationis vitiosa errata ut quis debite & facile corrigat, in genere semper habeatur respectus, ut omnis ejus vitiosa acescentia, & exinde grumosa coagulatio, tanquam familiarissima vitia, quantum possibile præcaveantur. Commendatissimus, ob id Nutrici sit, *anisi*, & hinc *feniculi* usus, sive *semina* eorum, post singulos pastus commendantur, vel saltẽm posterioris radix & herba, quacunque ratione usurpetur: hæc enim & similia, præterquàm quod lac augeant, etiam saluberrimam vim ipsi lacti simul conciliant suâ aromaticâ, volatili, oleosâ naturâ, & acescentiam ejus præmaturam & coagulationem optimè prohibent, imò & tormina & status Infantis feliciter tollunt. Caveat simul sedulò Nutrix nè aqua frigida diutius aut crebrius manus immergat, & statim ab hoc lac Infanti præbeat, nec enim

enim tantum Infans sed & ipsa Nutrix ventris torminibus ex tali occasione observatur corripitur. Quod si inopinato terrore concutiat Nutrix, vel irâ corripitur, & inde lactis gravio-rem alteracionem metuat, postquam lac prius ex uberibus emulserit, assumpta *Spermat. Ceti. rec. à 3ß. ad 3j. cum 3io diaphoret. rec. & rit. ppt. à gr. xv. ad 3j. in haustu cerevisiæ calidæ, vel iusculo, aut alio vehiculo, ad blandum sudorem se componat, quo sic omnis lactis corruptela emendetur. Vel si tumor, dolor & durities superveniat, & simul inflammationis metus sit: accipiat *C. C. publice ppt. 3j. t. diaph. rec. & rit. ppt. 3ß. Sal. volat. C. C. (vel quod melius Sal. volat. viper.) gr. viij. Milce vel**

3j. C. C. publice ppt. 3ß.

Sal. Card. bened. 3ß. vel gr. xv.

In aqua flor. sambuci pro sudorifero assumat. Vel horum loco. *Spirit. Salis. *ci aromatizat. à 3ß. ad 3j. in aq. card. bened. hauriat, & sudorem plus minus largum expectet: imponendo simul mammæ in leviori quodam affectu emplast. de Sperm. Ceti. Myns. vel meum Emplast. ad mammas. In graviore verò affectu inducatur mammæ Empl. de Galban. crocat. Myns. cum aa. gummi. ammon. in acet. solut. invicem liquefactis & linteo denso inductis confectum, quam calidè perferre potest. Utrobique in casu desuper sacculum interpassatum ex oryza confect. & probè calefact. imponat, ut per sudorifera ista alcalina dissolutum lac horum adjumento promoveatur in motum, & stagnatio ejus ac grumescencia ità maturè corrigatur.*

In specie autem quomodo lac corrigi possit ac debeat; ex sequentibus patebit. *Lac tenue & aquosum debet incrassari. Nutrix ergo utatur pane bene cocto, aniso fanicul. aromatizat. oryzâ, amygd. carnibus assis potius quam elixis; vitentur*

N n 3

pisces,

pisces, olera, fructus, neque multa juscula sumat, se bene exerceat, potus sit bona & defæcata cerevisia, non multum lupulata: & si hæc non sufficiant, lenis purgatio instituat, ex Mechocanna & rhab. tandem quoque sudores & Laconicum proderunt, mammæ sint bene custoditæ.

Lac crassum. Emendetur cibus boni succi & facilis coctionis, quales sunt carnes pullor. vitulina, hædina &c. abstineant verò à bubula porcina, à caseo: utatur feniculo, & si opus est levem purgationem adhibeat: diætè vivat, exercitium amet.

Lactis, acrimonia, sapor, odor, & color vitiosus. Emendatur si chyli & sanguinis vitium, ex quibus generatur, corrigatur; victu boni succi & facilis digestionis ut antè dictum. Vitet acria & salsa: abstineat ab ira & venere; & tandem alterantia adhibeat, & si nec hæc sufficiant, etiam lenientia usurpentur, mammæ verò illo die purgationis Infanti non præbeantur, donec purgatio absoluta sit, nisi forsitan unâ operâ ipsum Infantem purgari oporteat.

Pulvis pro corrigendo lacte Nutricis, omni tempore, præcipuè autem imminente vel præsentente fluxu menstruo.

℞. Pulv. Crystall. mont. ppt. ʒij.

fæcal. pæon.

Ungul. alcis ppt. aa. ʒij.

Smaragd. ppt. ʒj.

Corall. rubr. ppt. ʒj.

Rasur. ebor. ʒiv.

M. F. Pulvis.

Dosis.

Dosis. 2. cuspides cultri, manè & vespèri si placet, in quocunque vehiculo, idque potissimum octo diebus ante eruptionem menstrui, & continuando quousque cesset.

Pulvis pro corrigendo lacte in Infantibus,
omni tempore maximè verò imminente vel
durante fluxu menstruo.

℞. Pulv. March.

Epilept. nigr. aa. ðiv.

Bulb. Majal. ʒj.

Fæcul. pæon. ʒß.

Ungul. Alc. ppt. ʒj.

Gran. human. ppt. gr. xv.

M. f. Pulvis subtiliss. *Dosis* parva cuspis cultri, in lacte, vel aq. cerasor. nigr. Manè & vespèri, omni tempore, potissimum verò octo diebus ante eruptionem menstrui, continuando usque quò cesset.

CAPUT V.

De Infantis Dieta, Cura, tractatione, à tempore dentitionis, usque ad tempus ablationis.

ANtequam Infans dentes non habeat, non convenit illi solidiores cibos porrigere cum eos masticare non possit: unde lac ipsi convenientissimum, & præterea quædam legumina salubriora, cocta, & ori indita: cave tamen dum lac est in ventriculo, nè aliquid acetosi, vel similis qualitatæ præbeas Infanti. *Secundò* dum manibus & pedibus repere incipit, ad leves motus

motus est accingendus, ut robustior evadat, non tamen nimis maturè ad motum admittatur, nec præmaturè pedibus insistat, nè crura mollia distorqueantur, & curvus fiat. Undè debito tempore, fasciâ, vel bono cingulo, aut parvo curriculo, cursui & gressui assuescat, quousque tam firmus sit, ut sine his etiam incedere possit, non tamen solus, cùm casui valdè sit obnoxius Infans, ideò pro majori cautela, circulus rotundus frontem ambiens cum duobus semicirculis per crucem se interfecantibus per verticem capitis ductis & annexis & bene suffultis, vel lanâ, vel bombace, vel pilis &c. *Tertiò* Balnea rarius adhibeantur, semel aut bis in septimana. *Quartò* attendendum maximè est nè mancus fiat, ideò liganda est sinistra manus.

CAPUT VI.

De Infantis Dieta, Cura, & Ablatione.

Infans à lacte regulariter non amoveatur antequàm perfectum dentium numerum habeat, aliàs enim cibis solidioribus masticandis & digerendis non esset aptus; præterea cùm sub dentitione Infantes plurimis divexentur morbis, ideò lac ipsis remedio est.

Tempus ablaçtandi non est certum; vegeti citius ablaçtantur, debiles verò diutius lactandi: Si Mater vel Nutrix conceperit, vel male valeat, citius etiam quàm decet ablaçtari debent, ordinariè mense duodecimo, vel decimo quinto; commodissimè verò sesquianno, & summum biennio ablaçtantur: regulariter tamen satius est, tardius quàm citius ablaçtare: quocunq; autem tempore ablaçtantur, non statim illis cibi alieni offerendi, sed potius adhuc cùm lactantur paulacim iis assuefaciendi, nè

nè subita mutatio morbos pariat; cibi sint pulmenta, panatellæ, juscula cum pane, post aliquod tempus legumina, carnes facilis digestionis. Ablactatio sic commodius vere & autumno quàm æstate & hyeme, ob multas rationes: sitque potius crescente quàm decrescente lunâ. Et quia interdum Infantes mammam nullô modò relinquere volunt, papillæ *succo absynthii*, vel simile re inungendæ & denigrandæ; sed optimum est, ut Matres & Nutrices se subtrahant, & sic facilius obliviscuntur. *Vinum* Infantibus non datur, sed potius *cerevisia*, vel *aqua cocta*, v.g. *feniculi*, aut similis.

CAPUT VII.

De Infantis Dieta, Cura, & Tractatione post ablactationem.

Reliquam Infantum usque ad primum septennium dietam quod Rattinet, ea adhuc ab adultorum differt, partim ob teneritudinem, partim ob errores qui in pleno victu contingunt. Regula igitur generalis sit, quod cibus in ista ætate sæpe porrigendus, & tantum, quantum non solum nutrimentum corporis, sed & augmentum ipsius requirit, nam teste Hipp. 1. aph. 13. *Jejunium minime jèrunt Pueri.*

Ab animi passionibus, timore, metu, ira, terrore, tristitia, &c. sunt arcendi, nè epilepsia, aliudve simile malum ingruat; nihilominus tamen nè malitia superet ætatem, in bonis laudandi, in malis moderatè coercendi, nam & catuli leonum & urforum in tenera ætate cicurantur, quod adulti postea non faciunt.

Ad animi affectus temperandos, ludi varii proponendi: motus corporis etiam sint moderati, otium fugiendo, nè cruditates coacerventur, alimentum non debite distribuatur, & calor tener obruatur.

Illi qui cum Infantibus conversantur, sint homines bonæ vitæ, nullis vitiis dediti nè iisdem imbuantur.

CAPUT VIII.

De Morbis Infantum, eorumque causis in genere.

INfantes etiam morbis frequentissimè corripì & affici in patulo est, idque ob causas: propè infinitas: etenim *Primò* totis novem mensibus, sanguis menstruus in utero retentus & cum-latus, Infantem facillè afficere potest. *Secundò* quòd Matres non omnes æquè sanæ sint, & magnos sæpe in diæta errores, casus, ictus, terrores, impressiones, imaginationes, saltus, motus corporis & animi committant, quos Infans luit, vel in, vel extra uterum jure hæreditario. *Tertiò* in partu laborioso, quam non patitur vim & violentiam, compressionem, torsionem & læsionem? *Quartò* Umbilici abscissio & ligatura & exindè dolor, molestia ac inflammatio &c. quid non possunt. *Quintò* loci & sitûs mutatio, dùm anse in molli utero contentus, & in calido conservatus, mox aëri exponitur, linteisque asperis, siccis, intricatur & imponitur. *Sextò* in utero matris, sanguine, coque purissimo enutriebatur nullo ventriculi labore, postea cibo, lacte, quod non semper æquè bonum est, alitur. *Septimò* tandem ipsa indispositio innata partibus, ad multos morbos, easdem disponit.

Atque ut hæc omnia fiant clariora, paululùm enucleatius has causas, primò remotas, secundò proximas, generaliter nempe proponemus.

Non loquimur autem hic de vitio parentum hæreditario, vel aliunde hausto fermento contagioso: Sed præcisè in genere de causis effectricibus per se; inter quas præ cæteris (ut paucis omnia

omnia dicamus) *due* principales se offerunt, à quibus omnes memorandi affectus, primam nanciscuntur originem: nempe *excreta & retenta*, vel clarius: *obstinata retentio excernendorum & per-versa ingestio nutriendorum*. Prior consistit in sæcum primarum viarum, præsertim meconii suppressione, sensibilis & insensibilis transpirationis occlusionem & impedimento: ad ambas has causas plurimum contribuunt præ cæteris, *vitia lactis, & errores pultis*.

Retentionem excernendorum sive meconii, potissimum quod attinet, præter ventriculum albicante plus minus & lentâ materiâ refertum, picuitosa & flava, interdum variegata excrementa grumosa intestina tenuia occupant, duriora verò & quasi picea, ex viridi nigrescentia (nobis Medicis meconium dictum) crassiora intestina occupant: & hæc omnia ex nutrimento per os, sub formatione & nutritione fætus in utero hausto generantur, quæ omnia nisi maturè ex corpore expurgentur, retenta diutius, vel pertinacem alvi obstructionem efficiunt, vel lactis nutritivi distributionem impediunt, vel id ipsum lac in distributione corrumpunt, & corruptione acrimoniam acidam, aut acido-salinam, & lixiviosam acquirendo, rodunt, corrodunt, & crudelia tormina, aliaq; quàm plurima mala inferunt.

Hinc provida Mater Natura ipsa, ordinariâ lege brevi à partu, vomitu ac secessu hæc ipsa sæculenta prius antequàm aliud quidpiam moliatur, ejicit, monstrans Medico, tanquàm ejus ministro, viam, quid in tardiori ejus conatu præstare debeat ac possit. Hic obicèr & benè notandum est, *meconium* nobis Medicis aliud non esse, quàm *crudior caseus à reliqua nutritiva substantia sequestratus, & quasi præcipitatus*; qui ipse *acorem à stomacho semel conceptum plus minus retinet*; hinc quocunq; modo cum bile junctus in intestinis, cum ea colorem nigro-viridescentem efficit.

Quod verò attinet *transpirationis occlusionem*, ejus quanta in omni genere & statu viventium sit necessitas & quantitas, consule Authores, præsertim Sanctiorum in *Med. Stat.* Præ cæteris tamen Infantes, cum copiosè nutrantur, necesse est quodque ut copiosè transpirent; partim ut puritas sanguinis, cæterorumque liquorum circulantium & alibilium perfectio, facta recta conservetur: partim si quid feculenti sub nutritione enatum, ipsis commixtum fuerit, ex partibus solidis eliminetur. Palàm verò est, Infantes viscidâ lanugine à natura obductos esse, idque ex liquore nutritivo cui innatant extimæ cuti adherente, à qua transpiratio insigniter impeditur. Unde talis facta coacervatio humorum, æquam naturæ turbant fermentationem, quæ multorum morborum Infantiliū causa existit.

Post excernendorum retentionem, ad *nutriendorum vitiosam* perginus *ingestionem*; ubi se primariò offerunt *lactis vitia*, de quibus jam suprà suo cap. diximus. Secundò sunt *alia assumpta*: quàmvis enim sanis, omnia sint sana, dummodò sanâ mente imperentur, quod enim sapit, nutrit, adeò ut in sanis scrupulosus alimentorum delectus reverà sit frustraneus, quin potius si appetitus in objectum feratur intensiùs, præsertim consentum, vix denegandum sit, quia fermentum digestivum potenter quælibet in sui ditionem trahit, præsertim si cum moderamine & sobriè assumantur, id quod Nutricibus conductitiis in specie observandum, ùr plurimùm egenis, adeoque famelicis, & frequenter nimio nutrimentorum excessui primitus indulgentibus; qui excessus licèt Nutricibus innocuus videatur, tenellis tamen Infantibus graves inducit passionēs, dum nimirum lacti, tam improporcionatæ qualitates imprimuntur, uti videmus, dum suos potus, *aniso* vel *faniculo*, vel *floribus sambuci* ad augmentandum lac coquunt, lac immediatè illarum,

eorum

corum odore inficiatur, & nimis auctum, gravia alvi profluvia Infantibus procuret.

Nihil dico de *purgantibus*, Nutricibus propinata, Infantibus nociva: nihil dico de aliis porrectis à Matribus, Nutricibus & aliis adstantibus quæ tenellos graviter lædunt; in specie verò dico tantum de *acidis*, quæ sive sint condimenta sive potulenta, ut *vinum* (præsertim in non assuetis) sui vestigia in dulci lacte relinquunt, utitur sensibus abscondita postmodum tamen torminum & aliorum malorum Infantilium ex acido rodente Authores, id quod etiam Matribus quàm diù factum uterò gestant, dictum velim, ut acida fugiant, nè præmaturè factui fomitem epilepticum ingerant, docet enim experientia, Infantes à Matribus acido non indulgentibus natos, minus epilepsiæ obnoxios esse: imò acida ad abortum disponere Matres, docent Authores, præsertim *vinum fortius* quod factum pelle-
re asserit *Hartmann*. Hujus nocivæ farinæ quoque est *caseus*, qui præmaturò coagulo lac ad grumos disponit, idem tenemus de *cere-visia non rite fermentata & defæcata*, fermentum stomachale inficiens Nutricibus, pueris tormina excitet; his accedunt *fructus borarii*, qui æquè varia symptomata procurant. Huc referri quoque possunt, quæ affectus Infantum, si non efficiunt ad minus exasperant, & spiritus animales, totumque genus nervosum, & mediantibus his sanguinem ipsum, ac reliquos liquores commovendo; & sic etiam lac viriant: Præ cæteris est ira & terror Nutricum nimius, nocentissimus Infantibus, eorumque epilepsiæ excitatores, turbant enim concoctiones, exasperant fermenta, & cruditates acidas procurant; unde æquè lac ex tam depravato chylo peccaminosum redditur, quod aëscens in grunum ac caseum resolvitur; quin imò experientia docet, lac ex terrore in ipsis mammis coagulari, unde inflammationes & erysipelata superveniunt, & per consequens à

tali lactis semicaseati suctu, mille mala insens mulctatur, & communiter ad epilepsiam disponitur.

Huc quoque referimus errata excretorum in Nutricibus; inter quæ *menstruorum constitutio* primatum tenet: supprimi hæc in gravidis, ita & in lactantibus (probabiliter in salutem proles) naturæ respondet legibus, in habitatoribus tamen, & sanguine turgescentiore præditis, viraginitibus dictis, tam primis gestationis mensibus, quam ipso lactationis tempore, eadem ordinariâ periodo erumpere observatum est sæpius; quoties autem ista sanguinis excretio contingit, toties sensilis in tennellis observanda venit alteratio, quæ languidi, lacrymosi, & debiles fiunt, donec obturatio denuò menstruò, eadem accidentia remittant: singulari enim fermentativo motu sanguis, sub menstruationis tempore agitur & turgescit (quod plures miseræ experiuntur fæminæ) quidni ergo lac tunc temporis & similem fermentativum motum concipiat, qui & turbet Infantis digestionem, & fermentationem vitalem vitiet, sicut adultis fit, dum vinum & cerevisiam nonnihil adhuc fermentantem bibunt, non læviter læduntur. Nec minor imò longè insignior, lacti imprimitur alteratio, si per sæcundum coitum Nutricis impediatur menstruatio, ad corruptionem indè lac disponitur, & horridam acquirit impressionem, fætui abominabilem, id quod & in brutis observatur; lac ita depravatum, ne dicam corruptum ab Infante haustum, in ejus stomacho degenerat in vitiosum casei coagulum, stomacho Infantis infectissimum, adeò ut eidem exindè stigma totâ vitâ imprimatur, unde casei aversio, aliàs tam familiaris ex hoc deducitur; & ob id sudent Medici, ut Nutrices toto lactationis tempore à coitu abstineant, unde etiam lactantes Matres à redditione debiti excusant, propter insignia fætus nocumenta. Paulus Zacchias lib. 7. tit. 9. quæst. 3.

Hæc dicta sunt de vitiis lactis; de erratis pultis & assumptorum in genere: hic dicere superfedeo, nè grambem repetam, quæ abundè expressa sunt cap. de *pulicula & cibis Infantis*, eorumque vitiis & cura.

Detexi hæctenus causas morbificas remotiores, nunc exactius nocendi rationem, seu causam proximam inquirendo, perspicuum evadit, succum vitiose acidum, nunc viscidum; nunc aqueo serosum, primæ digestionis in ventriculo, ejusque intestino duodeno perfectionis, adeoque ex cruditate acida coacervatum, esse causam proximam & radicem, ex quam tot morbi Infantiles frequenter propullulant.

Hunc succum; sive Galenicorum *pituitam acidam*, sive Paracelsitarum *sal acidum*, seu *Tartarum fecalem*, sive Neoteri-
corum, *succum nutritium acescentem*, aut *lympham viscidam* appellare velis, mihi perinde est, simus namque in verbis faciles, & profusi, modò in re conveniamus: facillimè nimirum lac, seu sanum, seu alteratum in stomacho præter naturam acescit, idque cò magis quò copiosius aut inordinatiùs ingeritur, hinc spissescit, & factâ per coagulum seri à contentis separatione, casei cum butyro perniciosus grumus, nunc in stomacho, nunc in intestinis subsidet, & plus minus pertinaciter agglutinus hæret, conferente ad hoc symbolum pulve farinaceâ crudâ & viscidâ faciliè acescibili, unâ cum retento, & plus minus corrupto meconio, unde ex conditione loci, id est stomachi calidi, & ratione contentorum excrementorum, uti & ingestorum lacteorum, & pultaceorum, intensus acor necessariò, & faciliè oritur, qui nunc materiâ viscidâ irretitus, in primis viis suas ludic tragœdias, nunc vehiculo aqueo seroso & lymphatico ulterius distributus, etiam aliis & remotis in locis, mille malorum existit artifex: hæc omnia confirmant juvenia & lædencia, cò quòd observemus pleraque Infantum mala, per remedia acidum destru-

struentia, alcalia tam volatilia quam fixa, uti & per aromatica & salia volatilia oleosa optimè curari.

Quæ tamen omnia ita intelligenda volumus, non quasi alia nulla in corpore tenello sint errata, quam quæ ex dicto acido oriuntur; ubique enim excipiendi sunt hæreditarii morbi, uti & à lactantibus implantata morborum feminaria, aut aliundè hausta contagia: præterea mille larvas inducit sub sui corruptela lac, tùm in mammis, tùm in Infantis stomacho, tùm etiam in intestinis à bile & succo pancreatico alteratur, unde variè dulcescit, amarescit, colliquescit, viridescit, livescit, putrescit, verminescit, aliasque quam plurimas pravas qualitates sibi adsciscit: de quibus videatur Hipp. lib. de prisca Med. Nihilominus tamen ea mala quæ ex cruditate acida veniunt sunt frequentissima, quia talis corruptela est familiarissima.

Sed dicet quis, paradoxum videtur, quomodo in semilacteis & quasi edulcoratis Infantibus, hoc est, dulci rore ubique profusus, ex dulci lacte primitus concretis, & eodem cum pulce insipido dulci enutritis, acor adeò nocivus, & tam intensus oriri possit, à quo tam tetra emergant symptomata? verum enim verò facile ad hoc respondetur & clarius redditur negotium, modo aspiciantur assumpta tam Matris utero gestantis, quam Nutricis lactantis, de quibus abundè supra diximus; sufficiat nobis solus panis & cerevisia, utraque acido abundantissimè imprægnata, quæ nisi credas Chymicos consule. Acidum ergò morborum Infantiliùm frequentissima est causa; subiectum ejus est viscidum seu visciditas, vehiculum verò, aquosum, seu aquositas, mediante qua etiam quâ datâ portâ ruit.

Variis autem morbis tentantur Infantes, quos plerosquæ Hipp. compendiauit 3. aph. 24. 25. 26. quibus adijunge variolas, morbillos, crustam lacteam, favos, achores, ranulam sub lingua, vincu-

vinculum linguæ, accretionem & brevitatem, interriginem &c. Et licet orbi Infantum vel soli naturæ, vel mulieribus commit-
tendi forent curandi, nihilominus sæpe tamen manus Medica im-
ploratur, tum quia difficulter cognoscuntur, cum Infantes nec vo-
ce, nec alio indicio manifestare queant, tum quia magno judicio
opus est in eligendis Infantum remediis.

Curatio.

Tamet si omnia à Medico provideantur & percipiantur, quæ Ma-
tri, Nutrici & Infanti commoda & utilia sunt, & è contra etiam
omnia ea strictè inhibeantur & præcaveantur, quæ noxia; non po-
terit tamen unquam tam rigorosum regimen institui, quin tan-
dem succus copiosior vel parcior, acidior vel temperatior, viscidior
vel serosior interdum colligatur; unde morbi Infantiles ut abun-
dè diximus successivè propullulant. In genere ergò pro horum
cura, remedia talia conveniunt, quæ acidum destruere, viscidum
incidere seu attenuare, utrumque pro ratione occasionis evacuare
valent; adeoque his indicationibus satisfaciencia remedia, mox à
nativitate propinanda & subinde repetenda sunt.

In curatione Infantum, præcipuè magna remediorum & te-
neritatis habenda est ratio, fortia enim & multa non ferunt: inter
cætera patet in cura Infantum nihil æquè præstare, quàm *Salia vo-*
lat: in specie *oleosa*, quæ optimè acidum corrigunt, & cum eo
falsum tertium componunt, blandum diureticum & pariter dia-
phoreticum, & præterea penetrando potentissimè attenuant, &
resolvunt quascunque obvias visciditates, unde *Spirit. sal. armon.*
inprimis cum aromaticis destillatus, sicq; factus *oleosus*, vel *Spir.*
sal. armon. anisat. vel *caryophyllat.* quem mille encomiis extollit
Ettmüller pro curandis Infantibus.

Ego verò in praxi *Liquor. C. C. succinat*: hætenus mille experimentis, & multis in casibus adultorum pariter ac juniorum utriusque sexus comprobatum reperi: hic liquor fit ex Spiritu C. C. probè rectificato, & ab oleo empyreumatico depurato, qui affunditur Sali volat. C. C. & Sali volat succini (ab omni oleositate empyreumatica crebrioribus cum aqua & Spiritu vini solutionibus, & inde præcipitationibus purificato) aa. q. s. ut imbibat & solvat dicta salia, quæ mixtura utut effervescat primitus, cum succini salia volat: acidum suavissimum & admodum delicatum conjunctum habeant, brevi tamen amicè coeunt, & digestionem debitam ac cohobationem reiteratam liquorem hunc commendatissimum constituunt.

Nè verò quis credat quòd nimis generosa, nimisque graduata sint *salia volat*: pro Infantibus, nam circumspèctus usus in lacte *Nutricis*, vel in aq. & *syrup. menth. feniculi*, aut simili vehiculo, & simul limitata & parva dosis ad paucas tantum guttulas, tenellis pariter ac paulò robustioribus Infantibus eadem optimè accomodare novit. Misatus sum (inquit Etmüller) à quibusdam vel præconceptis opinionibus excacatis, verò experientiâ debitam destitutis Medicis, cum pavore quasi audiri salium volatilium mentionem, speciatim pro Infantum cura, cum tamen sub legitimo & circumspècto usu, Dei manus eadem vocanda esse existimem.

Volatilibus hisce alcalibus, & fixa per Spiritum vini temperata in solutiones tincta, etiam subjungenda erunt, imprimis *Tinct. Tartari*, *Tinct. scoriar. regul. tij.* Præter salia hæc volat: acriora & aromata: oleosa suo sale volatili non destituta in genere Infantibus ægris fructuosa sunt, inter quæ *anisum* & ejus semen mirè convenit. quod ad *Dj. rec. pul. verisat.* pro levi quoque; evacuante commendat Heurnius. *Castoreum* etiam benedicta est medicina, in quacunq; forma exhibita, temperans mirè acidum auste.

austerunt & quoscunque spasmos convulsivos, & indè tormi-
nosa pathemata mire sistens: quibus meritò annumeratur *myrr-
ha*, omnem corruptiuyum acorem tollens, & balsamica vi quam-
cunque corruptionem putredinalem inhibens, indeq̃ue ad vi-
tam longam ab Helmontio commendata: *Tinctura myrrhe*,
à Langio *Tinctura salutis* dicta, ex myrrha cum Spiritu vini Tar-
tarisato extrahitur, locò cujus & Spirit. sal. armon. cum Spi-
ritu vini parat. pro menstruo capi potest. Salutare erit pueris
remèdium corrigens quodcunque acidum, & viscidum resol-
vens. Facit huc etiam *Elixir propriè. absque acido* paratum
per *alcalia vel fixa*, ut *sal Tartari* vel *volat*: ut Spirit. sal. ar-
mon: hoc ipsum enim iis qui adhuc lactis gaudent nutrimento
mirificè conducit, sicut post ab lactationem etiam illud quod cum
acido paratur, concedi potest.

Hiscè denique suo modo *Theriacam* & *Mithridatium* annu-
mero, quorum non est vel caliditatem vel narcosin opia-
ticam pertimescas, modò à gr. j. ad ij. ratione ætatis pro-
pines; quæ & acida vitiosa temperent, & inde illatas noxas do-
lorosas blando sopore fallant,

Hiscè jam dictis acidum corrigentibus volatilibus partim
salinis, partim oleosis, denique adjungenda simul erunt con-
creta quasi *terrea* & paulò *fixiora*, acidum quod talia rodit in
se absorbentia, qualia sunt *Ocul. 69.* & (his vix nobilioris usus)
margarit. ppt. corall. ppt. C. C. ppt. ebur ppt. lapis bezoar animalis;
in genere omnes animalium partes ossæ, imprimis marino-
rum seu aquatilium & dentes, quò & *unicornu animale* perti-
net, & *Pulv. March.* qui ad tormina & epilepsias Infantum,
mulierculis decantatissimus est, locò cujus feliciter usurpari po-
test sequens.

℞. *Ocul. 69. ppt. ʒʒ.*

C. C. phil. ppt. ʒj.

Pp 2

corall.

corall. rubr. ppt. ʒʒ.

myrrh. elect. gr. ʒj.

theriac. gr. iʒ.

ol. stillat. anis. gtt. vi.

M. f. Pulvis in puerorum affectibus quàm plurimis convenientissimus, qui si acuat aliquot gr. *Sal. volat. C. C.* vel *cranii human.* vel *viperar.* erit ejus usus longè salubrior & magis præsentaneus.

Venesedionem quod attinet, non nisi summâ urgente necessitate, tenella puerorum constitutio sustinet.

Purgationes fortes, prorsus non conveniunt, Pueri enim, teste Hipp. benigniora tantùm ferre possunt medicamenta; sed vel glandibus, vel clysteribus juvandi, aut mitissima porrigenda sunt remedia; imò satius est, & hæc potius Matribus quàm Infantibus porrigere, cùm vis per lac ipsi communicetur: talia sunt *mel rosat. syr. rosar.* vel *viol. solut. de cichor. cum rhab. de fol. sennæ, manna, cassia, passul. laxat.* &c. quod autem talia laxantia proponantur & propinentur Infantibus, ratio est, temperatus enim partim, partim etiam resolutus succus acidus, necesse interdum est, ut foràs eliminetur, idque imprimis per alvum, & quidem arte, si ipsa natura idipsum non molietur; optatam opem hic ferunt, ut mox diximus, *clysmata*, eaque cum *sale Tartari*, aut simili lixiviali acuata, quæ mucum in crassioribus intestinis resolvunt, & optimè educunt, & stimulo ità reliquis intestinulis injecto, reliquo mucos descendenti vias patentiores reddunt. Parenter saltèm ex *Decocto flor. chamomil. ʒj* ad *ʒiʒ.* vel *ʒij.* pro ratione ætatis, addendo *mel. rutacei ʒʒ. sal. Tartari ʒʒ. ad ʒj.* *ol. stillat. anisi gutt. iij.* quæ injecta feliciter operantur: vel loco talium enematum fiant alia ex *la. de dulci* cum modica *terebinth.* in *vitello ovi* dissolut. quæ etiam sunt egregia, præsertim ubi dolorosa abdominis simul urgent sympto-

symptomata. Quin imò ubi fortius per clysmata stimulanda est alvus, & detergendus mucus quasi vitreus, etiam illis ex simpl. vegetabilium decocto parat. clysteribus, pro fortiori acumine addendus est *syrup. emet. Angel. Sale à ʒj. ad ij.* pro ætatis ratione. Vel loco hujus, *aq. bened. Ruland.* eadem dosi, quæ in pertinacioribus malis jam epilepsiam minantibus (quæ ferè semper in Infantibus fomitem in abdomine obtinet) sunt convenientissima.

Quòd si necessitas urgeat, ex lacte & farina congestum mucum, ex superioribus corporis locis potentius eliminare, præter ea quæ superius *cap. 1.* de meconio educendo laudavimus (inter quæ *syr. de spina C. vel de rhamno*, vel *domesticus* dictus, vel solus vel cum *syr. de fumar.* mixt. & subindè exhibitus omnibus palmam præripit) imprimis *Pulv. jalap.* cum triplo *C. C. usli*, vel *phlicè ppt.* mixt. & ad gr. ij. vel iij. vel plura, ætatis habitâ ratione propinatus, elegans est laxativum: vel locò hujus *pillula dimidia*, vel *unica aloëtica*; adultioribus verò eadem, mutatâ saltem dosi conveniunt, non minus quàm aliquot gr. *rit. & rec. ppt. Mercurii dulc.* in specie ubi ablactati fuerint, qui & mucum resolvit & præterea verminationi resistit.

Manna quoque *Calabrina* purior pulvi addita & tenellis propinata, dosi plus minus auctâ, ʒij. vel ʒß. pro scopi & ætatis ratione, sæviter & bandè eosdem laxare solet.

Scammoniata licèt alii aliis præferant à gr. j. ad ij. cum *syr. de cichor. cum rhab.* exhibita; ego hæc vix præterquàm in ablactatis & robustioribus locum habere judico.

Quòd verò quidam per Nutrices purgare velint Infantes, sicut fecit Pannarolus in suis observ. quando papillis pulvis quidam laxat: inspergitur, ego propter summam incertitudinem doseos, quæ in tali casu ad factum certò determinari nequit, adeoq; ob metum nè plus debirò purgentur tenelli, minùs tutum negotium existimo, ut testatur Bartholin. 2. *hisor. anatom.* 93.

Vomi-

Vomitus, si Infantibus interdum, in specie autem in asthma matris aut gravioris suffocationis metu provocandus sit, vel per *rad. weos florent.* ad aliquod gr. vel parum *syr. emet.* in modica quantitate *aq. menthæ* aut *fenicul.* dissolut. etiam Infantibus tutissimi, idque repetitis potius vicibus, & tutius quidem quam semel pro una dosi.

In genere abstinendum esse ab omnibus remediis Empyricis paternè suadeo.

CAPUT IX.

De Lactis defectu & coagulatione.

Dixi priori capite in genere de morbis Infantum earumque causis, nunc in quibusdam capitibus inseram quædam, quæ ex defectu vel abundantia aut vicio Lactis, vel etiam malè affectis mamillis & papillis, mala Infantibus evenire possunt.

Lactis defectus multæ sunt causæ. *Primo* quòd Matres Infantes lactare nolint, & sic tractu temporis lac perditur. *Secundo* ob mammae refrigeratas, obstructas, ulceratas, scirrholas &c. *Tertio* ob papillas deficientes, vel latentes, vel cæcas, vel impervias, vel fissas, ulceratas vel dolentes. *Quarto* ob sanguinis vel chyli defectum, idque vel vicio sui vel viarum. *Quinto* ob nimias sanguinis profusiones per menstrua, lochia, aut alios morbos graviores; vel ob inedia, labores, vigilias, terrorem, curas, fluxum alvi, remedia frigida mammis applicata, animi pathemata graviora,

Curatio, consistit in causarum ablatione; & in Lactis progeneratione.

Quæ

Quæ causas emendant & auferunt, ex priori capite generali, vel aliunde ex proprio quovis capite desumenda. Quæ lac generant & alliciunt sunt sequentia: *feniculum*, *rad.* ejusque *semen*; *borrago*, *brassica*, *sem. apii*, *feseleos*, *anisi*, *crystall. pptæ.* *lumbr. terrestres ppti*, *emulsiones ex amygd.* & *sem. 4. fregid.* cum *aq. feniculi*, *cerevisia calida*, vel *juscula cum vitellis ovorum*, *butyro* & *saccharo*: *pultes ex lacte cum vitellis ovorum* & *saccharo*.

℞. *Sem. anisi.*

fenicul.

feseleos aa. ʒß.

crystall. mont. ppt. ʒij.

Sacch. ad pond. omn.

M. *Dosis Nutrici ʒij.*

Conducunt etiam *Spec. diacrystall.* *Mynf.* item *Rotule lac augentes Ejusdem.* Sequens etiam est expertum. ℞. *flor. sambuci Mj.* coque in *lacte* & bibe. Laudantur etiam tam internè quàm externè omnia *aromatica* & *spirituosa*. Si ex inopinato terrore lac deperdatur, prius lac emulgeatur, & Nutrix assumat sequentem pulverem: ℞. *ʒ. diaphoret. rit.* & *rec. ppt. ʒj. ocul. 69. ʒß. spermat. ceti rec. non rancid. ʒß.* Misce, sumat in *aqua cherisifoli* & sudet. Si ab acido sit lactis defectus sumatur *pulv. Dolci*, qui mox sequitur. Extra applicetur *mentha recens* mammis vel cataplasma ex *farina bordei* & *fermento*: fricentur mammae panno aspero.

Coagulatio lactis ejusque *grumositas* tum in Matre tum in prole impeditur sequentibus: *Semine anisi*, *fenicul.* post quemvis pastum assumpto: caveant ab omnibus acidis & animi pathematibus: utantur *aromaticis* *volat.* & *oleosis*: sic prodest internè *Spir. sal. * oleosus*, seu *aromatizatus ad gutt. xxx.*

in

n aq. cherefol. vel liquor. C. C. succinat. vel ℞. ocul. 69. ppt. C. C. publice ppt. aa. gr. xv. Misce. Vel sperma ceti recens, vel Pulv. Dolci acidum lactis corrigens.

℞. Sem. fenicul.

anis aa. ʒij.

coriandr. ʒj.

cort. cinamom.

corall. rubr. ppt.

cinnab. nativ.

lumbr. terr. ppt. aa. ʒj.

sacch. albiss. ad pond. omn.

Dosis ʒj. bis de die.

Coagulum leporis ad ʒj. in vino adhibet. jejune Nutrici, est expertum, Omnia quæ lactis redundantiam inhibent, etiam ejus coagulum impediunt, de quibus sequenti capite.

Extra confert sacculus ex oryza & milio calidè applicatus, vel geranium, vel flores sambuci in butyro tosta, vel calefacta & apposita.

℞. Pinguedin. Gallin. unguenti rosat. aa. ʒj. ol. violar. ʒβ. M. & inunge. Emplastrum de spermate ceti Myns. Emplastr. meum ad mammas. Vel

℞. Ol. menth. chamomil. aa. ʒj. anethini ʒβ. Misce bis inunge calidè mammas de die. Plura videri possunt in mammarum inflammatione.

CAPUT X.

De Lactis redundantia.

Lactis redundantie, multæ sunt causæ. *Primò* copia sanguinis & chyli in plethoricis & succulentis corporibus. *Secundo* vita otiosa & hilaris. *Tertiò* bona mamillarum & glandularum constitutio. *Quartò* puerperarum lactare vel nolentium vel negligentium. *Quintò* ablactatio.

Curatio consistit in causæ hæc lac augentes amoveantur, & lac minuenda adhibeantur. Prius fiet sanguinis vel chyli quantitatem inhibendo & subtrahendo, diætâ tenuiore, abstinendo à plenè nutritivis, venæsectione, purgatione, sacificatione, ligaturis, repellentibus & adstringentibus, sed cautè adhibitis, exsiccantibus, catculis, vel pluribus Infantibus mammis appositis, & tandem lac minuentibus, uti sunt *absynth. abrotan. burs. pastor. cycuta, equiset. sol. jugland. apium, petrosel. vulgare, mentha* (sicut lac generat, ita etiam illud exsiccando & resolvendo absumit) *sem. agni casti, coriandri, cumini &c. crocus & cuminum* è collo suspensa ut mammas attingant, etiam lac absumunt: *stercus vaccinum; cataplasma ex farina lentium: panis siligineus cum sale & aq. fervente: raphanus cum pinguedine gallinæ & cera* idem præstant: vel *Farina lentium, lupinor. aa. ℥iij. sem. cymini ℥ij. sol. menthæ ʒβ.* fiat Cataplasma cum posca. Abstinendum est ab aromaticis, spirituosus & volatilibus. Specificum expertissimum est sequens Morelli.

℞. Rad. apii ʒj. sem. cumin. coriandr. aa. ʒβ. coq. in f. q. aquæ menthæ & aceti & cola pro Epichemate mamillari.

Crystallus in dorso è regione mamillarum applicatus, tollit lac: *Petroselinum* seu *apium hortense* eritum mammis applicetur, Valet etiam *Oleum omphacin. vel myrtinum, vel cataplasma.*

Qq

℞. Farin.

℞. *Farin. fabar.* ℥ij.
tburis
myrrh.
maslich. aa. ℥ij.
Pulv. fol. myrthi ℥ijβ.
album. ovor.
acet. aa. q. s.
 Misce fiat Cataplasma.

CAPUT XI.

De Papillis Nutricum latentibus & imperforatis.

P*apillæ latentes* seu mirus exferæ emendantur *extractione*, per instrumentum fuctorium (vulgò ein Saug : Glas) ex vitro vel alia materia confectum, de quo vide Sennert. lib. 4. parte. 3. Sect. I. cap. 11. vel *appositione* capularum glandium, aut testarum avellandarum cimidaturarum, resinâ laricâ repletarum, & tandem præbitione papillarum catellis ad exsugendum.

Papillæ imperforatæ, si à prima conformatione, vel à callo post ulcus, tales sint, incurabiles sunt, si verò meatus tantum sit angustior, & adhuc aliquantulum patens, tunc crebrâ suctione ab infante aut fæmina, aut catello, vel instrumento fuctorio parentior reddi potest.

CAPUT XII.

De Papillarum fissuris, rimis & rhagadibus.

HArum cause sunt suctio infantis violentior: lac acre salsum & mordax: humores falsi acres & mordaces.

Curatio perficitur consolidantibus & glutinantibus & modicè adstringentibus, quæ NB. remedia (ubi miammis iterum admoventus est infans) vinò vel aquâ rosarum sunt prius abluenda.

Verùm quia curatio hæc diuturnior est, & Matres intereâ ob acerbissimum dolorem suctionem ferre non possunt, nec etiam illicò Infantes ablactare, aut Nutrici alii lactandos committere volunt, instrumentum suctorium p̄iori cap. ex Sennerto, locò citatò descriptum, adhibendum est.

In his affectibus prosunt mucilagines sem. cydon. psyllii, tragacanth. axungia anatis, canis, capi, butyrum recens, cremor lactis, lac muliebre, medulla bovis, vituli, omenta animalium, vitella ovorum, saliva jejuni hominis, serum caprinum, cerui, o'eum, amygd. dulc. cere. chamomil. hypericonis, lilior. alb. momortice, rapar. Succus plantagin. solani, vernix seu lac virginis, Unguentum album simpl. & camphorat. de rapis, de plumbo, de tutia, ex bolo, pomat, populeon, rosac. in mortar. plumb. agitatum. Linimentum ex butyro rec. aqua rosar. & saccharo. Lardum fustum & aquâ rosar. decies & ultra elotum. Medulla bovis aq. rosarum & lacte muliebri subacta. ol. amygd. dulc. cerâ & mastiche & modicò ol. ovorum mixt. Omentum agninum lotum, mundatum, minutim incisum & super igne liquatum, in aquam frigid. injectum & cum aq. rosar. probè mixt. Pinguedo brodiis carniū supernatans & aquâ rosar. lota & inuncta. Sequens Unguentum est efficax:

℞. Cerae rubr. ʒiij.

unguent. pomat.

adip. hircin.

ol. amygd. dulc. aa. ʒij.

sang. dracon. subtiliss. triti ʒj. M.

℞. Ol. rosat. compl. ʒiij. teratur in mortario plumb. cum pistil. plumb. ad nigredinem & bis vel ter inungatur parti affectæ. Folia hederæ arboreæ, vel herba Roberti parti apposita etiam profunt.

Notandum autem, quod si humores peccent, lenis purgatio sit prius instituenda.

CAPUT XIII.

De Mammarum inflammatione, apostemate & abscessu.

Inflammatio mammarum est tumor præter naturam rubicundus subdurus, & renitens &c. ab humoribus præter naturam, potissimum verò lacte & sanguine affluentibus, ortus, cum rubore, calore, dolore & pulsatione.

Curatur Primò diversione, id est venæsectione, idque vel in brachio, vel in pede, si lochia non debite procedant. Secundò leni purgatione, si cacochymia vel turgentia adsit. Tertiò alteratione, refrigerantibus & præcipitantibus. Quartò repulsione per topica seu localia. Quintò discussione per digerentia & resolventia. Sextò emolliutione per attenuantia. Septimò suppuratione per suppurantia seu pus promoventia. Octavò apertione idque vel caustico vel cultello. Nonò mundificatione, & tandem consolidatione.

Valent

Valent præterea *silentes in cerevisia* cum croco coquantur & spongiâ intinctâ *mammæ* calidè abluant: deinde lentes ipsas contusas instar cataplasmatris apponant. Alii *Decoct. sem. cannab. in cerevisia* applicant; vel *Cataplasma ex farina hordei cum aq. fluviat. bulliente fact.* bis vel ter de die calidè applicatum, est experitissimū euporiston D. Sorbait. vel *cataplasma ex lacte cum mica panis albi, & modico croco* ad flavedinem factum; est vulgare & optimum remedium. Laudatur etiam *Emplastrum de Sper. Ceti Myns.* In duritiæ verò nimia, extollitur sequens Cataplasma.

℞. *Farin. sem. lin.*

fœnugræc.

bord. aa. ℥ij.

mic. panis filigin. ℥iv.

coq. in f. q. lactis, sub finem adde

cerot. de cicut. ℥iβ.

ungv. dialth. ℥ij.

M. f. Cataplasma.

Instar omnium est meum *Emplastr. ad mammæ*, cujus hæc est descriptio.

℞. *Ol. amygd. dulc. rec. express. ℥iij.*

sevi cervin. ℥ij.

cera virgin. ℥j.

ceruss. subtiliss. pulv. ℥β.

Prima tria lentè coquantur igne, & postea semovendo ab igne, cerussa sensim imponitur. Hoc imponitur lingeo rotundo, ut totam mammam cooperiat, in medio facto foramine pro papilla, & sic tepidè apponatur.

CAPUT XIV.

*De Erysipelate mammarum, vel etiam
Infantis.*

Erysipelas est tumor exiguus p. n. cum dolore pungitivo, rubore flavescente, superficiem mammarum, vel alterius partis affligens, à sanguine calidiore, tenuiore, ichorescente & effervescente ortus.

Cura eadem est Nutricum & Infantum: cum etiam per Matres Infantes plurimum curentur. Si Infans laboret, Nutrix debita victus ratione utatur, & à calidis & falsis absteineat, & si opus est ipsius corpus leniter laxetur. Assumat *diaphoretica* quæ plurimum in hoc affectu præstant, de quibus in aliis capitulis. Extrà cavendum summè est à repercutientibus seu repellentibus, præsertim si non calidè applicentur & conserventur. Commendatur pro externo usu *Pulv. erysipelat. Mysf.* vel applicetur *Pannus coccineus Ejusdem*, vel inungatur *Ungv. de liquirit*: Plura si quis desiderat, ea videre potest, titulò de crusta lactea.

Cum autem plerumque erysipelas in phlegmonem seu inflammationem: abeat, de hac videri potest *cap. præcedens* de mammarum inflammatione.

CAPUT XV.

De Debilitate Infantum recenter natorum.

Primum accidens Infantis recenter nati, cui occurrendum est, est debilitas, cum in lucem exit, id quod non raro contingit,

tingit, non ratione nativæ illius constitutionis, quæ reverà sapè bona in se est, sed ratione partûs difficilis, vel diutius protracti, ob quam rem tantam contraxit inbecillitatem, ut nonnunquam à debilitate vix noscas, an vivus an mortuus sit Infans; eò quòd sapè nullus in illo advertatur membrorum motus; adde: quòd aliquando dum insignis livor præfertim faciem occupet, de suffocatione opinio sit, aliquando tamen accidit, ut exactis eò in statu aliquot horis, paulatim ad se redeat, quasi de morte ad vitam resurgeret: hac conjectura deprehenderetur Infantem reverà non esse mortuum (etiàmsi reverà primo illo instanti non levis suspicio sit) si mater ante partum, validum fatus motum perceperit, si magna non præcesserit hæmorrhagia, & si partûs dolores non admodùm graves fuerint: res autem adhuc magis certa, & extra omnem dubitationis aleam fuerit, licèt nullam emittat vocem, neque ullum edat motum, si nimirum admodum pectori manus, motum cordis deprehendar, contrectatusque funis umbilicalis, juxta ventrem arteriarum aliqua observetur pulsatio: tunc temporis omnis cura adhibenda est ad refocillationem virium.

Statim ergò Infans excipiendus linteis calidis, & ad focum afferendus, obstetrix autem *vinum* ore continens, pauxillum in os Infantis instillabit, idque pluribus vicibus si necesse sit; venter quoque admovebit & pectori lintea duplicata vinò excalescitò madida, vultum apertum servabit ad liberiores respirationem, quam & juvatura est os tantisper dilatando, nares exiguis turundis vino quoque immersis mundabit, quò ejus odore recreetur: singulas corporis partes ad revocationem caloris excalesfaciet, sanguis enim & spiritus, qui universi ad interiora confluerunt, suffocationis discrimen inducunt: sic paulatim Infans resumptis viribus, membra movere incipiet, deindè, languidà licèt voce, gemitus emitter, qui validiores successivè fient, pro ratione respirationis facilioris.

Præter

Præter hæc præsidia omnium certissima, alia obstetricibus suppetunt, non omnino approbanda, non modò quia inutilia, sed etiam quia Infanti admodum noxia. Pleræq; *cephæ* segmentum naribus Infantis admovent, ratæ vim illi inesse vires instaurandi; ast erroneè, nam si Infans postmodum ad se redeat, iste effectus nequaquam odori *cephæ* adscribendus, sed potius ipsi inspirato aëri, quò indigebat; ideo melius est Infanti libertatem respirandi puri aëris concedere, nequaquam autem infecti tetro *cephæ* odore, qui per se noxius est. Quædam mulierculæ secundinas calentes adhuc ex utero, ventri imponunt, quas, donec refrixerint, ibi detinent: verùm posita caloris ratione juvamen quidem afferre, ratione tamen gravitatis obsunt, ventrem comprimendo, sicque respirationem impediendo Infanti summè necessariam.

Aliæ mulierculæ easdem secundinas nondum ab Infante separatas in ignem conjiciunt, aliæ vinò calenti immergunt, credentes ex dicto vino excitari vapores, qui per vasa umbilicalia delati, robur & vigorem conciliare valent. At cum massa ista carnea illius. quæ vasa vitâ priventur statim ac ex corpore exempta sunt, nullus superest ipsis spiritus, qui Infanti communicari queat, quare si istiusmodi in usum adducenda sunt, ea in vulgi gratiam potius, quàm spem infantis sunt futura. Aliæ ut certum robor addant Infanti, sanguinem vasibus umbilicalibus contentum in corpus retrudunt, motæ autoritate Aristot. *cap. 10. lib. 7. hist. animal.* At jam suprà *cap. 1.* abundè ostendimus, quam periculosum hoc sit, & ideo crambem ob credulas fœminas non reperimus.

Nonnunquam etiam Infantes in partu debiles ingenitam habent imbecillitatem, eoque majorem quò magis à statuto partûs tempore, nono videlicet mense recedunt, vel si parentes valetudinarios aut debiles nacti fuerint: in simili casu ardua est medela, neq; aliud se offert præsidium, quàm ut ejusmodi probe alantur, & summa eorum cura habeatur; at rarò contingit, ut tales diu vitales sint, quoniam potius levis ingruens ægritudo, illos de medio tollat.

CAP.

CAPUT XVI.

De Contusionibus & Tumoribus capitis, & aliarum partium recens Natorum.

Corpora recens Natorum adeo mollia & tenera sunt, ut contusionibus & inde natis tumoribus facillimè exponantur. imò nonnunquam membra quædam dislocentur aut frangantur, sive à diuturno, uno eodemq; in situ, mora, vel à rudiore contrectatione partus tempore: contusio omnium maximè familiaris ea est & frequens, quæ in vertice accidit, ubi statim à partu tuber mediam ovi partem adæquans sæpè deprehenditur, imò etiam majus, quod in primo puerperio maximè contingit, idq; eò facilius fit, quò anno sæ magis sunt primiparæ, orificium quippe uteri internum in illis, quod coronam vocant, callosius quod sit, non nihil difficulter cedit & expanditur: quapropter Infantis caput ad id allidens, acque eadem quasi coronâ cinctum parte superiore, quod in exitu primò obvium est, hinc intumescit, ratione sanguinis & humorum (præsertim lymphæ) influentium ibique commorantium ob insignem compressionem, inductam à prænominato orificio interno, quando præsertim validius impelli incipit, adeoq; diutius subsistit exitu præpedito; postquam nimirum aquæ, à quibus sustentabatur utcunque effluerunt: quò etiam concurrit nonnunquam obstetrix frequentiori attræctatione, cum caput in transitu detinetur, sed digitis sæpè immerito rea fit in hoc casu, siquidem sola compressio à dicto orificio facta, ejusmodi tumorum contusionq; complicatorum (non excludendo quandoq; capitis insolitam magnitudinem) causa est. His causis accedit alia, quæ etiam vulgaris aliorum tumorum in aliis quilibet partibus causa est, sanguis nimirum, cui in similibus casibus motus suus circularis denegatur, nimis copiam in illa parte cohibetur, & sic illam in tumorem attollit, sed de his plura videri & legi possunt in Chirurgis.

Rr

Tumo-

Tumores hi quandoque adeò insignes sunt (muliere nondum onere liberatâ, nec orificio uteri internò sufficienter dilatatò) ut sæpè impedimento sint, quò minùs dignoscatur pars, quæ primò exitum affectat, imò nonnunquam in causa esse videantur, nè obstetrices digitis explorantes ullum capitis os agnoscant, & credant os aliquod humeri offerri, vel aliam partem, imò quædam planè ignorent quid rei sit, quod tumorem infert, at verò id faciliè dignoscere est, quòd ii tumores qui carnei ad tactum apparent, nihilominus duriores sunt, quàm vel humerus aut altera natis Infantum quæ partes semper majori mollitiæ donatæ sunt, neque præterea ullis pilis deprehenditur sicut in capite. Cunis ossa præterea faciliè deprehendere est, si digitus oleò vel butyrò inunctus ad orificium usque internum intrudi queat, partes enim capitis intrà uterum contentæ nequaquam intumuerunt, at ea solummodò quæ orificium spectat ab eoque comprimitur, cingitur & arctatur, sicut dictum est; Si factus aliquod aliud membrum præter caput obtulerit, ut brachium aut tibiâ, hæque partes similiter diutius intrà meatum detineantur & situ perverso, vel etiam egressæ sint, eadem ratione in tumorem accollentur.

Cura.

NON modò medela afferenda est ejusmodi tumoribus aut contusionibus, sed illis quoque occurrendum, vel saltèm incrementum prohibendum. Præcavendi ratio est, si partus quantum licet acceleretur, nè caput Infantis, plus quàm decet in meatu detineatur, vel ab orificio interno constringatur, quod crebrò oleò vel *axungia anseris*, vel alio emolliente inungendum, idq; expansionis causâ, & ut simul caput per locum, lubricum redditum, faciliem transitum inveniat.

Sed

Sed objiciet aliquis: si ejusmodi tumores dictam causam agnoscerent, tunc fieret, ut illicò à partu evanescent, siquidem tunc (capite non amplius compresso) nihil obstat, quò minus sanguis, cujus præsentia intumescibat pars, præterfluat, libertate transiit reddità. *Resp.* Hi sciunt velim, à diuturniore illius, aliqua in parte, morà, illum spiritibus spoliari, qui ibi suffocantur, & ob hoc cessat motus, atque extra vasa delatus (quæ locus vel spatia illius sunt à natura dedita) sicut accidit si nimis in illis redundat, effunditur in spatia partis inania, quò fit, ut deinceps, vias ordinarias remeare nesciat: quapropter hoc in casu est necesse, vel ut resolutio per partem ipsam procuretur, vel ad suppurationem deducatur, si diutius ibi commorari contingerit, quæ tamen quantum possibile avertenda, ratione vicinæ cerebri, quòd in Infantibus ossa cranii non contegant in futurarum regione, quæ in illis laxiores semper deprehenduntur, præcipue juxta fontanellam dictam.

Ad resolutionem ejusmodi tumorum & contusionum, quàmprimùm factus exclusus est, foveatur ille *vino calente*, aut *aqua ardente*, immergendo his *splenium* & demum superponendum: pleræque obstetrices admovent *splenium cæneleo intinctum*: Aliæ *ol. rosæ. simpl.* facto prius ex vino, foru; Sennertus tales tumores curat *Empl. diaphæn*: cum *ol. rosæ.* vel si laboriosiori curâ opus est, primis diebus *cataplasma* apponit ex *Pulv. rosar. rubr. fol. & baccis myrthi, farin. fabar. bord. pulv. absynth. betbon. sem. anisi, melle*, hæc cocta cum *vino nigro* misce cum *ol. rosar. & chamomil.* fiat Cataplasma; sequentibus diebus autem adhibet *Empl. diapalm.* tandem *Empl. Barbarum.*

Eadem cura ferè quadrat tumoribus ex casu Infantum subortis, quibus in principio (Höferus in suo *Hercule Med.*) adhibet *Ol. saturni, ol. anisi*, vel *rad. figilli Salom. rec. contusam*: Cavendum hic nè pus citra necessitatem moveatur, neque incisio

cutis, & sic affluxus humorum, inflammatio, convulsio excitur. Hildanus monet diligentiam adhibendam esse in casu Infantis, deprimitur enim cranium inter cadendum sine fractura, quia ipsius mollè est, & obiecto duro facilè cedit: imprimis autem vix aliquid sentiunt mali, successu autem temporis fiunt ingeniò tardi, catarrhis & doloribus obnoxii, quia cerebrum non liberè movetur, adeoque spiritus animales malè perficiuntur: tales itaque cranii depressiones statim apposito Emplastro renacicer adhærente attolli, vel per cucurbitulam elevari debent.

Si his omnibus præstitis nihilominus tumor ad suppurationem pergat, cavendum, nè pus genitum diu moram agat, nè ossa capitis admodum senella & tenuia recens natis, alterationem aut cariem inde patiantur, quo in casu *phlebotomo* pars aperienda est locò maximè idoneò, superadmoto *Emplastro de bethon*: Si crus aut brachium eadem de causa intumuerit, similiter *splenis vino madidis*, cui incoxerint *rosa rubra, flor. chamomill. & meliloti*.

Maribus nonnunquam scrotum intumescit, id quod accidit vel ratione aquarum intra membranas conclusarum, vel confusionis causâ & durioris contrectationis à Chyrurgo vel obstetrice in partu factæ; in hoc casu *splenia vino intincta incoctis rosis* conducunt in utroq; casu.

Pessimum verò est si Chirurgus imperitus, & hac in operatione rudis, aut aliàs necessitatis telo inductus infringat aut distorqueat brachium aut crus Infantis, dum extrahere nititur: infortunium hoc si acciderit, medelam postmodum afferat, partes restituendo fasciis idoneis, illas firmando, & continuando in naturali situ ad perfectam consolidationem.

CAPUT XVII.

*De Fontanella capitis, & Suturis
nimis hiantibus.*

Sæpenumero fetus præcoces, nondum consummatam perfectionem adepti, nec non naturâ debilem sortiti corporis constitutionem, fontanellam capitis & suturas adeo laxas obtinent præ distantia & dehiscencia ossium ab invicem, ut molle omnino sit caput, ferè sine adminiculo, quia nempe illius ossa hinc inde vacillant, raro vivaces esse contingit tales fetus, neque conatus adhibendus in adjunctione ossium ad invicem fortiter illa coarctando, eò enim pacto adeo comprimeretur cerebrum naturâ mollissimum, ut pejor affectus priore induceretur, denegata illi motus libertate, ad quam subsequutura esset functionum depravatio, imò postmodum omnimoda destructio: satis erit ea leniter compressa vitæ ope continuisse, nè nimium vacillent, cetera naturæ committendo, quæ paulatim hiantes has suturas spontè conjunget, perficiens generationem, exsicicans & confirmans ossa capitis, non debitam confirmationem adepta.

Locus in quo fit conjunctio, ad quem usque excurrit futura sagittalis in medio coronalis, quas in omnibus Infantibus semper in duas partes dividit, exprorecta ad radicem usque nasi vocatur *fontanella* capitis, quia videlicet pars est illius mollissima, maximè humida, quæ propterea omnium ultima occluditur.

Illius figuræ formam exprimit cuique obvia ocularis inspectio.

Rr 3

Non.

Nonnulli Infantes totò trienniò partem illam apertam servant, imò nonnunquàm longiori tempore refert enim Bonetus in uxore fratris sui, ultra quadragesimum ætatis annum hiantem mansisse, quod indicium est certum, debilitatis caloris naturalis: ut plurimum tamen ocluditur exactò biennio, ocysus aut serius, pro ratione majoris vel minoris in Infantibus humiditatis, ac majore vel minore robore.

Usque quò integram confirmationem adepta sint ossa, pars illa defendatur admotò *splenio* ex linteo sapius multiplicato, tam arcendi frigoris causâ, quàm aliorum exterius irruentium: mulierculæ nonnullæ diu ibi detinent *pannum coccineum*, ratæ ab eo magis roborari caput; ac parum refert quidvis applicatum fuerit, modò appulsus frigoris prohibeatur, & læsio externa arceatur à parte nullo osse custodita. Nonnunquàm accidit, ossa, quàmvis sufficientem amplitudinem obtineant, quâ se undique contingant, in regione suturarum nihilominus impedire conjunctionem illorum, propter aquas inter hæc & duram matrem conclusas, qui affectus hydrocephalus vocatur, de quo suò locò.

CAPUT XVIII.

De calida Infantulorum intemperie seu dyscrasia, seu de Febris continuis, intermittibus, catarrhalibus &c.

Instantur sæpè, nerò Pueruli calore quodam præternaturali. Ili ac febrili phlogosi (stegende *Hitz* vulgò dictâ) quàm duplicem statuimus: continuam & intermittentem: & sic etiam Pueruli tam febribus continuis quàm intermittentibus corripuntur:

untur : *continuae* causantur ordinariè ab acido viscido, quod antiqui phlegma seu pituitam in ventriculo subsistentem ac putrescentem nominabant : quibus febribus continuis cognatae sunt catarrhales, à lymphâ nimis acida, vel ut antiquitus placuit in pituitam degenerante ortæ. Quandoque hæc febres sunt *periodicæ*, quando lac ab acido grumescit & coagulatur, atque obstructions multas & dolores internè & externè in poris, tubulis & vasis parit, & sic fermento febrili fomes subministratur, quod fermentum deinde ex tubulis, certis periodis elabitur in sanguinem, ibi mixturam turbat, & modò febres *periodicas*, modò *intermittentes*, & si diutius duraverit, *malignas*, & quidem sæpiùs cum exanthematibus, præsertim si putredo accedat, efficit & producit.

Paucis rem clarius dicam : quando nimirum mucus ille minus viscidus, crūdus tamen & vitiosus acore, vel saltem acrisalvo sapore inquinatus distribuatur pro sanguine augmenando & corpore nutriendo, necessariò depravatur exindè massæ sanguineæ crasis, & vitiatur insigniter sanguificatio, & oritur præter naturam ejus effervescencia, unde febres *variæ*; quarum omnium ratio ex corruptione lactis interna; aut ex pororum cutis occlusionè externa optimè explicatur: nam præter acidam cruditatem, quam *pulmentum* & *lac* in stomacho Infantuli subeunt, & unde ejus febres frequentissimè, nunc lentæ, nunc acutæ scaturiunt, etiam *variæ* aliæ omnino sunt lactis depravationes, de quibus jam dictum, sive illæ in *ventriculo* sub *digestione*, sive in *intestinis* sub hujus *digestionis* perfectione, & *fecum* *separatione* obveniant. In specie *cruditas* *nidorosa* appellatur, dum flava copiosa ejiciuntur à tenellis, id quod neutiquam tali in casu bilis tingentis est opificium, unde enim tanta in sætu juniore bilis abundantia? nisi infantulos ferè omnes, primò sui initio, biliosiores viris adultis dicere velis, neque amarescunt semper hæc ipsa, sed potius subindè dulcescunt, & avidè à canibus omnis amari

amari osoribus devorantur. *Lac* potius vitiatâ quacunq̃ ratione, digestionẽ ventriculi, spontè & faciliè citrinescere, testatur Helmont. adeò ut hujusmodi digestionis primæ, multiplicitia errata, ex alimentis & hinc affectibus Nutricis primariò oriunda, cùm non corrigi possunt in secunda digestionẽ, necessariò sanguineam crasin in tantùm alterabunt, ut hujus præter naturales variæ effervescentiæ febriles inevitabiliter superveniant: id quod pariter in quibuslibet Infantum etiam ab lactatorum febribus tam lentis quàm acutis observandum venit, quæ omnes ferè pro causa interna, errata digestionis primæ in ventriculo & intestinis propter eorum adiphagiam agnoscunt: & quidem eò citius ex enarratis occasionibus febres accenduntur, quò minus per cutis cribrum insensibiliter purificatur sanguis, id quod vel defectus caloris ambiens, vel crebra linteaminum neglectus usus inducit: calidi sanè balnei lotio, ut sordes cutaneas Infantis copiosas abstergit & removet, ita & fibras retis cutanei laxando, pororum apertioni & copiosiori transpirationi amplam occasionem suggerit, cujus intermissio & poros constipat, & ex heterogeneorum coacervatorum impetu, huic febrili fermentationi uberrimam occasionem subministrat.

Hic obiter quæres? *utrum Infantes febre quartana laborent?* ratio dubitandi est, quòd hæc febris à temperamento Infantum prorsus sit aliena; cùm eam plerique ab humore melancholico frigido & sicco fieri asserant, Infantes autem sint calidi & humidi. *Resp.* Infantes ratione temperamenti insiti partium solidarum, non esse febri huic obnoxios, sed ratione humorum sæpè partibus non correspondentium id fieri potest, cùm æquè Infantes ex cibis ingestis & aliis circumstantiis cruditates plurimas acervent, ad generandam hanc febrem aptissimas; negatur præterea semper humorem atrum, ut alibi patebit, etiam in adultis esse hujus febris causam.

Pater

Paret ergò ut paucis repetam februm causam communissimam esse *lac*, vel *acescens* vel *bilescens*, vel *putrescens*; huic accedit *dentitio*, *gingivarum inflammatio*, *dolor*, *vigilia* &c. teste Hipp. 3. *aph.* 25.

Prognosis.

Febres ordinariæ communiter periculò vacant, cum causâ sublata spontè cessent: si autem corruptio lactis diu duret periculo non vacant, præsertim si alvi fluxus & vigiliæ, aut convulsiones accedant. *Quibus sub dentitione febris acuta accidit, à raro convulsionibus corripiuntur.* Hipp. de dentitione.

Curatio.

Febres omnes in Pueris causarum ablatione & symptomatum mitigatione tolluntur. Sunt aliqui qui *vomitoria* & in specie *syr. emet.* svadent, sed utinam tutò, nè causa mortis Medico imputetur; tutius quis meò iudiciò, procedet si *laxantia per alvum* exhibeat, quæ sæpè etiam per os evacuant v. g. *potiuncula mannata*, cum, vel sine *fol. senn. elect.* & *rhab.* item *cassia* &c. quæ etiam Nutrici dari possunt, ut per eam Infans laxetur. Sæpè cum effectu tam ante quàm post paroxysmum potissimum enemata injici curavi, vel domestica vel magistralia ex *jusculo pulli*, *cremore hord.* vel *sero lact. melle rosat.* vel *saccharo rubro* &c. *Dosis* enematum sufficiet ad *ziii.* vel *iv.* plus minus, pro ratione ætatis.

Profunt præterea *Acetosa*, *endivia*, *portulaca*, *fragaria*, & ex his *aquæ* & *syr. oxysacchara*, Nutrici vel Infanti data. *Emulsiones ex amygd. dulc. sem. frigid.* cum aquis suprâ dictis; item

Ss

Julapia

julapia ex aq. & syr. suprâ dictis ; quibus adhuc subjunge syr. acetosif. citr. borrag. granat. papav. rheat. violar. &c.

Universalibus præmissis , plurimum in febribus Puerorum faciunt *alterantia* seu *absorbentia* & *præcipitantia* , quæ nunquam sunt negligenda : inter cætera maximè laudatur *pulv. febril. Ludovici* vel sequens. *℞. Pulv. ocul. 69 gr. xij. cinnabar. ʒnij. gr. iv. M. f. Pulvis dividendus in 4. doses.* Plurimum etiam valet *Spir. sal. armon. correct. vel aromat. Vel loco hujus salia fixa card. bened. absynth. cent. min.* Tandem etiam *Arcanum duplicat. vel Nitrum antimoniat* : quæ sunt experta. data cum *aq. endiv. cibor. & eorum syrupis.* Plurimum etiam laudatur *Diascordium* ad aliquot grana exhibitum : magnas laudes meretur *Liquor C. C. succinat. Tinctura myrrhe , Antimon. diaphoret. rec. & rit. ppt. C. C. pblicè ppt. Ocul. 69. crudi aut ppt. Gelat. C. C. Infanti & Nutrici data.* Kufnerus hanc curam in febribus puerorum quadrimor, à Parente suo multoties expertam habet.

℞. Conseru. nymph.

rosar. aa. ʒj.

man. Xsti simpl. vel perlut.

trochisc. de campb.

Spec. diarrhod. Abbat. aa. ʒj.

Elect. de gemm. frigid. ʒi-v.

cum julep. rosar.

F. Mixtura.

Dosis ejus, avellanæ quantitas sæpius in die administrata.

In Febribus lentis ab obstructionibus expertissimum & evidens remedium est *infusio rhab. cum aq. endiv. v. g. ℞. Aq. endiv. ʒj. rhab. ʒj. ligatum in peria ster in infusione, aliquot horis.* *Dosis* omni die ʒiij. successivè in aurora , prius siquâ aliquâ

aliquâ expressione: continuatur tam diu, quousque febris & obstructions sint sublatae, vel datur *bacchetum rhab.* pro potu ordinario quod felicissimè operatur in febribus lentis, & fit hoc modò.

Rhab. elect. ʒʒ. vel ʒj. (prout Puer ægrius autè facilis ejus saporem ferre potest) crassiuscule tritum & nodulo inclusum, infunde in *aq. font. ℥ij. vel iij. frigida*, per diem integrum; ejus usus continuatur per mensem aut diutius si morbi contumacia id postulet.

In febre lenta cum cachexia laudat Felix Platerus ob felices successus suum *Pulv. cachect.*

R. Rad. ʒss. pœon. excort. aa. ʒj.
flor. rosar. rubr. ʒʒ.
N. M. parum tost. ʒij.
bacc. laur. par. tost. ʒʒ.
spica
squinanth.
croc. aa. ʒj.
pellicul. ventricul. ʒss. intest. gallin. ppt. ʒj.
croc. ʒis. aperit. ʒij.
cinamom. acerr. ʒj.

M.F. Pulvis subtilissimus.

Dosis cuspis cultri in vehiculo cōpetente.

Strobelbergerus in febribus adhibet cochlear unum vel alterum *Syr. viol. rosar. vel flor. persic.* quo fit ut materia peccans aut vomitu aut alvo rejiciatur: porrigit quoque *aq. flor. sambuc. cochlearim*, quæ simul si variolæ subint eas propellit: pro potu

dar *aq. acetos.* in qua dissoluta sit *Conserv. rosar.* & rursus expressa, nam sitim extinguit, & cor recreat; Alii pro potu ordin. dant *Decoct. C. C.* cum *gelat.* ejusdem. Nos pro potu ordin. Infantibus recommendamus illum quem titulo de isto proponemus, gratum & efficacem. Matres & Nutrices à vi. no abstineant. Externè etiam multa laudantur: Spina dorsi inungitur *ol. violar.* aut *ungv. rosar.* in *aq. lactuce* loto. *Casus recens* per taleolas dissectus plantis pedum imponitur. Nonnulli *pannum scarlatinum* ex *aq. solan. acetos. & rosar.* madefaciunt, ac hepatis regioni imponunt, cui si addideris *Spec. diatr. Santal.* erit efficacius.

De collo suspendatur *camphora.* *Carpis* manuum applicetur *Empl. febrifug. Mysf. vel Strobelbergeri.* Soliis pedum imponatur *raphanus.* Bona etiam sunt *cataplasmata* ad hypochondria ex *hord. cocto*, excorticato, *plantagine, solano & albo ovi.* Unguenta è *mucilaginibus cydon.* cum *ol. violar. rosar. nymph. & aceto rosato* mixta, ad hypochondria & spinam dorsi.

Riverius in *observ. fol. 662.* refert magnum Infantum latantium numerum fuisse mortuum, cujus causa acriusculum Nutricum lac inculpabatur, quod ventriculi inflammationem induxit; aderat enim frigus extremorum, sitis inextinguibilis, anxietas ingens, nausea, vomitus, diarrhæa: curati sunt postmodum *missâ venâ*, & postea ventriculi regioni applicuit sequevens *Cataplasma.*

℞. Farin. hord. ℥j.

mice panis albi ℥iv.

coq. leniter in lact. caprill. postea adde

succi solan. ℥j.

ol. rosat. q. s.

M. f. Cataplasma ad dolorem inflammatorium leniendum.

Ego loco hujus præferrem sequens & longa experientia comprobatur *Cataplasma*, utriusque hypochondrio applicandum, & quoties exsiccatur renovandum.

℞. *Pulv. oliban.* ℥iij.

album. ovor. No. iij.

ol. lini vel

amygd. dulc. modicum.

Fiat *Cataplasma* super stupam lineam extendendum.

Mutata (inquit Riverius) etiam sunt Nutrices; & Infantibus *mucilago Sem. psyllii* cum *saccharo pauco rosato* ex cochleari exhibita est: *jusculaq; pullosum* alterata cum *portulaca, acetos. aut lactuca.* Extra verò per dorsum animalia divisa calidè applicabantur ad calorem foràs extrahendum. In febribus etiam laudatur sequens *Unguentum* ab Aventino, qui plures Infantes à primo statim paroxysmo curavit.

℞. *Ol. rosar. violar. aa.* ℥j. *succi semper vivi* ℥iij. *bul.* lilant ad consumpt. *succi*, adde *pulv. croci* ℥j. Fiat *Unguentum* quò inungantur renes, & tota dorsi spina, bis ter vel etiam quoties de die.

CAPUT XIX.

De Puerorum Macilentia, Tabè, Phthisi, Atrophia, Hectica, & Fascinatione.

Affectus ille quem vulgus Germanorum *die Dörre / oder Adas Abnehuen* appellat, nihil aliud est, quàm corporis quædam consumptio, quâ Infantulorum corporea moles, præter

naturam dehiscit ac macilenta fit, quæ vel symptomatica est, & vermes, febrem, alvi fluxum, debilitatem ventriculi, erinones, fascinationem, luum veneream, phthisin, scorburum, scabiem, aliosque Puerorum affectus sequitur: vel aliunde ac præsertim ob alimenti inopiam, vel corruptelam, intellige à muco acido & viscoso, oscula & ductus lacteos obstruente & glandulas mesaraicas infarciēte: vel quandoque etiam à visceribus corruptis, vel etiam ab utero accidit, & originem ducit.

Dixi à muco acido &c. cum enim mucus acidus, crudus & viscidus, loco succi nutritii distribuendus sit, non possunt non eodem intestina, aut admodum incrustari, aut oscula aut ductus lactei eodem obstrui, aut glandulæ mesaraicæ consequenter infarci, unde tumores abdominis protuberant, & denegato nutrimenti transitu, insigni totius corporis atrophiam Infantuli contabescunt: accedente ut plurimum alvo laxiore, raceo (ut dictum alibi) hoc loco dyscrasiam lactis alieni, nempe Nutricis, vel inepti pro nutrimento, vel aliàs viciati, unde ibi atrophiam, hic cachexia supervenit: præcipue autem hæc omnia in Infantibus voracibus propter præproperam ingurgitationem frequentius contingunt.

Pro hoc malo profligando, variaz ferendæ sunt indicationes, & varia, partim excogitata, partim adhuc excogitanda sunt remedia: *indicationes* sunt sequentes: ut nimirum viæ occlusæ materiæ nutritivæ transitum denegantes, aperiuntur, si sint à tenaci materia & viscida, per *volatilia* & *aperitiva*, quæ alimenti depravationem ejusque visciditatem corrigent, & forti penetratione obstructos antea meatus reserabunt, de quibus supra de morbis in genere multa diximus: interdum etiam *leniter purgantia* remedia iteratò adhibenda, non verò fortiora quæ roridum liquorem simul educunt, & sic malum augment: inter

Inter lenientia laudatur liquor Tartari de qvo Barbette. lib. 3. cap. 2. observ. 3. Rhab. manna, pruna, & ex his parata quacun- que remedia: Syr. rosat. solut. flor. persic. domesticus. Arcan. dupli- cat. Myns. dosis tot grana, quot annos Infans habet: Conducit etiam Tinctura Otis malvatica in singulos ætatis annos ad gutt. ij. adaucta. Balnetur Infans in lacte caprino; vel bo- vino lacte fricentur sæpe membra, vel coquantur tria capi- ta vervecis in cerevisia secundaria, ex qvo jure lavetur In- fans sæpius.

Ex sol. hederæ quæ quercui adnascitur, destillatione, aqua prolicitur, de qua quotidie exhibeantur cochlearia tria; ea- demq. sol. siccatur. & in pulv. redacta ʒj. pondere, quotidie cum pulve aut syr. violar. præbentur: hoc sanè remedio, inquit Stro- belbergerus, Illustris quædam proles ob diurnam tussim ad summam corporis macilentiam redacta, sanitati fuit restituta, cui præterea dum hæc instituta erant, pectoris tota regio pinguedine gallinacea, diligenter fuit peruncta. Profunt etiam pulmenta ex amylo (vulgò Krafft: Mehl) & amygd. pineis & pistaciis confecta: multum præstat Cremor bord. gelatinæ simpl. vel cum rasur. C. C. eboris, viperis, destillata, consummata, contusa &c. Optima etiam sunt Decocta seu juscula capon. lima- cum, testudinum, hordeatum Prævotii, passularum: Nec minoris efficacis sunt Enemata nutrientia, ex decoctis, gelatinis, & suc- cis carnum, vitellis ovorum & lacte. Multi laudant Pilul. de cynogloss. laud. opiat. Quercet. vel Myns. Alii Succolatam Indam, Aurum potabile, vel Lac auro candente extinctum, & saccharo ro- sato mixt. Herba filicis singulari quadam virtute auxilium adferre, si faculo inclusa interscapulio supponatur: alii culcitræ eadem replent; nonnulli aquam inde destillat. cum saccharo cando in syr. concinnatam Infantulo præbent. Generosæ quædam Ma- tronæ sequens in arcanis habent: baccas lauri pastâ farinaceâ in- volvant, & in forno assant; demptas postea baccas, easque excor-

excorticat. pulverifant; pulveri huic addunt æquali pondere C.C.nucem moscat. præbentque de eo Infanti, parva tria acumina cultri cum jusculo aut pulve per mensem.

Elegans ac salutare est quod paratur *Ungu. ex rec. butyro, axungia porci, & ovis se vò*, colliqvatis ad lentum ignem, additoque tantillò *oleò ceræ*, quò calidè corpora perungantur. Vallet etiam *Axungia caponis*, vel *Ungu. Sylvii ex ungu. martiato, dialth. & oleo philosophor.* parat. vel *Empl. meliloti*, hypochondriis applicatum.

Notandum, quod si acidum austerum peccet & vasa disrumpat, ut nihil nutrimenti, ad partes externas mittant, profunt *Ocul. cancr.* qui & vulnerarii & absorbentes sunt. Sequenti *Mixtura* plures ablaſtatos curatos novit Dolæus.

*R. Aq. primul. ver.
è cancris
cent. min.
antibect. Schröd. aa. ʒj.
pulv. rasur. ebor.
C. C. ppt.
oc. 69. ppt. aa. ʒj.
corall. rub. ppt. ʒß.
tartari vitriol. ʒj.
julep. rosat. ʒvj. vel ʒj. M.*

dentur singulis diebus cochlearia ii: bis in die. Efficaces etiam sunt *Rotulæ* & quas parvuli faciliè allumunt.

*R. Sal. cachect. & lis Schröd.
ocul. 69. aa. ʒj.*

Fr. Vi.

ſr. vitriol. gr. xv.
lap. prunell. gr. vj.
Spec. diarrhod. Abb. ʒß.
ſacch. alb. ʒj. vel ij.

F. l. a. Rotulæ.

Palman aliis præcipit *Antibed. albiff. Poterii*. Item *Saccharum Saturni*, præſertim ſi adſint ſudores colliqvativi. Dolæus ſequenti *Mixtura* in colliquatione ſuum filiolum curavit, qui poſt paſtum ſemper collicbat :

ʒ. Væ mentb. ʒj.
cort. citr. ʒß.
ſal. abſynth. gr. v.
ol. mentb. ſtillat. gtij.
ſyr. ſenicul. ʒvj.

Misce detur cochleatim per vices. In paulò aduſcoribus cura *lactis* uſurpanda. Si affectus eſt ex lacte vicioſo, Nutrix purificetur vel mutetur. Si macies procedit à vermibus & cinoni- bus, cura eiſdem videatur ſequenti capite. Potiſſimum autem atrophiam à vermibus curat ſequens: nimirum *caſtorei ʒß. vel ʒj.* adhibitus, nam id ſatorem ſuo firmes ſtrenuè necat. Præterea atrophix medentur quoad intrà, *ſtercus de vacca nigra* adhuc calidum, calcinetur in olla nova, huius pulv. detur ʒj. Infanti, & per tempus puerperii extrà in balneo ſemper incoque *cortices ſalicis recentis*, quæ ſpecifica ſunt in aridura puero- rum. *ſc. Aquæ hæder. arbor. ʒj.* detur Puero. Eâdem *aq. fo- vea cordis* irrigetur, & venter cum *pingued. capon.* manè & ve- ſperi inungatur.

Inter externa pro humectanda & edulcoranda maſſa ſan- gvineâ profunt *balnea & fotus* ſeu fomenta, ex lacte vel decocto
 T c capitis

Ex Animalibus: *Alb. græc*: Axungia canis, catti, anaser. vulp. gallin. homin. taxi. Lac asine, mulier. capre, butyrum rec. lapis bezoar. os de corde Cervi, ostrea, rana, cancri, testudo, ova, limaces, rasur. ebor. C. C. carnes saniores, vipera, sangu. porcelli, medullæ.

Ex Mineralibus. Bos. armen. lapid. pretios. margarit. corall. hematit. sulphur, nitrum, magist. perlar. nitrum perlat. Specificum stomachic. Et antihæm: Poteri, Tinctura corall. &c.

Cum supra in titulo facta sit mentio fascinationis, de hac pauca quædam annexemus.

Fascinatio medicè considerata est maligna consumptio universi corporis, ob frustratam facultatem nutritivam totius, à vi malefica.

Signa fascinationis potissimum sunt hæc: Primo à juvenibus & lædentibus, cum nimirum morbus nullus remediis etiam exquisitissimis & rectè adhibitis non cedit, sed potius continuo deterioratur. Secundo quando Medicus expertissimus dubius redditur, & vix certi aliquid statpere potest. Tertiò quòd morbi naturales sensim incipiant, & sua tempora percurrant, fascinati autem nullis sæpè præsentibus causis & materia peccante, statim suo vigore destitui videantur. Quartò quòd se ralia & tam atrocia symptomata exserant, quæ inusitata, & quorum nulla ratio dari potest; crebro etiam variant nullò servatò typo, & ægri modò de hoc, modò de alio dolore conquerrantur. Quintò quando ægri, vel adstantes nihil committunt, vel delinquunt, quod ansam morbo præbet. Sextò si acus, pili, vitra, cultri, flocci, lapides, & alia talia toto genere præter naturam, per vomitum, alvum, vel sudorem rejiciantur, aut ex ulceribus & abscessibus erumpant; quod signum omnium est certissimum. Septimò si Saga vel veneficus aliquis ad ægrum

accesserit, statim ille pejus senserit, horrore vel tremore correptus sit, ploret, vel alia mutatio insæta percipiatur.

Curatio, fascinationis duplex est: *Naturalis*, si nimirum per causas naturales à Dæmone vel Sagis immutata sit corporis constitutio & humores, & sic introductus morbus. *Divina* (nullatenus verò magica quæ dedecet Medicum.)

Hæc curatio fascinationis peragitur *evacuantibus* humores vitiosos, quibus Diabolus utitur in morbis inducendis: *Secundò aliter antibus alexipharmacis* specificè contrariis à Diabolo introductis, qualia sunt sequentia:

Herbæ & Folia: *Abrotan. adianth. aureum, alyssum, anethum, antirrhinum, arthemisia, baccharis, bethonica, buxus, calamientha, cent. min. chamæpytis, cupressus, eruca, filix; hypericum, laurus, lunaria, marrubium, melissa, mentha, herba paris, pyrola, ricinus, rosmarinus, ruta, sabina, salvia, sclarea, scordium, scrophularia, senecio, syderitis, tussilago, verbenæ, vinca per vinca.*

Flores. *Aster atticus, hyperic. pæon. ros. rubr.*

Semina. *Antirrhini, aquileg. bethon. card. bened. citri, feniculi, hyperici, petrosel. macedon. santonici.*

Fructus & Baccæ: *juniperi, herbæ paris, tiliæ, visci corylini, fungi rubri, ossa dactylorum.*

Aromata: *Caryophylli, cinamom. nuc. moschat. piper, Zinziber.*

Gummi & Resinæ: *Assa fætida, benzoe, galbanum, laudanum, mastiche, myrrb. styrax, calamintha, thus.*

Cortices, *Musci*: *Citri, fraxini, muscus clavellatus.*

Ligna

Ligna, Visci: *Agallogum, asphaltum, corni, cotoneum, lauri, fraxini, santali, viscus ex corylo & quercu.*

Radices: *Allii, angelicæ, aristolochiæ, utriusque, cyclaminis, filicis, pæoniæ maris, satyrii, squillæ, scorzonæ, succisæ, vinetoxici, urticæ.*

Animalia: *Ambra, coreum & sanguis asini, cornu caprinum, cranium & rostrum lupi & vulpis; dens hominis mortui vel canis, muscus, ossiculum cruciformæ ex capite lucii piscis, sanguis canis & catuli nigri, sanguis primi menstrui, vel secundina primiparæ, stercus hominis jejuni, ungula asini.*

Mineralia: *Adamas, amianthus, aqua ex ore equi masculi non castrati potantis elapsa, collecta & hausta, carbunculus, corallia, gagates, hyacinthus, jaspis, magnes, margaritæ, Mercurius vivus, saphyrus, sarda, silices, smaragdus, succinum, sulphur.*

Ex his suprâ dictis fiunt varia remedia, *Aquæ, antidoti, balnea, infusio, cataplasmata, cere-visiæ medicatæ, confectioes (uti est confectio alkermes, de hyacintho, smaragdina) conservæ, decocta, emplastra (uti est ex assa fetida, fatidum Myns.) essentia, extracta, olea, pulv. sacculi, salia, syrapi, species, suffitus, spiritus, theriacæ (uti est Veneta & Celestis, orvietanum) tincturæ (uti est Bezoartica Michaël. corallorum, hyperici Myns. contra impotentiam & incantationem Grülingii, smaragdina cum Spiritu urinæ fact. Schröd.) unguenta (uti est Karrichter, Henrici ab Heer sympathicum.)*

De his & similibus vide plura in Karrichtero, Sennerto, & Zacuto.

Puella novennis à fascinatione sequenti remedio curata est:

Tt 3

Bl. Adi-

*℞. Adipis canis bene liquati ℥iv.
urfi ℥viij.
caponis ℥ij.*

Tres truncos visci corolini adhuc virentes, frustulatim sectos & tusos ut humescant, contunde autem simul lignum, folia, baccas; misce omnia in phiola, quam cum soli 9. septimanis exposueris, virentem balsamum extrahes, eoque ægrorum corpora maximè loca dolentia & juncturas inunges, & certò experimentò curabis.

Si Infantes ob incantationem semper plorant & inquieti sunt, insideant Decoctò ptarmicæ Matthioli & hypericonis per 9. dies, postea suffumiga Infantem sequenti. ℞. Visci in tilia crescentis, carbonibus impone & suffumiga.

CAPUT XX.

De affectione illa puerili, quam Medici Comedones, Dracunculos, Crinones, vulgus die Mitesser vocant.

Affectibus priorì capite recensitis, pedissequus est, aut sanè individuum comes, cutaneus quidam affectus qui puerulos mirè vexat, & in extremam maciem trahit, ortum habens (ut antiquitus loquebantur, quid autem Neoterici sentiant mox dicetur) à prava & corrupta corporis alimonia, ob quam humores quidam putridi, quos membra pro nutrimento respuunt, ad cutim naturâ forsan duce propellunt, qui ob suam crassitiem, dum sub cute ac præsertim ipsius poris retinentur, nec diffilari possunt, à nativa Puerorum humiditate ac vitalis caloris primor-

mordio quasi animantur, & vermiculos perexiguos imitantur, qui deinceps in sui nutritionem omniabrepto alimento, extremæ maciei in puerulis causa existunt.

Multipli olim erant, & adhuc sunt Medici, qui hæc animalia viva esse non credunt; sed experienciâ à Neotericis per microscopia factâ, viva omnino deprehensa sunt hæc animalcula; hinc est quòd Infantes hoc malo detenti alimenta voracius & largius appetant, & tamen continuo deficiant: & ideò etiam dicuntur *comedones*, ab adjuncta Infantis rabe, quasi nutrimentum largius comedendo absumunt, & ideò Germanis *die Mitesser* oder *Zehe*: *Würmer* vocantur; dicuntur etiam *Crinones* à figura, quòd crinium seu pilorum curtorum nigrorum formâ, foràs interdum per cutis poros prominere soleant.

Differunt à Sironibus seu istis vermiculis minutis quasi pedicularibus, in pustulis prurientibus sub cuticula manuum & pedum enatis, quia horum & illorum, hoc est Sironum & Crinonum formæ per microscopium consideratæ differentes planè deprehenduntur.

Sunt ergo dicti Crinones vermiculi, capillorum spissorum, seu setarum formâ curtarum, nudo oculo aspicienti se exhibentes, quando nempe mellis affrici dulcedine & allesti in loco calido foràs prorumpere non nihil, frigoris verò ipsis inimici sensu, denuò intrò repere observantur: accuratius tamen per microscopium advertuntur; sic enim coloris cinerei, cornubus binis longè prominentibus instructi, oculis rotundis glandiusculis, caudâ oblongâ in fine filosâ, unò verbò aspectu horridi intueri solent. Hæc animalia magis occupant loca musculosa, imprimis dorso, hinc scapularem, humeri, surarum & crurum sub cuticula.

Infan.

Infantes imprimis teneriores, rarius ebustiores affligerrō solent.

Causam jam paucis suprà ex mente Veterum innuimus, nimirum originem suam habere à suppressà sensibili transpiratione, quæ teste Horstio, sit temperata materia dulcis & pinguis licèt, diutius tamen retenta ad putredinem ruit, unde occultata antea & oppressà penitus principia seminalia, quæ & in minimo atomo imperceptibili sensibus latere possunt, sui juris facta, destinationes naturales exequuntur, & in viva animalcula prouunt: nimirum in lacte v. g. ratione alimentorum ex quibus generatur, non secus ac in pulte, milleformia insectulorum & vermiculorum latent semina, quæ in tenello Infantuli stomacho, non adeò exactè alterata, facile datà occasione evigilare, & in actum secundum erumpere valent: hinc nonnulli hos crinones, illis vermiculis seu ascharidibus similes asserere volunt, qui in antiquis caseis nascuntur,

Hi ipsi crinones animati, molestiam admodum prurientem & continuò lacescentem, plus minus tamen, sub cuticula admodum sensili excitant, indeque inquietos, ejulantes & vigiles reddunt Infantes, quibus sæpè sæpius licèt porrigant mammas Nutrices, quas quidem exhausti, nihilominus tamen inquietudine, vigiliis, ploratu confecti, minus dictum alimentum concoquere, aut ritè assimilare possunt, donec, ut diximus, tandem emacientur, & ità successivè in tabem prouant; quamvis, ut candidè cum Ettmüllero existimem, non tam ratione nutrimenti à vermibus exhausti, quàm ratione symptomatum ab ipsis inductorum, maciem & tabem consecutivè supervenire.

Curatio: Tollendū hoc malum peculiari artificio propellitur. Ex cinere ligni quercini fiat *lixivium*, cui imponatur per

per noctem *Sacculus stercore pullorum Gallinaceorum repletus*; Sequenti die Infans deducatur in vannum, ibique infideat dicto lixivio calefacto, usque ad collum, per semihoram plus minus, quò factò detineatur per aliam semihoram in sudatorio extra lixivium, ut probè sudeat, toto corpore prius *melle* inuncto: Sudore autem peracto, deradatur univèrsa cutis cum cultro rasorio, eò modò, quò aliàs barbæ rasura peragitur: hoc remedio, si ter per septimanam continuetur cura, Pueri ordinariò sanitati restituntur.

Alij rem sic peragunt: deducunt Puerulum in stufam donec prorumpat sudor. Deindè scapulas perungunt *pulte ex melle & farina triticea paratâ*; hac ratione brevi pòst, multi, exigui, & acuti vermiculi prodeunt, qui similiter cum rasorio deradi debent. idipsum elapsò ostiduo rursus institui necesse est, & quidem toto corpore, præter caput; sic enim & indè vermiculosa illa progenies prodibit, quæ rasorij cultri acutie demetenda venit.

Nonnullis eodem plane effectu *Zedoaria in lixivio quercino decoquitur*, quò Infans ante & post rasuram in sudatorio diligenter abluitur.

Nec desunt qui Puerulo majorenni in balneum deducendo, *pulverem seminis sinapi* exhibeant, qua ratione excrementosa sordities commodius propellitur. Ettmüllerus præservativè & curativè laudat *Tincturam sinij* ad aliquot guttulas datam, & post hanc, balneum, & quidem ad illos eliciendos summo opere suadet *balneum aquæ dulcis*: cui parum *mellis* addatur indè dulcedine decepti vermiculi, per poros cutis capitibus prominent, qui vel cultro vel unguibus, vel pane tosto vel novacula abraduntur. Mulieres dum dorsum melle illinunt, postea cultro rasoriò capita vermium allectorum abscindunt.

Timæus laudat *aquam aloëticam* externè quotidie dorso illitam; profunt & frictiones cum *aqua mellis & farina*, & subsequens ratio cum cultro,

Zacutus Lusitanus Infantum tabem dorsalem curavit, exhibendo ter *castorei* ꝯj nam castoreum satore suo vermes struere necat.

Nos experientia edocti cum Dolzo & Ettmüllero, *aquam Hermeticam*, seu *Decoctum grij vivi*, uti scabiei & lumbricis optime conferre solet, etiam hic conducere affirmamus, in balneo enim hac aqua ablui possunt Infantes, & sic absque periculo hi vermiculi necantur; non omissis tamen *antibeticis* & *anthelminthicis* supra de vermibus dictis.

Laudatur etiam in hoc affectu *decoct. rad. bryoniae, balneum, in lixivio cinerum quercus facto*. Internè etiam optime facit *Tinctura tñij rit. fact.* & data ad paucas guttas.

CAPUT XXI.

De Prunella Infantulorum, vulgò, die Mund, Bräune.

Affectus hic puerulis frequens & molestus satis, nihil aliud est quam calida effusio ac phlogosis, non solum linguam, sed magis palatum, non raro etiam totam oris cavitatem inficiens, non aliter ac si milio conspersa esset integra oris regio.

Causam seu ortum ducit à *lactis corruptela*, & nimia à Matre communicata caliditate.

Curatur sedula purificatione, ex *aqua prunelle* & *fragorum*, addito *croco* & *alumine*, prodest quoque *diamoron* & *dianucum*; expertum etiam est *decoct. chamomill.*

Hoc vitium etiam non raro ab oris intemperie in recens natis natum, à cretaceo quodam excremento ad oris internas partes, & totam linguam adhærescente, vulgò in Gallia cancer albus teste Parzo, appellatur, lactandi libertatem intercipit, mox in ulcera ad fauces & gulam serpentina degenerans,

rans, mortis causa interdum existit: quod nè accadat, medendum ipsi est deterfione paratà ex linteolo, bacillo alligato, & immerso in medicamentum mediocris consistentiæ, ex ol. amygd. dulc. melle & saccharo paratum: hoc enim blandè affricto madefactæ & deterfæ sordes eluuntur,

CAPUT XXII.

De Vigilij, Insomnij, seu Pervigilio Puerorum, wann die Kinder aus der Ruhe kommen.

Quemadmodum somnus arcanum est in Medicina, supra omnes gemmas & lapides pretiosos æstimandum, utpote quò Pueruli mirum in modum reficiuntur ac recreantur; ità nihil pejus his accidere potest, quàm ipsius somni, atque ideò omnium virium naufragium ac privatio.

Vigiliæ, seu insomnia, seu pervigilium est facultatis dormiendi imminutio vel abolitio. *Cause* sunt multifariæ: 1. continuus & immoderatus spirituum animalium vel vaporum ad sensus & motus organa influxus. 2. dolor in quacunque corporis parte. 3. ardor capitis. 4. pruritus. 5. scabies. 6. tubercula. 7. pustulæ. 8. angustia pectoris. 9. tussis. 10. calorigenas. 11. aphthæ. 12. vermes. 13. ventriculi affectus. 14. cibi copia, maxime vesperti. 15. somnia terrifica. 16. fames vel sitis. 17. malus decubitus. 18. stricta ligatura. 19. linteaminum asperitas vel immundities. 20. tumultus, vel strepitus. 21. luminis splendor. 22. frigus externum. 23. cimices, pulices, pediculi, muscæ, iæctus, morsus, &c.

In curatione igitur hujus mali ad causas prædictas respiciendum est, quæ removendæ sunt omnes & singulæ; hac tamen additâ & adhibitâ cautione, cum somnifera ferè omnia algida sint, præsertim opiata & narcotica, ut moderatè ijs utamur,

nè in epilepsiam aut soporem Pueros præcipitemus; proinde potius Nutrici somnum conciliantia adhibenda, sed tamen etiam moderata. Quæ citra omnem noxam (cautè tamen adhibita) prodesse possunt, sunt sequentia:

Interna sunt Pulv. anodyn. syrup. d. papav. errat. papav. alb. Aq. anethi, aq. flor. persic. hypnotica, nymphae, papav. rhæad. rosar. verben. violar. Confectio alkerm. theriaca cœlest. conservæ ex prædict. aq. Diacod. Mont. Emulsiones, Syrupi ex prædict. aq. Spec. diambrae, diamosci dulc. theriaca recens, bordeatum Prævotij, jacula ex lactuc. & sem. papav. albi, Nutrici vel Infanti adhibita; vel pulcicle ex farina triticea & lacte, incoctis sem. papav. alb. lactucæ, portul; lac caprinum in quo unum vel alterum caput papav. coxerit, jucundam conciliat naturæ quietem; nam papaveri rarus est & efficax ac mirabilis somnium inducendi usus, cum vel solus florum rec. odor id præstet. fiat etiam amygdalatum hac arte. R. amygd. dulc. mundat. ʒj. sem. papav. alb. ʒij. sem. 4. frig. maj. ana ʒʒ. macerentur horis 6, in aq. frigida, deinde contunde in mortario & ducantur per eribrum cum aq. lactucæ aut nymph. fiat edulcoratio cum saccharo.

Pulvis meus somniferus efficacissimus hætenus observatus, sequens est:

R. Capit. papav. alb. c. sem. ʒvj.

spec. diatrion sant.

cass. lign. ana ʒʒ

squinanth. gr. v.

fl. cordial. ana ʒj

sem. anis.

carv.

coriandr. ppt. ana ʒij

croc. gr. xv.

sacch. alb. ʒvj

Pulvis. Dosis: culpis cultri, plus minus, M. F.

Nutrix

Nutrix utatur ut diximus mox antè, somnum inducentibus, ut *jusculis ex lactuc. papav. &c.* & si lac ipsius vitiosum sit corrigatur. Pro arcano habentur *officula auditus porcelli*, in pulv. redacta & exhibita.

Nota; licet aliqui etiam sint, qui saltèm gr. j. *laud. opiat.* suadent, ego tamen ob ténacitadinem & metum potius abstineo, & securioribus alijs contentor.

Nota secundo *croci* usus, primò ob vim calefactivam & liccantem, secundo quia potius sensus excitat, & spirituum motum inducit, unde cor recreare dicitur, per se & solus suspectus est, si autem alijs *refrigerantibus* & *corrigentibus* permisceatur, bonum sæpè præstat effectum.

Externa: inter externa laudantur *epithemata* & *frontalia*, sunt & *pediluvia* ex quibusdam supradictis internis: *Ungv. alabastr. popul. rosat. simpl. vel Mesue. Ol. nucistæ, succin. rosar.* Cataplasma ex *nucleis persic. cum sem. papav. & lacte muliebr.* ac modicò *croci*; *Decoct. capit. & sem. papav. alb. in aq. simpl.* pro manuum & pedum lotionibus ante somnum; *aures leporis*, pulvinari suppositæ; *lac suillum* temporibus & fronti applicatum. *Catvaria hominis* sub pulvinari posita; *pinguedo lucij piscis* naribus & plantis pedum inuncta. R. *Sem. papav. alb. ʒj. nucleor. persic. n. ij. cum lacte muliebri* fiat Cataplasma ad tempora, cui adde momentum *croci*.

R. *Ol. papav. express. ʒj*
nucist. express.

Uny. popul. ana ʒß
ol. stillat. aneth. gutt. v.

Misce pro inungendis temporibus. *Medulla ex pedibus cervorum vel boum*, quâ tempora & plantas pedum inunge, & egregiè proderit. *Madeat crocus in lacte muliebr.* quò sæpius inunge tempora. R. *Sem. papav. alb. ʒij. maceretur in aq. majoran.* ac postea contunde in mortario: tandem in tripodio &

Uu 3

ad

ad prunas ebulliat, id, quod pingue supernatat, legrega, tempora illinendo. *Ol. nuc. moschat. express.* cum tantillo ungu. popul. vel rosacei, in aq. lactuce loti, mixtum, cum bono effectū adhibetur,

Naribus inunge *Ol. violar.* cum succo lactuce mixtum; lotiones pedum fiant ex decoct. summitatum anethi, malvæ, salice, vite, capit. papav. &c. magnus enim pedum cum capite est consensus ob circulum sanguinis; affecto enim & alterato sanguine pedum, ob peritrophen ad cerebrum per venas perductus, similem illi infert impressionem & alterationem, hinc *pediluvium* tam ad somnum conciliandum, quam alios bonos effectus præstandos & affectus corrigendos multum præstant.

Tutissimum autem & facillimum remedij genus ad inducendum Infantibus somnum, sunt *cantilene*, sonus, sonitus aquarum ex alto cadentium, lenes frictiones, balnea aqua dulci, cum lacte permixta, lux, & mox tenebræ &c.

CAPUT XXIII.

De Puerorum Incubo, quem Græci ὀνείδιον vocant, Germani, den Alp / die Trudt. Item de Pavore, vulgò das Schrecken und Auffahren der Jungen Kinder in Schlaf.

PAVORES nihil aliud sunt quam concussiones in somno, seu somnus perturbatus cum terribilibus insomnijs & ejulatibus, potissimum à nimia alimenti copia, ejusque corruptione & aciditate ortus, suâ acrimoniâ non tantum ventriculi & intestinorum fibras rodente, sed spiritus aggrediente, illos impetuosos reddente, ut totam tenelli machinam concutiant, & tandem epilepsæ prodromi existant; hinc etiam *lac corruptum* & *vermes*, potissimæ cause sunt hujus effectus, de quo etiam loquitur Hip. 3. aph. 24. Et certè indubitatum est, quòd ab
explo-

explosivo spirituum animalium impetu in nervos, pavores potissimum contingant, qui spiritus, cum sub somni requie blando & tardo gressu influere debeant, impetuosius irruentes, inopinatam totius corporis ex fibrillarum nervearum momentaneo contractivo nisu inferunt concussionem, adeo, ut non ineptè (sicut diximus) ipsis etiam mulierculis prodromi habeantur convulsionum epilepticarum Infantibus familiarium; ex simili nimirum inordinato & perverso spirituum animalium motu in cerebro, à violenta explosione oriundarum.

Infantuli hoc malò correpti, præterquam quòd gemant ac quassentur dum dormiunt, & excussi mox somno vehementer ejulent, etiam calor & color illis alienus est à lege natura.

Curatio. Dietam debitam Nutrix observet, temperatè vivat & bibat, a motibus animi caveat, etiam Infans parcius lactetur & nutriatur, & à cibo vel lacte non statim somno tradatur, quousque cibus à ventriculo bene receptus sit. Detur etiam in *pulte* vel alio vehiculo *pulv. mechoacan.* §j cum *fecul. pæon.* mixtus vel loco hujus; *magister. mechoacan. cum nucibus pineis* subact. *ad gr. iij. vel iv.* plus minus, pro majori vel minori ætatis constitutione; vel detur *mel rosat. saluti.* ad cochlear. j. vel *ol. emygd. dulc.* pro vomitu ciendo &c. ut nimirum his & similibus materia peccans tollatur, & nè cibi porro corruptantur: potest etiam per triduum dari dimidium cochlear *mellis simpl. depurati*, omni mane jejuno stomacho, quod potenter abstergit. Nostræ Mulieres adhibent cum *pulto* vel *lacte sem. aquileg.* §j. Alij *Pulv. March.* vel *Pulv. de Gut-teta* grana aliquot.

Post hæc ad specifica & confortantia accedendum est; pro-sunt, *secule pæon. smaragd. ppt. magist. corall. spec. diapler. Archont. Pulv. contra somnia terribilia Timæi. spec. diambr. diamosci dulc. specific. cephal. Michaël. succin. alb. ppt. Tin-ctur. corall. item aq. matrisariæ* cochleatum data.

- ꝛ. *Specif. cephal.* ʒj
Smaragd. ppt.
ſæcul. pæon. ana ʒj
 M. F. Pulvis. *Dofis* cuſpis cultri
 ꝛ. ▽ *pæon.*
menth. ana ʒʒ
ſyr. de menth.
pæon. ana ʒiij
 M. Detur cochleatim
 ꝛ. *Magiſt. corall.* ʒj
ſpec. diapler. Archont. ʒj
ſacch. in ▽ roſar. ſolut. ʒj
 F. Rotulæ pro lubitu ſumendæ.

Nota primo, ſi malum ſit à febre aut vermibus, cura eò etiam dirigenda erit, ut prius febris & vermes curentur. Nota ſecundo, Infans modò uni, modò alteri lateri incumbat, & raro aut nunquàm ſupinus collocetur. Nota tertio, ventriculū quoque tam intrā quàm extrā roborandum eſſe, cui conveniet *ſyr. abſynth.* quatenus ejus ſuccus cum ſaccharo temperatus, antecedenti cauſæ, nimirum corruptioni ingeſtorum in ventriculo convenit: nec obſtat quòd abſynth. caput gravare dicatur, & ſuo calore exhalationes augeat, & ſomnum immaturum ænoxium introducat, nam primam noxam corrigit ſaccharum, & ſi juſto tempore detur, altera noxà non eſt timenda, nec ſomnus immaturus timendus, quia ejus cauſam corrigit.

Extrà conveniunt *corallia* collo appenſa: *cornua ſcarabai*; *dens lupi rad. pæon.* juſto tempore collecta. ꝛ. *Ol. ſtomachal. Craton. maſticb. nuc. moſchat. ana* ʒj. *ol. menth. gutt.* ij. M. pro ventriculo inungendo. ꝛ. *Empl. de cruſta panis, ſtomachal. ex ladano Craton. ana q. ſ.* malaxetur cum *ol. ſtomach.* Craton. & extende ſecundùm artem pro ventriculo. ꝛ. *Rad. pæon. ʒʒ. ſem. aniſi, pæon. ana* ʒij. incis. & contus, ſiant

fiant s. a. duo sacculi pro capite. Pavorem omnem in somnis pellere dicitur *anisum*, pulvinarijs culcitrisque inspersum, vel sacculo inclusum, & capiti appositum, ut suo odorato spiritu cerebrum imbuat. Ex *ol. nuc. moschat. express.* ʒi additis v. guttulis *ol. anisi destillati* fiat Linimentum temporibus illinendum & naribus.

Generosis quibusdam foeminis hoc usitatum & salutare est.

☞. ▽ *lavendul.*
meliss. ana ʒi
pulv. santal. citrin.
sem. pæon. ana ʒß

Fiat Epithema, quò scarlatâ madefactâ calidè pectori imponatur.

Pulvis rad. fumar. bulbos. carbonibus ignitis injiciatur, quo perfumentur Pueruli. Occultâ vi terrores nocturnos arceat *dexter lupi* vel etiam *ursi oculus* collo appensus. *Vesicatoria* cervici aut pone aures etiam applicari possunt. Plura si quis desiderat, videat Forest, lib. 10. obs. 50. pag. 37. 8. in Scholijs.

CAPUT XXIV.

De Puerorum Convulsione & Epilepsia, vulgò die Traiß.

Convulsio est nervorum muscutorumque versus suam originem perpetua & involuntaria retractio: Causas easdem agnoscit quas epilepsia, quæ alijs morus convulsivus dicitur. Potissimum autem ab Authoribus statuuntur dux: *repletio & inanitio*. Convulsio triplex est: *emprostotonos, opisthotonos & tetanos*. Prima versus anteriora, Secunda versus posteriora, Tertia versus utramque partem, membra convellit. Differt ab epilepsia, eò quòd in hac sensus externi & interni laedantur,

Xx

estque

estque potius motus convulsivus seu interpolatus, quam vera convulsio: at in convulsione est perpetua retractio, quæ à principio usque ad finem affectûs durat, in epilepsia autem post paroxysmum cessat, & revertitur; neque in convulsione sicut in epilepsia actiones animales exteriores laeduntur.

Curatio proinde etiam erit eadem, quæ epilepsiz. *Epilepsia* aliàs Puerorum noverca dicta, est motus convulsivus interpolatus totius corporis, cum actionum principum, sensûs & motûs depravatione, ab irritatione facultatis expultricis, à subita & inordinata spirituum motione & disordine ortus; cuius *causæ* rursus sunt vel nativa propensio, vel humores pravi, vel vitium dietæ, seu lac corruptum, variolæ, mobilli, febres, dentitio, & alij similes morbi, caput & systema nervosum in consensum trahentes; vel quocunque modo afficientes.

Ut autem rem totam de hoc funesto tenellis Infantibus symptomate reddam clariorem, sciendum, quod frequentissimè nervi sexti paris, vulgò vagi dicti, & intercostalibus ramificationibus annexæ partes abdominis & thoracis, convulsionibus epilepticis tententur adhuc terminosis, ut muliereulæ, aliàs commiserationum matres, hunc affectum germanico idiomate: *die schwarze Noth in Leib* / appellaverint. Est scilicet continuus & nunquàm interruptus spirituum animalium in hos nervos à natura institutus motus & influxus, pro continuando motu cordis, diaphragmatis, & respirationi inservientium musculorum primariorum, ut & ventriculi & intestinorum motu peristaltico perficiendo; in adultis consueo quasi tramite longè promptius irruunt in dictarum partium nervos spiritus animales, quàm in Infantibus in membra externa (ob infasciationem) quæ magis quiescentia sunt, adeoque dictos spasmos internos frequentius concitant. Quod si verò crebrius reperant, tandem totum spirituum animalium exercitum, integrumque nervorum systema, per consensum & continuationem motûs similiter afficiunt, unde universalis tandem supervenit epilepsia, totius nimirum corporis.

Has

Has ergò & similes passiones nervosarum sensibilium fibrarum, quocunq; in loco irritationem consequentes, unde melius deduci possunt, quàm ex suprâ & infrâ sæpius insinuatò & insinuandò acido, per se nervis inimicissimo? multò magis verò in tenellis Infantibus, quorum fibrarum nervearum mollior textura faciliè mobilis, & ita in convulsivos motus flexibilis existit. Hinc quæ propiores sunt partes fontis vitiosi acidi, stomacho nempe & intestinis, aut iisdem mediantribus nervis connectuntur, etiam frequentius patiuntur convulsivos motus seu spasmos, qui ulterius in tantum continuati, donec totum nervorum systema in cerebri & cerebelli confinijs concutiant, universalem tandem epilepsiam, superveniente spirituum impetu inferant: sicuti in adultis subindè in membro quodam externo locus latet epilepticus, qui per continuatos spasmos, sub apparente auræ frigida sensu, sursum delatus ad cerebrum, tandem universum microcosmum concutit: Tale exemplum quondam in hac cathedra protulit piæ memoriæ Petillustri & Famossissimus Professorum Professor Franchimont, de quodam Cive Pragensi, qui ex abscessu in pollice pedis se per exiguum tuberculum monstrante, aurâ quâdam rigida permeante ad cerebrum, in motus epilepticos incidit, eò verò apertò, omnis convulsio cessavit. Ità pariter ex acido imprimis viscido, in abdomine hærente, tam spasmi leviores interni, quàm epilepticus totius corpusculi insultus oriuntur, optimè ob id per alcalia volatilia (experientiâ teste) curabiles: adeò ut rarissima sit epilepsia, cujus focus acidus non in abdomine lateat, aut ex abdomine non deriveretur, exceptò dentitionis negotiò, ità tamen, ut cirra halitum aut fumorum impossibilium ascensum, malum dictò modò explicari queat. Hinc fit, quòd melancholici faciliè fiant epileptici, humor enim ille acidus naturam vitrioli habet, imò successu temporis venenum Hyj & Oli induit, & tales vapores noxios & lethales ad caput transmittit.

Hic occasionaliter reticendum non est; quod in hoc casu oporteat confugere ad principia Hermetica, si occultas illas qualitates Veterum Chymicis tantopere exolas declinare velimus.

Willis causas hujus affectus *procatarticas* & evidentes ad *membrorum imbecillitatem* & *viscosâ humiditate scatentium* deducit, cerebrum enim in illis minus firmum; atque nervorum tonus valde laxus, ut leviores cujusvis materiz impetus vix sustinere possint; quin spirituum affluxu copiosiore, & tantillo robori impari, facile in motus irregulares, sive spasmos incitentur. *Internam causam* statuit *sanguinis impuritates*, à talibus causis evidentibus in effervescentiam & irritationem solito majorem concitatas, ad quod plurimum etiam præstat aeris in frigore & calore excessus, & ejusdem mutationes lunaticæ.

Circa duo potissimum tempora Pueri convulsionibus maxime obnoxij reperiuntur, scilicet intra primum à partu mensem, & circa denarium eruptionem, licet alia tempora etiam non excludant.

Dicunt vulgò Authores, quod à *latte corrupto* in ventriculo hic affectus potissimum oriatur; ubi tamen nota, hoc & facere aliquando lac dulce, quod præsertim à vaccis redditur paulò post partum, quod facillimè corrumpitur & æscit. Idem tenemus de *saccharinis*, quæ mel in ore & sel in corde sunt.

Epilepsia Infantum plerumque sympathica est, & fomitem habet vel in ventriculo, vel intestinis; in quibus supra dictum acidum fermentativum suâ acrimoniâ ventriculi fibras rodit, vellicat, & tandem spiritus aggrediens, impetuosius irruunt, & ut diximus totam tenellam machinam concutunt; cui acido accedit sabutra viscida & bilis in intestinis, quæ cum acido effervescendo idem præstat.

Curatio Epilepsiz Puërorum, potissimum in sequentibus consistit, *Primo* ut sex rerum non naturalium exacta habeatur ratio in Nutrice & infante, præsertim vero cibi & potus; vitanda ea, quæ

quæ faciliè corrumpunt & coagulant; & eligenda, quæ sunt boni succi & facilis digestionis; vitanda igitur lacticia, pultes ex lacte, & lac Nutricis vitiosum; danda potius *pulmenta ex jusculis cum pane cocta*; remotâ pinguedine & sale: *potus sit aqua bordei cum sem. anisi & liquiritiâ, rasurâ eboris &c.*

Nutrix, ut superius jam inculcavimus, exactam observet dietam.

In paroxysmo ipso generaliter valent *jussumigia ex ruta*, vel *galbano*, vel *asa fatida*; vel *frictiones* partium, maximè *nucha*, *apertio manuum*, *odor aq. birund. &c.* Extra paroxysmum verò Paulus de Sorbaic omni manè exhibet \mathfrak{B} vel \mathfrak{ij} . sequentis *Electuarij*.

\mathfrak{R} . Pulv. sem. pæon.
carth. min. ana \mathfrak{zj} .
N. M.

mitbridat. ana \mathfrak{zj} .
mell. opt. despum.

vel Syr. de beton. parum.

M. F. Electuariûm, quò exhibitò statim Infans applicetur mammillis, ut id cum lacte deglutiât, deinde supra commissuram capitis insperge parum sequentis Pulveris:

\mathfrak{R} . Granor. pæon. \mathfrak{ij} .
N. M.

cardamom.
caryoph. ana \mathfrak{ij} .
rosar. rubr.
corall. rubr.
myrtillor. ana \mathfrak{zj} .

M. F. Pulvis, qui tertio quoque die renouetur, supra caput inspergendo.

Sequenti linimento spina dorsi infantis inungatur. \mathfrak{R} . Ol. rut. humbr. ana \mathfrak{zj} . ol. castor. \mathfrak{ij} . M. F. Linimentum. Commen-

dat etiam unicornu fossile ad ʒj. plus minus exhibitum: Infallibile remedium asserit, si *rad. imperatoriæ rec.* dissecta pollicibus rām manuum quām pedum alligetur. Si verò ventriculus multum laborer, laudat *chyllam Theophrasti*, seu *Plum alb.* à gr. j. ad ij. si verò decennis sit ad ʒj. exhibitum, nam susque deque materiam movet. Unzerus laudat *gut. iij. vel iv. fellis catelli* adhuc sugentis, pro tæmina sæmellæ, pro puero carelli. Hæcferus in suo *Hercule Med.* expertum habet usum *cran. human.* in puero: purgabat illum prius *Pulv. jalap.* à ʒß. ad ʒj. cum *sol. Ori* & aliquot gutt. *ol. cran. human.* exhibito: collo appendebat nodulum ex *rad. ʒs sem. pæon.* temporibus illinebat *ol. cran. human.* mixt. cum *ol. rut.* intus etiam exhibebat idem *ol. cran. human.* Potus erat decoct. C. C. in quo aurum aliquoties exstinguebatur, cui pro majori efficacia addi potest *rad. valerian. sylvestr.* quæ, teste Columnâ, experta est: vel loco hujus, *lignum visci quercini.*

Si à lacte corrupto vel acido proceadat, convenit *lenis vomitus*, qui optimè excitatur in Infantibus *ol. amygd. dulc. rec. expresso.* Nobile etiam remedium est *sulphur zñij rit. ppt. gr. j.* quod euporiston est & præservativum, mineram morbi auspicato vomitu exturbans, etiam iteratò datum, tunc enim etiam sudorem movet. Riverius infantem epilepticum restituit *fumò tabaci*, quem minister tubulò attrahebat & sufflabat in os pueri apertum; vomitu concitato paroxysmus solutus est. Idem River. in observ. communicatis *obs. 11. fol. 677.* plures infantes vomitu ab affectibus soporosis & convulsionibus fuisse liberatos testatur, exhibendo vel *vitriolum alb.* seu *Gyllam Theophr.* in iusculo vel *aq. bened. Rolandi*, vel *succum cepæ*, vel *ol. commun.* cochlear. j. Possunt etiam injici *Enemata ex sero lact. ʒs melle*, aut similes: vel applicari *Suppositoria ex rad. petrosel. ex frusto betæ rubræ*, vel *candela*, vel *sapone.*

Si à variolis ortum habeat, eligenda sunt epileptica, quæ simul expellunt, v. g. *Specisæ. cephal. Tinctura bezoart. Pulv. March.*

March. Pannonic. rub. correct. &c. Noduli etiam ad præservationem fiant ex rasur. C. C. rad. scorzon. rad. & sem. pæon. &c.

Si à cerebro prodeat, prodest *Magist. alcis, Tinctura smaragd. pulv. March. specif. cephal. rasura cran. human. & ex eo præparata: flores pæon. filicis, sem. pæon. viscus quercin. &c.*

Si à vermibus, misceantur epileptica cum ijs, quæ contra vermes sunt, quæ videri possunt suo loco.

Si à dentitione, videatur *cap. proprium de dentitione.*

His universalibus præmissis, & potissimum ijs, quæ humorem peregrinum, musculos, nervos, & totum corpus replentem & vellicantem evacuant, revellunt, attenuant, & liquant, observatâque bonâ diætâ, demum ad illa veniendum, quæ edulcorant, absorbent, præcipitant, omnemque acrimoniam tollunt, & tandem specificâ qualitate & virtute subveniunt. Ad hæc valent

Aquæ, si præter jam dictas (superius) *apoplect. carminat cerasor. nigr. flor. tilie, epilept. Langij. hirund. simpl. & composit. hilior. con-vall. epilept. puerorum &c.*

Balnea artificialia ex varijs simpl. regni vegetabilis, mineralis & animalis desumpta.

Balsamus *apolect. cephal. & ris. spasmodicus. embryon. majoran. rut. salvie, succini.*

Conservæ *beton. buglos. majoran. pæon. primul. veris, rorismarin. salvie, nuc. Indic. condit.*

Decoctum lignorum temperatum *C. C. flor. tilie. visci quercin. Cicutæ ex specificis. Elixir propriet. c. vel fin. acido. Essentia lignor. castor. mixtur. simpl. Tinct. corall. lune, balsam. celest. seu spirit. sang. humani. Emplastrum nervin. cephal. oxycroceum. Extractum castor. lign. aloes, croci &c.*

Fæcula *pæon. Magist. corall. cran. human. hyacinthi, perlar ungu. alcis, Pulv. epilept. Michaël. March. lap. bezoar. Lingua. viperina fossiles Melitenses, unicornu fossile, marinum, specif. cephal. Michaël. C. C. omnia cinnabarina exaltata laud. opiato.*
vel

vel *theriaca cœlesti*, vel *pulv. anodyno*, vel hæc *opiata* juncta
præcipitantibus v.g. *conchis*, *matri perlar.* *znio diaphoret.* *ocu-*
lis *℞. C.C.* &c. quæ omnia acidum nervosas fibrillas vellicans
 & rodens, & spasmodicos motus excitans, imbibunt, & sic hoc
 malum abigunt.

Sequens Pulv. Dolæi est excellens,

℞. *Ginnab.* ℥ij.

cran. human. ppt.

ungul. alcis ppt. ana ℥℔.

pulv. cordis & *pulmonum talpæ* ℥ij.

bezoard. *Yris*

smaragd. ana ℥j.

croc. ℔℔.

ambr. gr. ij.

M. dosis gr. aliquot pro ætatis ratione, *Pulvis præservans*
 & *curans Scorperti.*

℞. *Pulv. rad. pæon. maris decrescen*te *℞. collect.* ℥j.

sem. pæon.

visc. quercin.

ungul. alcis

cran. human.

magist. corall.

succin. ppt. ana ℥j.

sol. Ori N. viij. *M.*

Pulvis Misloskianus Pragensis, alias *Rinder Traiß-Pulver*
 dictus, celebris est, cujus hæc est descriptio.

℞. *Facul. rad. aron.* ℥ij.

corall. rubr.

spec. diapler. *Archont.*

C.C. usli ana ℔℔.

M. F. Pulvis.

Datur præservativè triduo ante novilunium, per tres dies
modicum. *Riverius*

Riverius pro secretissimo laudat *Pulv. rad. valerian.* cum lacte exhibit, quò plures juvit, Laudat etiam *Pulv. de gut teta* qui talis est.

R. Rad. pæon.
sem. ejusd.
diſtamni alb.
viſc. quercin. ana ʒß,
sem. atriplic. ʒij.
corall. rubr. ppt.
hyacinth ppt. ana ʒiß,
ungul. alcis ppt. ʒß.
moſch. ʒj.
ſol. Ori ʒj.

M.F. *Pulv.* qui curat & præſervat, ſi ſingulis interlunijſ ſumatur, Locò hujus etiam valet *Pulv. epilept. niger*, qui eſt ſequens.

R. Pulv. carbon. tilie ʒj.
sem. rapar. ʒiß,
pæon. excorſ.
card. ben.
viſc. quercin.
C. C. phil. ppt.
rad. pæon.
terr. ſigillat. un.
rubr.
myrrb. rubr. eleſt. ana ʒß.
margar. ppt.
cornu alcis
croc. opt. ana ʒj.
ſol. Ori N. XXIV.

M. F. Pulvis,

Olea anethi, carvi, cere, coſtini, cumin. hyperici, irini, juniper.
lavend. lauri. lumbr. Philoſophor. pinguedo ſatellorum, rut. ſalvia,
ſpice, ſuccini, terebint. vulpinum.

Y y

Sacculi

Sacculi ex *Sale torrefacto*, milio & *furfure*.

Spiritus ceras. nigr. lilior. convall. tilie, urinae, sal. & ci correcti vel aromatizat. liquor C.C. simpl. vel succinat.

Unguenta Agrippæ, alb. nervin. Aregonis, Martiatum.

Nota, hæc plurima quidem sunt & exquisita remedia, quibus ego & plures alij familiariter usi, & plurima illorum experti, quæ plerisque contulerunt, in aliquibus verò propter vim & resistantiam morbi parum profuerunt, præsertim Infantibus, quos in dentitione, variolis, & similibus affectionibus hoc malum comitatur.

Certâ experientiâ cognoverunt hæcenus Practici, plurimum infantes epilepticos juvari *rad. pæon.* certo tempore collectâ, illa enim citrà vehementem calefactionem aut notabilem acredinem magnis referandi vitibus pollet, & tenuitate partium ac vi odoris sui discutit venenatam materiam. Hæc radix in tálcolas dissecta filo trajicitur, inque umbra siccat, postea in pulv. redacta exhibetur cum *aq. flor. pæon.* vel simili. Pendeat quoque hæc *radix* in potu Infantis, & *semina pæon.* antè ortum solis lecta & collecta, filò transfixa, collòque gestata non minus quàm radix epilepsie medentur, præsertim si ab externo nigro cortice liberata, & in pulv. vel emulsionem ducta exhibeantur.

Hic obiter bene notandum & animadvertendum est, quæ nimirum sit *ætas* laborantis. Nam Primò de Infantibus bene sperandum docet Hipp. secus autem de ijs, qui vigesimum quintum annum superarunt *5. aph. 7. 2. aph. 45.* Secundò si Infantulus fuerit adhuc lactans, ad Nutricem præcipuum curationis studium verti decet: hæc utatur plurimâ *pæoniâ*, *beton. salvia, borrag. feniculo &c.* abstineat verò à *petroselino*, quod creditur, habere facultatem inducendi hunc morbum; experientia enim docet, ubi multum vascuntur petroselino, ibi multi reperiuntur epileptici: par ratio est de *vino*, à quo penitus abstineat. Sicut enim hoc adultorum capita ferit, ita & lac indè genitum pueri caput

put invadit. Idem demum dicendum, ut Nutrix coërceatur ab omnibus scribis, ab esu casei, lacticiniorum, cepatum, allij, raphani, leguminum, carnis suillæ & ovillæ, quæ epilepsiam causant. Utatur Nutris *cerevisiâ mediocri*, vel *aq. feniculi*; si autem Puer grandior fuerit, plura supra dicta & adhuc dicenda adaptari & adhiberi possunt; cavendum tamen in genere, ne talis Infans epilepsiz deditus nimio ignis vel caloris ardore feriat, vel aëris frigori exponatur, vel nimio clamore irretur.

Diximus superius, epilepsiam in Pueris ex lumbricis sæpe oriri; eam verò cognosces ex somno profundiori, dentium stridore inter dormiendum, oculorum hiatu, quasi adstantes intuitu videantur, pruritu narium, apprehensu manuum supra ventriculum; præterea plerumque hæc epilepsia post lactationis tempus, & quidem ex immodico panis esu accidit; hi igitur quantocyus *purgandi* sunt *rhah.* & *absynthio*, in *vino* aut *cerevisiâ* madentibus, quantum quidem ætas feret, adhibitis deinceps ijs, ut supra diximus, quæ vermium curationi suo loco destinata sunt.

Apud Hipp. prædictâ *sect. 2. aph. 45.* tria sunt, quæ *Pueros ab epilepsia liberant*, scilicet, *mutatio loci*, *mutatio viçus*, & *mutatio ætatis*.

Multa adhuc prostant, quæ extra paroxysmum plurimæ præstant; sic *aqua florum. cheyri*, si cum *gr. j. camphoræ* præbeatur; tunc rarius, aut nunquam, malum redire testantur multæ nostræ in Bohemia Matronæ. Certius nihil in hoc casu se observasse testatur Strobelbergerus, quàm *cranium hominis suspensum* ʒj pondere cum *gr. iij lapid. bezoar* in *aq. pæon. tilie, picarum, ceras. nigr.* vel aliâ quavis *epilepticâ* exhibitum. Prostat etiam vulgò in officinis *Pulv. March.* seu *epilepticus* dictus, cui plurimas laudes tribuunt Authores, utpote quem quotidie ferè salutariter præscribunt ʒj aut ʒß pondere, in aquis

convenientibus, aut alio quovis modo: quin etiam in ipsa pulticula exhibent, cuius talis est descriptio.

℞. Rad. pæon. maris ʒss

visc. quercin.

rasur. ebor.

ungul. alcis

spodii

unicornii

C. C.

corall. rubr.

alb.

margar. ppt. ana ʒi

fol. Ori Num. xx.

M. F. Pulvis pro usu.

Maximatum virium habetur *Specificum Cephalicum D. Michaelis*, quod sic se habet:

℞. Cinnab. nativ. Armen.

per ℞ vel sexies; vel

ultra rectificat.

Cinnab. ʒii toties rectif. ʒiij

fecul. rad. pæon. ʒiʒ

magist. epilept. ʒss

cordial. ʒij

Fol. Ori N. 1:

M. F. Specificum Cephalicum.

Magisterium Epilepticum autem est sequens:

℞. Magist. ungul. alcis

cran. human.

cornu alcis

C. C. ana ʒss

smaragd. ʒi

succin. ʒi

unicorn. ver. ʒij M.

Magisterium Cordiale hoc est:

℞. Marg.

℞. Margar. orient. ppt. ʒss
 corall. rubr.
 lapid. percar. ana ʒj
 rasur. ebor.

C C. ana ʒvj

Pulverisata cum dicto menstruo solve, & Spir. Vitriol. vto
 tandem edulcora.

Pro majori notitia & facilitate Tyronum, adjungam quas-
 dam formulas, in praxi hodierna usitatas:

℞. Specif. cephal. Michael.

vel Magist. epilept. Ejusdem ʒj

bezoard. Oris ʒj M. Dos. cuspis cultri.

vel ℞. Tinct. pœon.

Spir. Vitriol. epilept. ana ʒss M.

Dosis, gr. v: x. xv. & xx, pro ætatis ratione, in vehiculò
 competente: vel

℞. Δ flor. lil.

teras. nigr.

pœon. ana ʒj

epilept. Lang ʒss

specif. cephal. Michael.

magist. cran. human.

smaragd. ppt.

crystall. ppt. ana ʒj

edulcoretur man. æsti perlat:

vel syrup. flor. pœon.

M. Detur cochleatim: vel Rotulas ad potum.

℞. Flor. pœon.

lilie ana Pij

rad. pœon. ʒiij

aristoloch. rot. ʒjss

Y y 3

rasur.

rasur. cran. human.

ungul. alcis ana 3j

visc. quercin. 3ij

M. f. l. a, Nodulus,

Sunt præterea nonnulla, quæ passim ab Authoribus plurimum laudantur, præprimis *Pulv. hirund.* unâ cum nido calcinatar. *Ossa de corde cervi, cor & hepar pullorum corvi, pulvis secundine primiparæ*, qui expertus dicitur, bezoart. solare & lunare, cran. human. hominis violentâ morte interempti, *Pulv. lumbr. terrestr. exsiccat.*, *Pulv. cinerum talpæ*, *Aurum fulminans*, *Nitrum*, *pulv. farinæ licopodii*, id est, farina musco terrestri clavato insidens; vel *pulv. farinæ* in julis *coryli* in vero reperibilis, qui pulveres faciliè flammam concipiunt, & instar pulv. pyrii strepitum edunt, quia sunt sulphureæ naturæ; dantur ad ʒß, & expertus habetur hic pulvis ab Etmüllero & Dölzo. *Spiritus flor. tilia, cerasor. nigr. flor. pæon. flor. lilior. convall. flor. stæchad. &c.* omnia castoreata, quæ acid. dormitores dicuntur, *unicornu marin.* & *fossil. lapis bezoart.* & omnia hæc similia acidum absorbent, malum minuunt, imò sæpè etiam solvunt.

Instar omnium autem, teste experientiâ, in quacunque epilepsia, & à quacunque causa, originem traxerit, est Liqueor C.C. succinat. Et licet eandem dentitionis difficultas excitârit, suum officio optimè satisfacit; cujus descriptio videri potest in Clavi Schröd. Hoffmanni.

Mercatus in præservatione & reliquiarum absumptione, experimento fidsissimo sibi habet expertum *mel decoct.* & *de-spumat.* cum medico *faniculi* & *ol. amygd. dulc. rec. expresso*, quo utitur ter vel quater in die ex parvo cochleari, vel cuspidi cultri.

Hercules Saxonia *catellum purum nigrum* adhuc lugentem (inquit Scragula) & corpus mox apertum, extrahit totam cystim felleam vix tres aut quatuor guttulas bilis in se habentem, hunc succum

succum omnem Puero in paroxysmo exhibe, cum pauca *aq. flor. tilie*, miraculosum videbis effectum.

Maroldus sequenti pulvere innumeros curavit.

ꝑ. *Ungul. alcis*
limatur. Ori Ungar.
visc. quercin.
corylin.
betulin.
pyri ana ʒß
gran. pæon. Num. x
spinæ mustelæ piscis ʒi
corall.
perlæ.
ætitis
officul. capit. percar. ana ʒij

M. F. Pulv. dos. in aq. flor. tilie, infanti ʒß, Puero ʒj, senioribus ʒij.

Willis suadet, ut etiam Nutrici antispasmodica quotidie exhibeantur: sumat manè & vesperi haustum *seri lact.* cui *rad. & sem. pæon. maris*, & *semin. fænicul. dulc.* incocta sint.

Pauperum natis exhibeatur *Pulv. rad. valerian. sylvestr.* ʒß *ad ʒj* bis in die in cocleari *lactis*, vel in alio liquore.

Quoties affectionis causa in visceribus subest, & lumbrici aut acres humores hoc vitium excitant, suadet *ʒrium dulc.* cum *rhæb.* vel *resin. jalapp.*

Stercus. de vacca nigra adhuc calidum indatur ollæ novæ, & calcinetur, detur ʒj vel ʒß Infanti recenter nato: est secretum Elector. Saxoniz.

Mulieres Bohemicæ post paroxysmum, in *aq. flor. cheyri*, *somphoræ gr. j.* præbent: raro aut nunquam epilepsiâ corripiuntur.

Inter Extrema multa adhuc sunt, quæ hic pro usu inseri possunt & debent, Sequens *Clyster* multum laudatur,

ꝑ. *Flor.*

R. Flor. tilie
 lil. convall. ana Pij
 rad. pæon.
 aristoloch. rot. ana ʒij
 agaric. trochiscat,
 sol. sen. s. st. in petia ligat. ana ʒj
 coq. in ∇ R. Colat, ʒij vel iij vel plures
 pro ætatis ratione, in his dissolve
 elect. hier, picr. ʒj. ij. iij plus minus
 extract. castor. gr. ij vel iij.
 F. Clyster.

Ceratum pro præmate usuale q. s. malaxetur ol. succin,
 & rut. & extend, in aluta syndone subduct. pro capite.

Balsamum. R. balsam. succin. rut. ana ʒß axung. castor.
 ʒj. Misce.

Emplastr. magistrale. R. succin. alb. mastich. ana ʒß gal-
 ban. opopan. ana ʒß visci querc. ʒij ambr. gr. vj. moschi gr. iv.
 sem. pæon. ʒß sadani ʒiß ol. nucist. q. s. M. F. Emplastr. ex-
 tend, in aluta in forma consueta. Theriaca, addit. ol. suc-
 cini, ambrâ. & moscho, etiam applicatur.

Emplastr. epilept. Craton. vel Myrs. vel loco horum se-
 quens:

R. Emplast. de betonic. ʒj
 bals. de Peru. ʒß
 ol. cran. human.
 C. C.

Pri foetid.

☉ volat. C. C.

succin. ana ʒß

M, F. Emplastrum, malaxetur & applicetur,

Suffitus fiant ex thure, mastiche, ambrâ, succin. Nares il-
 linan.

linantur *theriacâ*, ol. *succini*, ol. *cran.* *human.* ol. *rut.* iisdem naribus obijciatur *Spirit. sal. armon.* odorandus: vel *Spirit. fuligin.* Cordis scrobiculo inungatur *balsamus succini*: est expertus.

Amuleta: *Amuletum Hærtmanni de sambuco*, *smaragdo*, *salice*, de collo suspensum: item *rad. pæon.* iusto tempore collect. & de collo suspensa. Item *dens lupi*, *corallia*, *annulus* de catena patibuli, carbo sub *arthemisia* die S. Joannis inventus, *ungula alcis*,

CAPUT XXV.

De Dentitione Puerorum.

Puerorum ora valde excruciat ex dentibus dolor, cum è vagina velut prorumpere, & ruptis gingivis prodire apperunt dentes. Definitor: *dentitio est dolor seu continui solutio gingivarum, à denticulis cuspidatis jam genitis & erumpentibus perforatione facta.* Et ut clarius rem explicem: dentitio nihil aliud est, præterquam gingivarum à dente accrescente perforandarum dolor urgens, similis illi, dum acido morbofo gingivæ in dentium radicibus punguntur & quasi perforantur: sed cum sensibilis gingivarum ex interspersis varijs nervulis substantia cum partibus vicinis insignem consensum habere soleat, id quod ex odontalgia adultorum subinde dimidiam capitis sphaeram per consensum afficiente, interdum muscoli temporalis aliquem spasmus inferente, notissimum est, indè facile evenit, ut sub atrocioribus doloribus tandem universum ferè nervorum systema vellicetur, & mox (ut de epilepsia diximus) convulsiones epilepticæ superveniant, idque eò promptius, quò vel per se, vel in se ipso nervorum systema Infantum tenerius & mobilius extiterit, vel ipsum ex perversa dicta Matris vel Nutricis, acidis abutentibus (ut supra dictum) in primis suis staminibus debilius,

lius, & irritabilius redditum, vel ex lymphâ vitiosa commota hinc inde irritatum fuerit.

Indicia probabilia dentitionis potissima sunt sequentia: *mensis ætatis septimus & octavus: Salivatio multa & copiosa.* Cum enim ex dolore gingivarum viena glandularum præprijis salivalem vasa, & illas integrentes membranz simul vellitari soleant; hoc ipsò uberior salivæ in oseffusio, indeque effluxus, quem vulgò vocant *das Ganseln* / ordinariò comitari, interdum aliquandiu præcedere dentitionem inolestioem solet; quæ lymphâ si & ipsa minus temperata, sed falso-acida plus minus fuerit, præter *rosionem faucium & laryngis*, indeque excitatam tussim subinde siccam & inanem; ad stomachum verò copiosior delata, *anorexias*, aut *opressas* interdum vomitum cum tussi ferina; aut certè in intestinis diarrhæam plus minus ferociam excitabit, vel nervosum genus hinc inde vellitandò ad epilepsiam disponet. Hæc symptomata tanquam communissima alia adhuc plura vel concomitantur vel subsequuntur, uti sunt vigilæ, inquietudines, stercus insuetus & ejulatus, genarum rubor & calor, gingivarum tumor & pruritus, insolitus oris ardor, febris seu æstus febrilis, pavores in somno, morbus papillarum Nutricis, digitorum in os frequens impositio, &c.

Quòd aliqui Infantes nascantur cum dentibus, est rarum exemplum.

Dentitio est malum laboriosam, & ob occurrentiam tot & tanta symptomata sæpius lethale. Macilentis tamen minus periculi adfert, quàm obesis. Pariter sentiendum est, quibus citius vel tardius præter naturæ tempus & ordinem prædeunt; ordinariè enim, ut diximus, septimò vel octavò mense prædeunt, alijs verò, sed minus ordinatè, vel tertio vel quarto; alijs nono vel etiam duodecimo mense, seu anno integro & ultra erumpere solent. Ijs, quibus sine molestia prædeunt, periculò vacant, secus autem, quibus concomitantibus symptomatibus,

Curatio dentitionis consistit in hoc: *primò* ut dentium exitus

exitus ocyus promoveatur, *secundò* ut obstacula retardentia removeantur, *tertiò* symptomata urgentia mitigentur, *quartò* si alvus sit adstricta, modicè relaxetur, vel clystere vel quocunque alio lenissimo remedio: purgare enim non expedit, *quintò* Nutrix optimam dextram servet, & ab omnibus nocivis caveat. Ab hac ipsissima indicatione ultimà faciendum est curæ principium, unde ut rectè auxilium feras, Nutricem, quasi ipsa febricitaret, curabis. Infantibus autem actu *frigida non* temerè admovebis, ut quæ gingivis constrictis, mox prodituris dentibus veluti remoram injiciunt: & ex hac ratione *non* probo *crystallum, jaspidem, chalybem, aurum, argentum, ebur, dentem lupi*, & alia multa talia dura instrumenta de collo suspensa, Infantibus in os poni & per gingivas trahi; licèt enim his calor oris mitigetur, tamen alveoli dentium potius occluduntur ac obturantur, unde fit, ut densior ac durior facta gingiva, interneconis cruciatus interdum afferat, dum à dentibus percutitur.

Satiùs ergò & meliùs *lenientia & emollientia* adhibentur, quæ scilicet gingivarum laxam carnem magis ac magis relaxant, & dolorem mitigant. Itaque Nutrix oleo *amygd. dulc. butyro rec. melle, saccharo, mucilagine, sem. althææ* seu *bismalvæ* in *aq. parietar. vel chamomill.* extract. inunctos digitos puerilibus gingivis crebrò affricabit. Vel loco horum serviet etiam *frustum lardi rec. non saliti, ficus recentes* in medio scissæ, *sanguis adhuc calens ex crysta galli, adeps anatis, anseris, gallinar. lac caninum, caprin. vitellum ovi, Balsamum puerorum dentientium Myns. vel Horstii, Linimentum ad dentitionem Timai: mel apum illicum, mucilago ex sem. lini, psyllij, vel cydon. &c. succus è cancriis vivis contusis per se. vel cum aq. fior. cyani mixtum, mel cum butyro mixtum, vitellum ovi cum butyro, mel rosat. medulla ossium vituli, hedi, arietis, vel sequens Litus. 17. Sacch. & butyri insulsi, succi althææ ana ʒʒ vitell. ovi dimidium, M.* Sed in pinguium & laxantium genere id obser-

varum velim, ut moderatio adsit & cautela, nè ea facile ab Infantibus devorentur, indè ventrem nimis moveant, fastidiumque pariant.

Quibusdam, imò toti penè orbi, abusiva quadam consuetudine in usu est *crepundium*, cui insertus est *dens lupinus*, vel *dens viperae*, aut alia supra jam memorata duriora instrumenta; cui malè consuetudini ut rationabiles suppetias feramus, mihi magis placet loco talium duriorum rerum *glycyrrhizæ rasæ*, vel *rad. althææ*, vel *irid. florent.* vel *chelidon. maj.* vel *lapathi acuti* &c. *baculus*, syrupo convenienti illitus, ori, gingivisque crebro affricu admotus.

Sunt præter hæc omnia adhuc quædam *amuleta* seu remedia, quæ vi peculiari in hoc affectu laudantur, quorum quædam satis fortia & generosa habentur, non nisi cum cautela & circumspectione adhibenda. A proprietate quadam laudatur speciale amuletum, *dens primus*, qui alicui *Infanti* excidit, si terram non attingat, *Infanti* dentienti alligatus: peculiari etiam vi *dens hominis mortui*, *dens equi primum natus*, *pellis lupi*, *lana agnina*, convenire dicitur, quæ omnia tamen mihi magis fabulosa, quàm realia videntur. Fortiora aperientia & extrahentia ab experientia videntur *cerebrum leporis*, *agni*, *arietis*, *cuniculi*, *gallinæ*, *pullorum*, item *adeps leporis*, si iisdem gingivis perfrixeris.

Extrinsècus apponitur *cataplasma ex farina bord. lacte, ol. rosato, & vitellis ovorum*; aut *somentum ex decocto malvarum, violariæ, lactucæ*. Bohemicæ Mulieres vel solo utuntur *butyro rec.* quò puerorum genas manè seròque inungunt, credentes, facillimè hoc modò absolvi dentitionem. Nonnullis hoc usui est. *℞. axung. lepor. mell. ana ʒi*; adde *fibras ceparum* minutim dissectas cum aliqua parte *farinæ avenacæ*: fac Lini-mentum, sub auribus inungendum. Verùm non rarò fit, ut ejusmodi omnia remedia propter gingivarum ex duritie contumaciam, aut naturæ puerilis infirmitatem nihil proficiant.

Itaque

Itaque in tali casu *Ambros. Pareus*, sedulus olim Galliz Chirurgus, scalpello gingivas, quæ se tumore produnt dentes, aperit, ejus rei probam secundo & optato successu fecit ipse in aliquot suis proprijs liberis, ut fatetur *lib. 23. cap. 67.* Sic & ipse in praxi sæpius observavi, plures Infantes præmatura morte extinctos, mortis autem causam cum anxie inquirerem, non aliam inveni, quam gingivarum ex duritie contumaciam majorem, quam quæ ætati illi conveniret: sic enim prorumpere, & viam sibi moliri dentes ipsi per se non potuerant; ejus rei multa existere argumenta, quod rescissis post mortem scalpello gingivis, dentes omnes velut in procinctu & cum admiratione ad egressum apparuerint, ejus occasione doluit sæpius, me hoc auxilium in vivis non adhibuisse.

Hoc in affectu sæpius ob copiam lymphæ ad has solum partes emanantis *fonticulos* nuchæ applicandos suadet *Dolzus*, quibus convulsionis furiz præoccupantur. Idem præstant *vesicatoria* vel *hirudines*, quatenus serum acre, motuum convulsivorum authorem, evacuant.

Cæterum superest, ut Medicinæ Studiosi moneantur, esse nempe Odontophniam, seu dentitionem quandam notham, spuriam, falsam, ac mentientem, quam Mulieres nostræ vulgari sermone die *Wüll* / quasi *Wapl-Zähne* appellant, quæ nihil aliud est, quam tumores quidam in gingivarum posteriori parte, quæ dentes enasci deberent, in acumen protuberantes, Puerum à lactis suctu & tractu impediētes, & suctum sonorum ac sibilosum (Sic *schmagen gar lauth*) efficientes, ejus rei certitudinem sic observabis: si nimirum in posticam ad aures partem digitò compresseris, ejulatum edet ob dolorem, quem tunc percipit vehementissimum. Hoc malum sæpe non caret periculo, habetque hoc unicum certum & expertum remedium, mox ante dictum *Linimentum*, vel si aurium tota externa regio, præsertim postica ejus pars, *axungia leporis recenti* frequenter perungatur, & gingivæ protuberantes *ol. amygd. dulc.* sæpius demulceantur.

CAPUT XXVI.

De Fileto sub lingua, seu ligatione lingua in Puerulis vulgò Zungen lösen.

Filletum sub lingua nil aliud est, quàm vinculum nervosum & fibrosum, linguam cum inferiori mandibula arctius vinciens & alligans, unde linguæ molesta gravitas, locutionisque impeditio sequitur, quin & sugendi lactis impotentia quædam, quam Nutrices ex impedito sugendi conatu in Puerulis facillè animadvertere, parentesque maturè hac de re admonere possunt: vocatur etiam alijs *frænum, filum, vinculum, funiculus, ligamentum, ligula* &c.

Curatio. Ligamentum hoc forcipe, non unguibus, vel nummi alicujus acie (ut quidam suadent, & obstetrices benè exercitatæ idipsum expedire faciunt) abscindendum, postea *styptica* ori adhibenda, qualia sunt *aqua burs. pastor. centinodij, equiseti, plantag. Syrupus corall. de rosis siccis, plantag. myrtin.* & nè tam citò & facillè denuò coëat, sequenti *linimento* inungenda pars. *℞. Farin. hord. ʒß. cum melle despumat. q. s.* Coq. lento igne, ut omnis humiditas exhalet, & in pulverem redigi possit; postea *℞. Vitell. ovi* ad duritiem coct. in furno exsiccat. & in pulv. redact. *ʒj. pulv. thuris, mastich. ana ʒj. alumin. ust. gr. vj.* Pulveriscentur omnia & cum *melle ros.* fiat Linimentum. Hæc & similia toties & tam diu facienda, donec lingua à suo retinaculo penitus solvatur. Nec verò forcipem ignire oportet, ut nonnullis ex inani metu hæmorrhagiæ visum est; nam nullo vitæ periculo scissuram peragi, sæpissimè in praxi vidi & exercui, ejusque securitatem c. nri mant passim Prædicti, & in specie antiquus ille Falescus de Taranta *lib. 2. cap. 64.* Cæterum si Pueri ex alia quavis causâ difficulter aut tardius

dius aut nunquam loquantur, usu frequenti adhibeant *aquam serpilli simpl. vel aq. bened. serpilli Myns.*

CAPUT XXVII.

De Ranula sub lingua, seu Batracho, seu Ramunculo, vulgò die Krot/ Kresch/ oder Schwam unter der Zungen.

Sub lingua Puerulorum lactationis præsertim tempore sic non raro quædam excrecentia, similis glandulæ aut carunculæ, quæ interdum ultra dentes attollitur, impediens linguam in suis operationibus.

Causa ejus est *lympha* seu *saliva viscosa*, crassa & cruda, vel in suis proprijs, vel etiam sanguiferis vasīs quantitate & qualitate mox dictā peccans.

Cura. Tangatur hic tumor sæpe cum plumā ex *aq. Glata* madens, aut utere *diamoro*: si hæc autem frustra adhibeantur, aperiatur scalpello utrinque in dextra & sinistra parte, quò humor albumini ovorū plerumque similis exeat. Colluatur deinde *os poscā*, cum exiguo *sale*, vel cum *vino decoctionis massich. iburis. myrrh.* in adultioribus; si necessitas urgeat, percutitur infra mentum, præmissō tamen usu *emollientium*, ut *cataplasmate* ex *cepis, passulis*; in vino dulci coctis, *radices* quoque *althææ* ad pulvem coctæ & rasæ, additis *passulis*, linguæ subdantur. Nonnulli hoc utuntur pulvere, qui aliquantulum fortius agit, & non nisi in adultioribus locum habet:

℞. Pyrethr.

Zinzib. ana ʒiij

sal. armon.

gem. ana ʒss

origan.

calamenth.

rad.

rad. ireos
bermoda styl.
maslich. ana ʒj

M.F. Pulv. cum quo fricetur ranula; vel cum *album. ovor.* incorporetur & cum petia imponatur: proleſtam inde pituitam expuat & ger: valet etiam Pulvis contrarandulam Barrette. Item decoſt. agrimon. veron. balaust. myrb. bord. ligustr. roſar. cum aq. vel vino ſtyptico, mell. roſat. ſyrup. de roſis ſiccis.

Si autem cancroſa, nigra ſcilicet, fuſca, ac dura, melius eſt, illam relinquere, quàm cum ignominia curare, præſertim ſi ſequenti artificio & remedio refragetur malum. Fricetur nempe ranula illa fortiter cum ſale, colluſo deinceps ore ex decoſto calido *rad. tormentill. & ſerpentar.* aliquoties: frictionem poſtea reitera cum pulv. *rad. ſerpentar. alumin. & virid. æris:* ubi ruptum ſit, hoc artificio tuberculum, guttam *ol. carophyll.* inſtilla, hac enim arte ulcus ſanabitur & evaneſcet tumor: ſub mento Emplaſtr. appone ex ſtercore aſerino & melle ana part. æq. in vino ad conſumptionem ipſius coctis,

CAPUT XXVIII.

De Labio leporino, vulgò die Haafen, Scharten.

LAbium leporinum eſt vitium in utero Matris labijs Infantis impreſſum, eſtque ſolutio continuitatis in labio plerumque ſuperiore, facta vel à facultate imaginatrice Matris, vel ab errore facultatis formatricis, ſeu, ut alij volunt, idem.

Curatio indicat ſolutæ unitatis reunionem, quæ ſi exigua eſt, ſola conſuſione curari poteſt hoc modo: prius labia ſcalpello vel cultello aut lancettâ internè verſus gingivas ſeparantur, & in ea parte, in qua extrema uniri debent, cutis auferitur; hoc facto tribus tenuibus aciculis, ſuis filiſ inſtructis, extremi-
 rates

tates contrahuntur, & postmodum imponitur *Empl. stypt. Crollij*, cum *Empl. sperm. ranar.* mixtum; intra gingivas impone quoti-
die petiam intinctam *Oleo rosato albumine ovi* agitato, & tandem
incarnantibus & ciccatrisantibus ac balsamicis vulnus claudatur.
Si autem majus sit Labium leporinū majorem requirit manus ope-
ram, de qua vid. Paræum, Scultet. Fuhrmann, & plures alios.

Alij sunt qui solis *Empl. glutinantibus* hoc munus præstant,
Alij demum qui sequens *Unguentum* recommendant.

℞. *Ol. olivar.*

pice vulgar.

axung. canis

taxi

ursi ana ℥j

Colliquecant optime ad ignem lantum, in quibus, postea-
quam modicum refrixerint, solv.

pulv. mastich.

oliban.

galban. ana ʒj

F. l. a. Unguentum; quod cicatricibus istis cum linteolis, superim-
posito ter in die, idque sine cunctatione peragendum primis post
partum diebus, ne malum ingravescat & reunitiōi obicem ponat.

CAPUT XXIX.

De Rhagadibus, seu Fissuris, Rimis, Scis- suris labiorum

Fissura est continuiratis labiorum à nimia siccitate & tensio-
ne orta solutio, ab humoribus acris, salis & biliosis, à
fervore viscerum, lacte corrupto & acris, frigore, coryzâ, &c.
proveniens.

Curatio præmissis universalibus & habitâ causarum inter-
narum consideratione, externis plerumque instituitur & absol-
vitur: inter quæ valent *adeps & medulla vituli, anatis, anse-
ris, gallinæ*, cum *melle* vel cum *ol. rosato, violato vel butyro*

A a a

rec.

*rec. amylo, cerussâ &c. mixta. Cremor lact. cum pingued. juscu-
ll, lithargyr. mastix, thus, in aq. rosar. vel album. ovor. soluta
& impastata, mucilago ex gummi Arab. semine cydon. psyll. tra-
gacanth. ol. ceræ, ovor. rosar. cum alb. ovor. ita etiam ol.
amygd. dulc. hypericonis, momorticæ multum valent. Opium
cum lacte & succo plantag. Ungu. alb. camphorat. ungu. pomad.
de tutia, lac Nutricis: succus rapar. semper vivi, Aquæ al-
chymill. consolid. maj. fol. quercûs, gratiæ Dei, plantag. rosar.
sanicula &c.*

CAPUT XXX.

*De Aphthis, Parulide, & Fetore oris,
vulgo Mundtseil oder Gurgl.*

Aphthæ sunt pustulæ seu ulcerationes, summam oris su-
perficiem, linguam, palatum, uvulam, & fauces sæpe oc-
cupantes, cum respiratione & deglutatione læsa, ab humoribus
& vaporibus pravis in ore, vel in toto corpore collectis, & co-
delatis, ortæ. Dixi humoribus pravis, sub quibus etiam intellige
hac corruptum, inde ortam acrimoniam & acescentiam, quæ
excoriat has partes, idem præstat lymphæ & humores circu-
lantes acescentes, vel salivæ acrimonia cum lacte & pulve in-
gesta, fons enim peccantis acidi potissimum est in stomacho,
quod exhalat in dictas partes.

Parulides sunt vesiculæ seu tubercula gingivarum à priori-
bus etiam causis, plus minus sævientibus orta: Differentiæ ra-
tione coloris sunt variæ, quandoque flavæ quandoque albæ,
quandoque lividæ, sæpe alix, prout est diversa acidi & bilis
commixtio, alix molles, alix humidæ, alix asperæ & siccæ,
alix firmiter adhærent, alix facile decidunt.

Curatio consistit in acidi acrioris correctione, & novæ ge-
nerationis impeditio, in aphtharum maturatione; id quod fit
medica-

medicamentis vel alimentis Infanti vel Nutrici datis: acidum aptharum & simul acrimoniam ejus, mirè corrigit vitellum ovorum cum aq. rosar. & sacch. cando mixtum, succus raparum illitus, cui modicum mellis addendum: Succus caner. fluviat. succus veronica; cerevisia recens, serum lact. cerevisia ficibus & liquiritiâ alterata; aqua exstinctionis chalyb. in qua salvia & parum mellis bullierit: lac per se etiam optimum quod assugit Infans est remedium & simul alimentum: decoctum veron. mucilago sem. psyllii, cydon. &c.

Instar omnium est linimentum ex melle cum tantillo Spirit.

Ⓢli imprægnat. & subinde ori illitum, In vesiculis gingivarum ladatur sequens Linimentum,

℞. Farin. milii ʒB

aq. rosar.

ol. ompbac. ana q. s.

F. Linimentum

Sorbait hoc commendat;

℞. Ol. chamomill.

mellis

terebinth. ana ʒij

M. F. Linimentum quò calefactò gingivæ inungantur, est excellens. Plurimum etiam valet si linetolis propriâ Infantis urinâ madidis, gingivæ illius sæpe abstergantur.

Sequens rarò fefellit Dolæum, quò singulis diebus bis vel ter, instrumento lineo obducto, os emunderetur.

℞. Vitell. ovor. Num. 1.

mell. depressat. ʒij

succ. veron.

rapar. ana ʒB

croc. gr. vj

maceris ʒB

c. aq. veron. & rosar. q. s.

M. & detur ad usum.

Valer etiam *syrupus de ros. siccis, mel rosar. diamor. dianuc.*

Extrâ collum inungatur *ol. amygd. dulc. vel ol. hypericon.*
Cavendum in cura horum affectuum ab omnibus acribus, acidis, & falsis, Spiritu Oli, sulphuris, salis, nitri &c. utpote quæ per se sola, vel cum alijs violentè adhibita maximum aphthis detrimentum afferunt: in adultioribus autem, ut dicetur in praxi, acriora etiam suo sensu locum habent. Cavendum secundo, nè nimis simus proclives ad purgandum, quia facilè diarrhæa subsequeretur quæ pessima est: Sufficiant, si opus, *suppositoria*, vel *chlysteres lenissimi*. *Sudorifera* lenia pro tenera ætate profunt. v. g. sequens: *℞. Bezoart. mineral. a gr. j. ad v. lapid. bezoar. a gr. iij. ad vij. croci a gr. iij. ad vj. M. F. Pulvis.* Valer etiam *Aq. alchymill. burs. pastor. centinod. equiset. fabarum, foliorum quercus, fragar. ligustri, nummular. papav. rhæad. plantag. prunell. rosar. sanicul. tormentill. boyd. posca seu acetum aquâ dilut. vulgò oxycratum dictum.* *Decocta* ex prænominatarum aquarum herbis, *serum lact. cerevisia tenuis saccharata C.C. amyllum cum aq. rosar. dilut. Roob diamoron, dianuc. mel rosar. Syrupus de agresta, corall. liquirit: de rosis siccis, granator. jujub. myrtill. papav. rhæad. plantag. veron.* *Linimentum Joëlis ex melle rosato, pulv. violar. ciner. equiset. C.Custo.*

Internè dantur *absorbentia & edulcorantia*, uti est C.C. quocunque modo pptum, *corall. rubra ppt: ocul. cancr. ppt. nitr. ppt. antihæc. Poter. specif. cephal. Michaël. ebur. ppt. &c. Tinctura corall. vel antimonij ritè ppt. vel Tinctura rosar.*

violar. bellid. aquileg. &c. cochlearum vel pro libitu porrecta.

CAPUT XXXI.

De Uvula relaxatione & Syriasi, vulgò
daß gefallene Blattl.

S*Triasis*, seu ardor, seu adustio capitis vel cerebri; seu apostema sicribundum, seu ustulatio Infantum (ob febrem ardentem humiditatem potenter absumentem) seu morbus solstitialis, seu erysipelas cerebri, seu casus fontanellæ, seu cerebri, daß Blattl fallen / oder einfallen des Hirns: est inflammatio circa cerebrum & meninges ejus, quam sincipitis & oculorum rubedo & cavitas, febris ardens, cephalalgia, pallor, siccitas corporis, vigilæ, alvi profluvium, appetitus prostratus, & multa alia mala consequuntur, à sanguine effervescente, & quandoque putrescente ob aërem calidiorem & æstuantem, bilem exsuperantem, lac calidius & spirituosius &c; orta.

De hoc affectu intelligendus est Hipp. 7. aph. 50. *Quibus cerebrum syderatum est, intra tres dies intereunt, si verò superaverint: sani fiunt.* Est enim grave malum, & rarò evadunt, si in sincipite fovea fiat, quæ subsistentiam cerebri & brevi subsecuturam apoplexiam arguit.

Curatio instituitur bonâ dietâ Nutricis, ut lactis caliditas temperetur, sanguinisque mitigetur acrimonia & effervescenzia, utatur igitur Nutrix *ptisana, emulsionibus*, vino abstineat, caveat ab animi motibus.

Internæ etiam dari debent quæ refrigerant & roborant. *Aqua endivia, melonum, perlar, tilia: Emulsiones ex sem. 4. frig. papav. albi. Syrupi: acetosella, bethon, tunica, rub. idai &c. Sanguisuga* prodesse possunt lateribus colli propè jugulares venas, temporibus, retro aures, fronti ad mortæ, nisi nimis tenella ætas obstiterit, sed cum sit affectus anceps etiam anceps locum habebit remedium, Valer etiam *sacchar. Saturni* cum *aq. flor. tilia* tepidè applicatum, Conveniunt quoque *flores sambuci*

vel flores solani. Vel ꝛ. Ol. rosati ꝓ. ungu. popul. ꝓij. album. ovi
 Num. j. emulsionis sem. papav. alb. aquâ rosar. facta ꝓij. M.
 Vel ol. rosat. cum vitello ovi, dolorem enim mirigat & dis-
 cutit.

Ubi inflammatio aliquantulum sedata est, discutientia conve-
 niunt. ꝛ. Summit. anethi Mß. flor. chamomil. P. j. coq. in aq.
 adde ol. chamomill. ꝓj. M. vel aqua chamomill. & anethi impo-
 natur tepide.

Inter domestica remedia sunt adhuc sequentia: *Folium quere.*
recens cum melle probè inunctum, vertici Infantis imponatur.
 Vel impone *chartam luforiam* seu chartifolium, vel aliam simi-
 lem chartam in *cerevisia alba* probè humefactam: Vel *chartam*
cœruleam aquâ lavendulæ optimè imbibitam eidem loco ap-
 plica.

Alij panum lineum quodruplicem in eadem aqua probè
 intingunt, & capiti imponunt, sæpiùs hoc repetendo. *Empla-*
strum certum & expertum ad elevandum os cranij depressum,
 non modò ex Syriaci, sed potiùs ex casu aut contusione.

ꝛ. Mell. comm. Viscoque & adde
 fursur. frument.
 sal comm. ana ꝓß
 cumin,
 absinth. ana ꝓij

Fiat Emplastrum, quod expertum est in quindecim diebus, teste
 Epiphanio.

Solet quandoque contingere, ut ipsis Infantibus ex præsa-
 ris accidentibus, tumor in facie & capite, potissimum oculis ac-
 cidat; in ejusmodi repentinis deflexionibus, mulieres nostræ
fermentum cum aq. pulegij probè mixtum & malaxatum nuchæ
 aliquoties imponunt, non sine præsentaneo auxilio. Pro sunt
 etiam *suffumigia* ex *gummi sadarab*, *oliban*, *massich*. plura de
 hoc in sequenti capite.

CAP,

CAPUT XXXII.

*De Emphysemate seu Tumore flatulento,
in specie, de Inflatione Palpebrarum*

E*mphysemā* in genere, est tumor inæqualis, vagus, renitens, & sonitum instar tympani, manu percussus, edens, à flatu vel Spiritu flatulento in aliqua corporis cavitate excitatus. *In specie Emphysema* est tumor seu inflatio palpebrarum laxior absque dolore, œdemati similis: *Causæ* internæ sunt humores seu liquores aquosi vel lymphatici, vel spiritus flatulenti &c.

Externæ sunt ictus aranæ, vespæ, apis, urticæ &c.

Curatur hoc malum causarum ablatione, discussione, resolutione & mitigatione. Laudatur *Aqua omnium florum, florum sambuci, nymphææ, plantag. rorismajal. rosarum alb. spermat. nanar. violar. scordij; muciago semina. cydoni. & psyll. cum dictis aq. extracta.* Item *decocta* ex iisdem aquis vel herbis facta; *mithridatium, theriaca, diaiscord.* parti imposita.

CAPUT XXXIII.

De Trachomate seu asperitate, Psorophthalmia seu Scabie & Ulceratione Palpebrarum.

T*rachoma*, est internæ palpebrarum superficiei, quæ oculos respicit, asperitas, cum rubore, pruritu, pustulis, quandoque instar milij, orta ab humore salso, mordaci adulto, vel collyriorum acrium diuturna applicatione.

Curatur præmissis universalibus, materię peccantis aversione, *topicorum, emollientium, mitigantium, abstergentium & exsiccantium* applicatione. Inter cætera laudatur *Aqua anserinæ, chelidonii maj. florum cyani, fragor. oxylapathi, plantaginis; rosar. alb. semper vivi, solani, taraxic. Butyrum rec. caseus recens,*

cens, cerussa: Unguentum de tutia, rosat. alb. camphorat. diapompholyg. nibili, de liquirit. Mucilagines, vel cum sem. psyll. vel fenugr. vel lini, vel radice alb. extract. Sacch. candum oculis pennâ inflatum: Sacch. Saturn. Siefalb. & rubr. cum, vel sine opio.

CAPUT XXXIV.

De Ptilosi.

Ptilosis est palpebrarum crassities cum rubore & calore atque pilorum calu, pruritu & corrosione,

Curatur, præter dicta in priori cap. fotu ex Aq. aut Decoct. solani, endiviæ, portulacæ, rosarum, albumine ovi. In progressu morbi addantur leniter resolutentia, ut parietaria, malva. &c.

CAPUT XXXV.

*De Hydrocephalo, vulgò die Kopff,
Wassersucht.*

Hydrocephalus est tumor capitis aquosus à copia lymphæ, ejusque collectione tactus, estque vel extra, vel intra cranium; prior curabilis est, si nimirum sit intra cutem & pericranium vel intra pericranium & cranium, secus si sit intra cranium. *Empysemata* est tumor sub cute vel membrana cerebri ortus, qui carminativis externis & internis curatur. de quibus videantur Practici & sequens hydrocephali curatio: in specie autem Sennert. *Pract. p. 1. cap. 28.*

Curatio hydrocephali instituenda evacuantibus & siccantibus serum si intrâ cranium sit, si verò extra cranium, topica & chirurgia seu manûs operatio plurimum valet: Valent præterea in specie dieta exsiccans, hydragoga, diaphoretica, diuretica: & his

his non inuantibus *cauteria* actualia vel *fonticuli*, *vesicatoria*, *setacea*, & tandem *incisio*, quæ fieri debet in ea capitis parte, ubi maximè propendet tumor secundum longitudinem fibrarum; cavendum tamen nè aqua una vice, sed sensim evacuetur, ut monet Divus senex Hipp. dicens: *Señi vel usi, si aqua affatim effluat, malum*: verùm hæc omnia tenelli Infantes vix sufferunt, & compatiētes mulieres vix admittunt. Ad intrā in hoc affectu pro corroboratione plurimū laudatur *Liquor C. C. succinat.* guttatim in vehiculis porrectus, & sæpius repetitus.

Extra valent, *Emplastr. cephalicum*, *de baccis lauri*, *de bethon.* *diasulphur.* *Ruland: Lixivium cinerum sarmentorum*, *Oleum irihinum*, *de castoreo*, *philosophorum*, *laurinum*, *rutæ*, *spicæ*. Prosunt etiam quandoque *errhina* & *sternutationes*.

Vcl ꝑ. *Syrac.*

oliban.

sarcocoll.

gumm. Arab. ana ʒi

liquefiant in *vin. alb. styptic.* q. s.

adde *farin.* sœungr.

fabar.

sem. lin. ana ʒi

ol. aneth. ʒiij

M. F. Cataplasma,

Vcl ꝑ. *Limac. cum testis contus. Num. xxx. berb. majoran.*

Mj. Contund. simul in mortar. add. *pulv. camphoræ. croci ana*

cum s. q. Ol. chamomill. F. Empl. capiti applicandum,

& relinquendum, quò per se cadat.



CAPUT XXXVI.

De Cranio depresso.

Sæpius contingit ut ex casu vel quacunque violentia, Puerorum cranium deprimatur, in quo casu certum & indubium ad elevandum os cranij depressum, est *Empl. Epiphanij.* superius Cap. xxxi. descriptum.

CAPUT XXXVII.

De Ophthalmia & oculorum affectibus, in specie Suffusione, seu Cataracta, vulgò der Staar.

O*phthalmia* seu oculorum inflammatio seu fluxus, est adnata oculi tunicæ inflammatio, cum rubore, ardore, dolore & lachrymatione, à sanguine acri & fervido aut similibus liquoribus orta.

Cura. Valet præmissis universalibus Nutrici vel Infanti adhibitis (de quibus alibi, & in specie de morb. Infant. in genere) *Lac* ex mamma oculis instillatum; *medulla panis alb. in lacte cocta*; vel *mucilago sem. malvæ* cum *aq. rosar. plantag.* &c. extracta; vel *Collyrium meum completum.*

℞. Aq. rosar.

plantag.

euphras. ana ʒi

pulv. sacch. cant. alb. ʒss

tutia ppt. ʒi

res alb. c. opio ʒi

croc. ʒis adstring. ʒss

vel gr. xv. M.

Suffusio

Suffusio oculorum seu cataracta vulgò der graue Staar / est pupillæ seu foraminis uveæ ab humore præternaturam eo in loco concrecente obstructio, cum visionis impedimento.

Cura. Nutrix masticeet *semen feniculi*, anisi post cibum, & halitum in oculos Infantis immittat. Vel instetur *pulvis avel-lanæ adustæ*. Vel sequens expertum *Collyrium*, quò plures à lip-pitudine sanati sunt, in oculos instilletur.

℞. Aloes ʒi
pompolyg. lot. ʒss
aq. euphras.
rosar.
fœnicul. ana ʒi M.

CAPUT XXXVIII.

De Strabismo, vulgò das Schieln.

Est pupillæ à medio suo declinatio obliqua, adeò ut in una oculi parte, plus albi appareat quàm in altera, idque fit vel à primo ortu seu nativitate, seu mala conformatione, vel ex mala consuetudine, vel à convulsione. Prima incurabilis videtur. Secunda difficilis. Tertia non facilis. De hoc affectu vide praxin Hartmanni.

Curatur primò luminis in partem *oppositam* ei quo Pueri oculi præternaturam declinant rerum pictarum & variegatarum collocatione, ut ex fixo eorum obtutu & inspectione assidua in contrarium flectantur oculi Infantis; Secundò *larvæ* toraminatæ parte ea in quam oculi naturaliter dirigendi & movendi erant, applicatione.

CAPUT XXXIX.

De Lachrymis & Fletu.

Lachrymæ sunt humoris serosi ex oculis exstillationes & profusio, suntque cum vel sine fletu, ortæ ab ejusdem humoris quantitate & salsedine, vel inflammatione, doloribus, catarrho, torminibus, percussione, casu, punctura &c. Moderatæ lachrymæ obesse non possunt, quin potius massam sanguinis purificant & pectus dilatant. Nimia verò cum fletu, ruborem in oculis, ulcera palpebrarum, herniam & alia mala producunt.

Curatio in causarum ablatione consistit, quarum cuilibet sua remedia adhibenda, & ex proprijs capitibus desumenda sunt. Fluxiones sistit *farina fabarum* cum *alb. ovi* apposita. Levibus oculorum inflammationibus prodest *fotus ex aq. rosar. plantag. chelidon. lac Matris* vel Nutricis. Plura ex tit. de Ophthalmia desumenda erant.

CAPUT XL.

De Glaucomate.

Glaucoma est humoris crystallini in colorem glaucum mutati vitium, à nimia humiditate vel debilitate, vel nimio fletu & consumptione humiditatis, vel à violento morbo ortum.

Curatio. Hic affectus ordinariè est incurabilis; si quæ tamen curatio tentanda foret prævio victu modicum exsiccante, attenuante (in quo magnus cardo curæ versatur) humorum & liquorum debita præparatione & evacuatione, laudatur *aqua mellis, succus feniculi, ruta cum croco*, & si fortiores expectis cum *myrrha* applicata. Sed nec hæc quidem faciliè ad humorem crystallinum, ob situm ejus profundiorē pertingunt.

CAPUT XLI.

De Phthiriasi seu Pediculis, vulgò die
Eaiß und Niß.

Phthiriasis est pediculorum in capite, aliisque corporis partibus, præcipuè pilosis, proventus, ab humoribus excrementitijs: aut per contagium: aut ex sordibus tertiz concoctionis, aut ex terrestri portione lymphæ, aut ex putrescente sanguine (ut testantur Chymici qui ex sanguine humano & spermate, muscas & pediculos producant) aut ex seminij in corpora deportatis & à viventibus non observatis, deglutitis & in actum vitæ deductis, aut ex spiritibus seminalibus, vel seminibus in lacte, vel alimentis latentibus, in ventriculo non rectè alteratis, & corruptis, & in actum vitæ redactis, in pediculis degenerantibus &c. ortum ducens.

Inter *causas externas* recensentur fici, quia succum corpori suppeditant pinguem ad cutem vergentem, qui postea incallescens aut putrescens, ob semina latentia in pediculos vertitur. Idem facit ciborum varietas, corporis immundities, neglectæ capitis pectinationes, lotiones, & abstersiones: alij addunt vestes ex pellibus ovium à lupis laceratarum, vel morbidarum factas; vulgus ait indusia ex canabi facta, quæ crevit in agro, simò humanò stercoreato, gestata, pediculos facere.

Quæres cur pediculi morituros deletere soleant & agminatim fugere? Resp. Authores rationem hujus esse credunt, quia destituuntur humidâ repidâ ac blandâ exhalatione, quæ ad eorum generationem & conservationem facit.

Curatio. Præcaventur hæc tædiola animalcula, probâ vitæ ratione, munditie, blandâ corporis expurgatione, vitatis omnibus cacochymicis alimentis; abstineant à scibus & carnibus ob rationes mox allegatas,

Corpus ergò à superfluo sero (in quo plurimam resident

hac animalcula) liberetur, in Puero, quinque vel sex annorum valebit sequens.

℞. *Pulv. jalapp. gr. vij*
℥ii dulc. rit. ppt. gr. iij
℥ii diaph. gr. ij
℥ss. rosat. solut. modicum
 pro incorporatione M.

Conducit quoque exhibere unam alteramve *pilulam aloëticam*; quia aloëtica, antimonialia, & tria, acria, amara & acida multum valent. *Allium* propter quod suum est specificum, ideo Judæi aliàs immundissimi & fætidii homines, quia illud sæpe vorant, non facile à pediculis vexantur. Valet etiam *sacch. Saturn.* cum *aq. flor. tilie* vel *sambuci*, item *cochlearia*: conducunt etiam *decocta lignorum* ad corrigendum serum pro potu.

Extra æstimantur *Decocta & Unguenta trii vivi*, vel *pannus* quo *aurisabri* vasa deaurata exstergunt, capiti impositus; sed cautè in tenellis procedendum est similibus, quia sæpe noxam inferunt: commodius hoc malum curatur, si caput rasum abluatur *aquâ aloëtica*, & illi apponatur *emplastr. alij*, vel lavetur caput *Spiritu vini* in quo *semen staphysagrie* & *bacc. lauri* infusa fuerunt: vel solo *succo tabaci* vel *cochlearia* caput illinatur.

• vel ℞. *Ciner. hirudin. seu*
sanguis. ℥i
styrac. liquid. ℥ss
sang. suill.
cera ana q. s.

F. Unguentum.

Alij præter cineres hirudinum ipsum etiam *arsenicum* & *trium* recommendant, sed quia ista non adeò tuta sunt remedia, ut dic-

dicemus de tinea, idè cautè aut nunquàm adhibenda. *Staphysagria* vulgò *pedicularis* dicta, est specificum remedium in varia forma adhibitum. *℞. Sem. staphysagr. ʒi. absynth. rut. ana ʒß. sulphuris, nitri ana ʒij. Frii vivi salivâ hominis jejuni extincti, pingued. porc. ol. laurin. ana q. s. fiat Unguentum.*

Vel *Ungv. contra pediculos Augustan. vel Myns.*

Primariosius laudat sequentem *Decod.* pro lotionè capitis.

℞. Rad. bryon. ʒß

aristol. ʒij

staphysag. ʒjß

fol. rut.

scord. ana Mß

salis vel nitr. ʒß

Pro amuleto servit *camphora & zibetum.*

CAPUT XLII.

De Crusta lactea (vulgò der Ansprung)

Favis, Achoribus, Psyracijs, & Tinea (vulgò der Grind oder Erbgrind.)

Crusta lactea, alijs lactunen, favi, achores, tinea, sunt scæda illa capitis & cutis tubercula, maculæ & ulcera, ex foraminibus saniosum quid continuò exsulantia.

Psyracia sunt exiguæ eminentiæ, vesiculis seu pustulis phlyctenis dictis similes, duræ, subalbidæ, acutæ, summæ capitis cuti impostæ.

Differunt hæc omnia inter se tantum secundum magis & minus; hoc est, conveniunt quidem subjecto & formâ, sed magnitudine & materiâ aliquid differunt: achorum foramina sunt angustiora, favorum ampliora, & quasi cereis apum cellulis similia; materia achorum est varia, favorum verò materia, colore & consistentia melli correspondet,

Cause

Causæ horum affectuum sunt, vel sordes tertiæ regionis, vel putrescens sanguis, vel voracitas nimia: vel meconium corpus ac humores inficiens, vel terrestris portio lymphæ, vel lymphæ acidô-acris, salsa & glutinosa: reverà enim ex lymphæ nimis seu præter naturam acidæ & simul plus minùs viscidæ vitio, hæc dicta vitia & affectus originem ducere Neoterici arbitrantur, præsertim *lactis* vel *Matris* sub gestatione, vel *Nutritis* sub ejus lactatione, *vitioso*, causæ remotæ vices obtinente: non enim ampliùs quis dubitabit, glandularum functiones versari circa lymphæ præparationem & distributionem: unde spontè patescit lymphæ vitium, nempe ejus consistentiâ materiali obstruendo glandulas earundem, tumorem oriri facit, ejus verò aciditate, ob largiorem in partes intercutaneas, capitis extimas, effusionem, ex denegata plus minùs debita distributione & motu, per glandulas ibidem copiosè residentes, pruritus intensissimus in dictis locis, cum pustulis rubris, successivè in pus abeuntibus & squamis insequentibus ac furfuribus ex cutis & cuticulæ erosionibus supervenire faciunt: imò sæpe accidisse observatum est, quando hæc mala asperiora facta sunt, ad cranium usque penetrare, illudque erodere pro more acidorum osseas substantias facilè erodentium, hinc si talia retrocedant, multorum & gravissimorum malorum causæ existunt, quæ metastasis & retrocessio, lymphæ vitiosæ, præter alia loca in specie fit ad glandulas salivales, & laryngem irrorat, uti & ad pancreaticas, per quas ista lymphæ acidæ, acris, non adeò viscida, uberiùs effusa, dicta & alia multa symptomata inferre,

Tinea propriè tantùm caput occupat, & crustosa ulcera facit. Dixi suprâ, crusta lactea, seu lactumen propter materiam saniosam expulsam ad exteriora lacti similem, vel quia à lactis impunitatè & acredine ut plurimum oriantur. Salutares sunt si debite procedant, quia præservant à majoribus malis, ut epilepsiâ, teste Hipp. *lib. de sacro morbo*: Suntque præterea bonæ

ut signum, non autem ut causa. Malæ autem & periculosæ ac perniciosæ existunt, si supprimantur & retrocedant ad intrâ: malæ etiam sunt, si ob acidum corrosivum, cranium corrodant.

Curatio. In hac *dieta* sit optima; abstinendum Nutrici & Infanti à cibis falsis, acribus, cæpis, allio, raphano, pisus, carne suilla &c.

Corpus autem præservetur à superfluo sero per *levia cathartica*, præsertim ex *Ærio dulci vit.* & *rec. ppto:* vel *syrupo de fumar. simpl.* & *comp. de polypod. de lupulo. florum persicor.* vel *syrupo rosar. cum fol. senn. passulis laxativ.* vel levioribus *clysteribus.* Si oriantur à vitio lactis, etiam Nutrici dari potest *serum lact.* cum *essent. fumar.* vel ejusdem *succo* quotidie manè & vesperti; & si opus fuerit, in isto sero quandoque decoquantur *fol. senn. cent. min. & agaricus trochiscatus* lindeolo colligata; vel *pilule de fumar.* vel *extraçt. catholic.* &c. Interim ut diximus suprâ, Nutrix bonam dietam servet, abstinendo à nocivis, alias omnia frustra fient.

Universalibus præmissis ad ea veniendum, quæ superfluum & vitiosum serum per insensibilem transpirationem promovent; uti sunt *viperina, antimoniatâ, Tinct. zñij. Essent. fumar. Essent. lign. sassafras; Syrup. fumar. simpl. & comp. Aqua betule,* quæ valde expellit, *Aq. fumar. scabios. card. bened. veronicæ &c. Syrupus vel Conserva Helenij.*

vel *℞. C.C. phil. ppt.*

℥ii diaph. rec. ppt.

ocul. ℥ ppt. ana ʒj

myrrb. ʒß

M. Dos. ʒß plus minus,

vel *℞. Pulv. cran. human. ppt.*

ocul. ℥ ppt. ana ʒß

lact. ʒis gr. xv.

M. Dosis ut prioris,

Cæc

Valer

Valet etiam *Liquor C. C. succinat.* ad paucas gutt. exhibitus
vel *Sal volat. C.C.* vel *viper.* ad pauca pariter grana exhibit.

vel *℞. Aq. fumar.*

scabios. ana ʒʒ

ʒʒ de fumar. simpl. ʒi

essent. fumar. ʒʒ

M. Detur cochleatum vel per plures vices.

vel *℞. Aq. fumar. ʒʒʒ*

C.C. phil. ppt. ʒi

ʒii diaphor. ʒʒ

edulc. man. ʒʒii perlat. ʒi

adde essent. fumar. ʒʒ

M. & detur ut ante.

Potest potui Nutricis vel Infantis infundi *rasura C.C.* cum
flor. fumar. scabios. aquileg. vel additis quibusdam lignis & ra-
dicibus, temperatioribus, *sassafr. chin. sarsaparill. enula,*
baydan.

Lotiones & unctiones non statim adhibeantur, sed prius
præmittuntur *expellentia & mundantia* corpus; ideo etiam a re-
frigerantibus repellent. & adstring. abstinendum est, quia talia
præmaturè exhibita, soporem, anxietates, lypothymias, vomit-
us, alvi fluxus & motus convulsivos efficiunt. Idem tenendum
est de præialibus si præmaturè & abusiue adhibeantur: securiora
his sunt *sulphurea.*

Inter externa laudatur *herba geranij* fixa cum butyro, &
est expertum. Vel *℞. Ungv. de belenio, diapompholyg. ana ʒi.*
flor. ʒris ʒʒ. lact. ʒ. gr. xv. cum ol. nucum q. s. F. Linimen-
tum, & si vis adde sal. ʒri ʒj.

Si ulcuscula sunt maligna & serpentina ex acriori acido orta,
sequens laudatur sæpius inungendo. *℞. Lapid. calaminar. ʒii.*
farinæ cum aceto vel vino subact. resinæ anā q. s. F. Lini-
mentum.

Si

Si hæc ulcuscula saniem emittant tenuem & acrem, optimè præmissis præmittendis lavantur *Aquâ sperm. ranar.* & inspergantur *pulveres* acidum imbibentes, viscositatem resolventes, exsiccantes & detergentes, ut sunt *creta, succin. C.C. ustum, lap. calaminar. myrrha, flor. Gris. crocus*.

In tinea & achoribus laudat Bayrus ut caput abluatur decocto *salicis, parietariæ, betæ alb. & lentium* vel sequenti Decocto.

℞. *Fol. bethon.*

scord.

belen. ana Mj

nicotian. ficc. Pij

rad. bethon.

bardan. ana ℥ij. Incisa dentur pro Decocto.

Vel fiat Decoctio *rad. alth. cum urina pueri* sola, vel *aqua bord.* immixta. Vel ℞. *Ciner. myrtill. ciner. cortic. avellan. & inde fiat s. a. Lixivium.* Vel efficac. ℞. *Lytbarg. l. j aceti acrioris ℥ij. coq. in vase duabus horis, colaturam infund. in cucurbit. vitr. & affund. paulatim ol. Gri per deliquium fact. q. s. vel ℥ij. plus minùs.* His & similibus lotionibus factis, partibus affectis vel inspergantur mox dicti pulveres, vel ipse pulvis qui post mox ultimò dictam lotionem præcipitatur, achoribus inspergatur. Vel etiam facta dilutione inungatur sequentibus.

℞. *Sulphur.*

parietar. pulv. ana ʒss

sapon. ʒj

cum succ. parietar.

F. Unguentum.

Vel ℞. *Pulv. bryon.*

rosar.

fimi columb.

¶ is citrin. ana ʒij

sang. testudinis

succ. betæ ana ʒj

croc. gr. viij

ol. junip.

laur. ana ʒß

M. in mortario plumbeo.

Vel ꝑ. Ciner. myrtill.

cort. avellan. ana ʒj

tutia ppt. ʒß

succ. betæ

chelidon. ana ʒj

axung. porci ʒix

¶ is ʒj

fimi columb. ʒiv

aloes

myrrb.

lap. calamin. ana ʒj

flor. ¶ is ʒij

ceruss. ʒß

sal. tartar. gr. xv

M. f. Pulv. subtilissimus. Vel sequens Ungv. ꝑ. Pulv. flor. ¶ is ʒj
excipiatur unguent. de cerussa camphor. cum s. q. ol. nicotian;
adde sal. ¶ ri modicum vel plus minus, prout actius vel mi-
nus linimentum desideres, quod pustulas exarescere facit: sul-
phurea enim prævalent omnibus alijs, quia acidum potenter
absorbent & temperant. Vulgaria linimenta & unguenta non
approbo, quia tot oleis, axungijs, & pinguibus permixta, par-
tim jam saturata, partim obruta, nihil aut parum operantur,
nisi quòd poros cutis incrustando malum reddant deterius.

Quòd si in prædictis ulcusculis acidum mitius peceet, idque
jam

jam sub sua faldedine cum temperata purulencia vifcida, coiverit in tenaces & sæpe spiffas cruftas, fufficiant in tali cafu fimpliciter *alkalia fixa*, cruftas emollientia, & acidum in radice penitus deftruencia, in quem finem vel *lixivio vulgari* blandè humectentur fubindè, vel *oleo Fri per deliq.* eadè illinautur, & fi lubet addito *ol. amygd. dulc.*

Quod fi grandiores tumores glandularum circa capitis protuberent confinia, pro eorum diffolutione applicandum eft *Empl. de melilot.* malaxatum cum *ol. philofophorum*; vel huic empl. jungatur *Emplaftrum de galban. crocatum Mync.* & ità imponatur & aliquandiu relinquatur. Si cranium ipfum ab ulceribus læfum fit, primò crufta detrahenda & emollienda, *malvâ & violariâ* in *butyro Majali* decocta, poftèa eluenda & exficcanda ulcera *lixivio* è cineribus *vitis, fraxini*, addito *butyro*: ubi autem jam cranium apparet, adhibetur *mel rofat.* cum modico *fpiritu vini* mixtum, poftèa eidem mixturæ addi poteft *pulv. rad. ariftoloch. & balfamus Peruvian.* vel *terebintbina* in *aq. nicotiane* cocta; abftinendo ab arfenicalibus & frio ut mox dixi, ne cerebrum vicinum lethalem noxam contrahat: quandoque tamen *frius in faliva jejuni hominis extinctus*, aliisque permixtus, cum cautela adhiberi poteft.

In Tinea chirurgi fic procedunt: cruftâ ablatâ, ipfos pilos cum radicibus evellunt: cum ijsdem materia illa corroliva magis adhæreat, idque vel voffella, vulgò *Haarjângl.* vel medicamentis pilos tollentibus præftant. Vulgus autem utitur pileolo pice navali inducto, quem toti capiti vel loco affecto imponit, & aliquot diebus finit, poftèa eò detracto, unâ pilos extrahit. Poft hoc *emollientia*, poros aperientia, excrementa evocantia & difcutientia adhibenda, uti funt Lotiones fuprà dictæ vel fequens,

℞. *Rad. bryon.*

oxylapath.

belen. ana ʒi

Ccc 3

fol.

sol. fumar.
 chelidon. maj.
 scabios. ana Mij
 flor. chamomill.
 melilot. ana Mj.

Coq. in lixivio, & caput bis de die lauetur vel foveatur. Lau-
 datur etiam sequens. *R. Nasturt. q. p.* teratur & frigatur cum
axung. porci, & capiti instar cataplasmatidis imponatur, id quod
 præstat, ut intrâ 24. horas crusta decidat, & si continuatur, ma-
 lum ex integro sanat. Solet etiam sequens *Unguentum Grü-*
lingij, purgato corpore & adhibitis detergentibus magni pretij
 esse apud Medicos:

R. Lytharg. Ori ʒi
 cum aceto acerr. nutrit. ʒij
 ceruss. c. ∇ solan. lot. ʒj
 alumin.
 roche combust.
 fulig. furni
 rad. enul. pulv.
 chart. emporet. ust. ana ʒß
 ol. ovor.
 axung. gallin.
 porci ana ʒß
 ol. laur.
 rosac.
 acet. rosac. ana q. l.

M. F. Unguentum.

Joël suadet, ut abluatur crusta capitis aquâ tepidâ, in qua inco-
 cta sint *mentastrum*, *majoran*; *thymus*, *satureja* &c. ac deinde
 pilis abradis, inungatur sequenti Linimento. *R. Lytharg. ce-*
russ. ana ʒij flor. ʒris, *lytharg. seu ʒrij salivâ jejuni hominis*
extincti ana ʒß M. f. Pulv. subtiliss. & cum *f. q. ol. rosac.* accurate
 miscea-

inifceatur. Idem Author cerciffimâ experientiâ comprobatum ad omnia genera scabiei in capitibus infantum aſſerit plurimum conferre *camphoram*, ſi ſuper ferrum candens aduratur, in pulverem redigatur & ſcabiei inſpergatur: vel cum *pingued. ſuilla veteri* commifceatur & inungatur. Laudat præterea, ſi cruſta vel in facie vel in capite tenaciter hæreat, præſentiſſimum remedium eſſe *vernitem pictorum* linteolis inſtar illitum, ſcabiei imponere & ſubinde renovare. *Lapis item medicamentofus Croll.* in *aq. nicotian.* diſſolutus impoſitus & inunctus, valde juvat, ut idem teſtatur. Sed valdè cavendum moner Boyle à lotionibus capitis ex nicotiana inſtitutis, pulveribusque ejus inſperſione; ebrietatem enim turbulentam, anxietates præcordiorum cum lypothymijs, vomitu, & copioſis ſecceſſibus ſuperveniffe in talibus obſervatum eſt. Si verò arida fuerit capitis ſcabies ſeu tinea, & cum squamis decidat, Joël ſuadet ut pilli abradantur & caput lavetur *aqua decoctionis ſumariæ, bethon. chamomill. thymi, epithymi cum rad. Elleb. nigr.* & tandem ex præſcripto uno vel altero unguento inungatur.

Fuhrmannus in cura Tineæ ſic procedit: præmiſſis purgantibus & ſudoriferis, atque deaſis capillis, utitur ſequenti *lixivio*, omni die pro ablucendo capite,

℞. Fol. agrimon.

ſalicis

querc.

plantag.

tuffilag.

rub. idæi ana Mj

rad. ſcorpular.

tormentill. ana ʒj

lign. bedereæ

bacc. laur. ana ʒß.

Incis. & contus. groſſo modo coq. in ℥xvj. vel xvij. *aq. c.*

℥iij

mun. ad remanent. ℞ij. Coletur pro usu; post lotum & deter-
sum caput inunge sequenti *Unguento*:

℞. *Lytharg. aceto saturat.* ℥ij

pulv. sol. persic.

salicis ana ℥ij

lap. calam. ℥iij

nibil. alb. ℥ij

vitriol.

alum. crud. ana ℥℞

opii comm. ℞.

Hos pulveres bene commixt, impone agitando sensum sequen-
tibus:

℞. *Ungu. refriger. Gal. populei ana* ℥ij, *mell. rosat.* ℥iij. *ol.* ♀
per deliq. ℞. *Ceræ q. s.* pro consistentia unguenti. Aliud *Un-*
guentum Ejusdem. ℞. *Succor. fumar. scabios. scrophular. rad.*
bardan. ana ℥ij, coq. hos succos cum *ol. lil. alb.* ad consumpt.
succorum, postea adde *cineres vitis* ℥j, & tandem add. *ceræ* ℥iij.
Ungu. rub. Würtzij ℥i℞. *ungu. popul.* ℥i℞ *pulv. lap. calaminar.*
lytharg. gallar. ana ℥iij M. F. *Unguentum.*

CAPUT XLIII.

De Aurium humiditate.

Aurium humiditas est humorum ex auribus effluxus, ple-
rumque cum dolore & inflammatione, multa sæpe symp-
tomata inferens.

Causa eadem est quæ crustæ lactæ seu achorum, quæ ibi-
dem videri potest.

Curatio. Prodest externè *Essent. absynth. spiritus urinae*,
vel *urina pueri, ol. amygd. amarar. ol. stillat. absynth. ol. can-*
nab. rec. ex semine exprels. & modico vino mixtum mel. rosat.
vel *aq. mellis.*

Vel

Vel ℞. Mell. virgin. ʒB
 vin. rubr. ʒij
 alumin.
 croc.
 nitri ana ʒj

M. super igne.

Hæc & similia, lanâ vel turundâ excepta & auri indita, multum præstant: Si adsit inflammatio, prodest *albumen ovi* cum lacte muliebr. *Decoît. betton. majorana, rosa, salvia*, plurimum quoque prodest.

CAPUT XLIV.

De Aurium inflammatione, dolore, & præcipuè de Parotide, vulgò der Ohren-Zwang.

Parotis est tumor juxta aures sive glandulas ponè aures sitas, sæpe cum, rarò sine inflammatione, Infantibus ob dolorem valde molestus, respiciens easdem causas quas suprà de morbis Infant. in genere, & cap. de febribus diximus.

Curam methodicam si quis desiderat, Practicos adeat, quam ibidem in revulsione, derivatione, doloris mitigatione, digestionè, maturatione, apertione, tandem in consolidatione consistere animadverter. Nostra hic intentio est, tractare solummodò paroditem Infantum, quæ tantas ambages, nec tot ac tanta remedia requirit & permittit. Proinde sufficit apud Infantes lacte tepido aures fovere: vel *Oleum rosarum, violar. vel decoît. capitum papav.* cum lacte & albumin. ovi ac modico croci mixtum auribus indere: ad eundem usum etiam valet *Aqua vel decoît. card. bened. mentb. absynth. lenticulæ, lupinor: medulla panis, mucilago sem. cydon. & psyll. cum aq. rosar. vel aliâ mixta.* Suffitus ex prædictis herbis: vapor silicum ignitorum & urinâ conspersorum: *adeps galli*

Ddd

vel

vel suillus: butyrum rec. stercus caprin. Cataplasma ex farin. bord. semine lini, fanugr. & caricis: decoct. malvæ, alth. violar. flor. chamomill. & pinguedine porci. Empl. meliloti, de mucilagibus, diacalyth. albumen ovi cum lact. & croco Ungu. alabastr. Instar omnium autem dicitur esse pinguedo molendini, seu quæ circa rotas reperitur, parti inuncta. Si dolor à vermibus aut alijs animalculis aurem ingressis, sit, plurimum valent *amaricantia*, mox suprà recensita. Cavendum omni modo à repellentibus, quorum abusu multa mala evenisse restantur Practici.

Ad intrà valent ea, quæ mox citatis capitibus dictavimus: præterea bona dixta pro Nutrice & Infante, summè profutura est.

CAPUT XLV.

De Capitis dolore, Cephalalgia, Cephalæa & Hemicrania, vulgò Kopffwehe.

Capitis dolor est tristis sensario partium capitis. sensu tactus præditarum, ab objecto tangibili violenter & cum imperu continuum solvente, orta. Hujus *causa immediata* est *solutio continui* fiens, non facta, de qua in praxi fusiùs. *Cause antecedentes* & proximiores, acris aut *acida materia* continuum solvens, ut in Infantibus est lac vel pulicula corrupta.

Dolor capitis alius est recens & *Cephalalgia*: alius diuturnus & *Cephalæa*; alius dextram vel sinistram partem occupans & *Hemicrania*, alius statis temporibus recrudescens & periodicus; alius internas vel externas partes affligens, & internus vel externus; alius ab humore peccante vel parte affecta, vel alia ex causa, gravativus, pungitivus, pulsatorius, terebrans, algens &c. dicitur.

Curatio hujus consistit primò in doloris seu symptomatis urgen-

urgentioris mitigatione: *Secundò* in caularum evacuatione, alteratione, revulsione, derivatione. *Tertiò* partium corroboratione. *Quartò* legitima dixta:

Valent proinde sequentia remedia selectissima, varijs intentionibus inservientia, præmissis tamen universalibus tit. de morb. Infant. in genere, & febribus, explanatis.

Præ omnibus in specie tanquam summè specifica laudatur *bethonica* & *verbena*, & ex ijs omnis generis facta remedia tam interna quàm externa. In specie *Aq. bethon. florum tiliæ, verbenæ, ceras. nigr. Balsamus apopl. balsam. succini, cephalicus. Conserva florum anthos, tunicæ, bethon. jalv. lavendul. rosar. Emplastrum de bethon. cephalic. nervinum: Vigonis sine Fri. Epithemata & frontalia ex rebus cephalicis, temperatioribus tamen, ob teneritudinem naturæ. Essentia lignorum, ambre. Ol. ligni rhod. succin. macis, majoran. nucist. papav. rosar. Pilule de cynogloss. Farventini: laud. opiat. Myns. Syrup. de bethon. florum tunicæ, de nymphæa, de stæchad. Arab. Fecula pæon. Magist. corallor. perlar. Stul. Ss. coruinque ppt. margar. trochiscatæ Myns. Spec. aromat. rosat. diamb. diamosch. dulc. diarrhod. Abb. diapleres Archonticæ. Spiritus diatrion; seu Mixture simpl. vulgò dicta. Spiritus Fri simpl. comp. vel volat. Arcan. Fri liquid. Sennert. Spiritus rosar. lil. convall. Tinct. Lunæ, Fri, florum pæon. rosarum: Ungu. alabastr. popul. rosat. Mesue.*

CAPUT XLVI.

De crebra Sternutatione, vulgò daß Niesen.

Sternutatio est Spirituum flatulentorum & acrium vaporum, Stunicam narium interiorum proritantium, violenta & involuntaria per easdem nares expulsio, ab expultrice viciata, & à

causis vel internis vel externis irritata proveniens; multa symptomata Infantibus inferens, præsertim si à principio morbi ingruat, secus in declinatione.

Curatio. conveniunt in ea sedanda, *anodyna & refrigerantia, incidentia, attenuantia, incrassantia, edulcorantia, aperientia, emollientia*, prout status & conditio casarum requirit. *Epithema frontale ex aq. rosar. pulvere rosar. santalo rubro, sangu. dracon. duplicatis linteis exceptum & in causa calida applicatum*: Si verò sit causa frigida, conficiantur ex *aq. majoran. cum thure, mastich. & myrrba.* Valent præterea *ol. anisi anethi, chamomill. nardin.* In causa verò calida *ol. nenuphar. rosar. violar. lac muliebre.* Alij laudant *Pomum ambr. odorandum*: frons itidem inungi potest *Ol. rosar. & omphacino cum vitello ovi conquassato.* Vel applicatur fronti sequens *Empl.*

℞. Pulv. portulac. ʒss

farin. hord. ʒiiij

ol. rosar. q. s.

℞. Pulv. rosar.

santalor.

sang. drac. ana ʒj

aq. rosar. ʒij

acet. ʒss

Misc. & cum pannis frontis & temporibus tepide applicatur. *Aqua tepida* fronti aspersa sternutationes sedat.

CAPUT XLVII.

De Angina seu Prunella Infantulorum, Tonsillarum inflammatione, Paristhmia, vulgò die Mund-oder Hals-Bräune.

Angina est faucium, pharyngis & laryngis atque musculorum earundem, nec non tonsillarum inflammatio, cum febre

febre continua, respiratione & deglutione difficili, spiritusque præfocatione, ab humoribus calidis & acerbis & lacte vitioso orta, quæ calida effusio & phlogosis, non solum linguam, sed & palatum, non raro etiam totam oris cavitatem cum inferioribus in definitione dictis partibus dolorifice & periculose inficit.

Curatio. Primum locum in hoc affectu sibi vendicat *Venesectio*, dummodo fieri possit; profunt quoque *Clysteres*, repellentia, resolventia, *sanguisuga*, frictiones, maturantia &c. plurimum laudatur *album Græc.* tanquam euporiston hujus affectus; alij extollunt *Cass. rec. extractam*. Sequentia magnæ utilitatis etiam esse possunt: *Acetum rosac. Aq. bugule Chapbaliij, nucum jugland. plantag. prunelle, polygoni, scabiose, semper vivi, solani, urvulariæ; cremor bord. decoct. bord. vel lentium. Empl. de meliloto, diachylon simpl. & comp. magneticum: medulla panis triticej cum lacte, vesicatorium. Ol. amygd. dulc. chamomill. lil. albor. lini, ororum, violar. hyperici, rosarum, succus acatiæ, granatorum, cancerorum, mororum, semper vivi maj. rad. bryon. Cataplasma de mido birundin. Myns, quod est expertissimum. Sacculus ex milio, sale & surfure, capiti applicatus; vel collum lanâ succida cum ol. amygd. dulc. inunctâ & cinere birundin. conspersâ, involutum, est mihi familiare remedium. Syrupus è rosis siccis, myrtinus, granatorum, dianoron, dianurum. Ungv. althææ, Martiat. Alij accipiunt salivam & nucem moschat. torrefact. & pulverisatam miscent cum melle pro lambitivo. Alij adhibent aquam prunelle & fragorum, additio crocô & alumine: Decoctum chamomill. expertum quoque habetur.*

Contingit sæpe hæc oris vitia à prædictis causis orta in cretaceum quoddam excrementum, internis oris partibus & linguæ adhærescens degenerare, quem Galli teste Parzo, Cancrum album appellant. Lactandi libertatem intercipit, in ulcera mox ad fauces & gulam serpentina degenerat, & mortis

causa interdum existit; quod nè accadat, medendum ipse est dextensione, parata ex linteolo, baccillo alligato, & immerso in medicamentum medioeris consistentiæ ex *ol. amygd. dulc. melle & sacch.* paratum: hoc enim blandè affricto madefactæ & dextensæ sordes eluuntur.

Internè plurimum præstant *absorbentia* & sanguinem *edulcorantia*, qualia sunt *Magist. dentis apri, corallor. ocul. & nitrurum perlat. spiritus nitri* ritè dulcificatus &c.

CAPUT XLVIII.

De Asthmate; vulgò der Dampff.

Asthma est frequens, densa & anhelosa respiratio cum sonitu seu stertore, rauedine, tussi, à bronchiorum obstructionibus, à viscidis, acidis & crassis succis, vel tuberculo vel calculis vel flatibus, spasmodicam pulmonum convulsionem excitantibus &c. orta. his enim & muscoli pectorales & fibræ bronchiorum convelluntur & lacerantur: morbi enim pectorales, sicut senibus, ità etiam Infantibus sunt valde funesti.

Curatio consistit primò, ut materia acido-viscosa & mucilaginosa in ventriculo vel alibi latens, coacervata & turgentiam efficiens ocyùs educatur, id quod fiet *Venesectione*, si nihil obstat: *clysteribus lenitivis*: vel *vomitarijs*, quæ præfens levamen adferunt. ad vomitum autem ciendum lingua digitò comprimat, vel pennâ oleo intinctâ fauces illinantur: Dixi *venesectione si nihil obstat*. Ubi nota in Pueris 5. 6. vel 7. annorum eandem esse evidens remedium. Vel leniens sequens ad educendam suaviter materiam est convenientissimam. *R. Pulv. mechoacan. albiss. ʒiʒ. sæul. pæon. pulv bulbi majal. ana ʒʒ. succini catarrhal. ʒj. M. & detur sæpe cum pulve vel lacte cuspis cultri.*

Ad resolvendam materiam reliquam peccantem incidentia appropriata adhibeantur.

℞. *Spec. diatr.*

facul. aron. ana ʒj

cran. human.

succin. catarrh. ana ʒj

M. F. Pulvis, detur aliquid cum lacte vel pulce.

Vel ℞. *Aq. menth.*

fenic. ana ʒj

cort. aurant. ʒss

spir. sal. ꝯci anis. gutt. x.

ol. menth. gutt. j.

sir. tussilag. ʒvj.

M. & detur modicum ex cochleari; & si vis pro majori effectu, adde *theriacæ cœlest. gr. j. vel ij* Nutrici verò detur *Decoctum pectorale. Decoctum raparum cum sacch.* sæpius Infantibus datum est expertissimum. *Sperma ceti rec. non rancid.* ad ʒss vel ʒj. datum mira præ cæteris præstat, præsertim si gr. j. *croci* eidem addideris: *Succus raphani recens cum sacch.* temperatus etiam efficax est. Valent etiam *Aq. asthmatica looch san. card. bened. scabios. veron. taraxic. raparum, salviæ, tussilag. byssopi, malvæ, pulm. vituli. Balsamus Fris anisatus, terrebintb. una vel altera gutta exhibitus: Elixir Propr. s. a.* eodem modo adhibitum, *butyrum viride, cancrinum, Conserva flor. bethon. rosar. veron. bellid. looch ad asthma, de farsara, sanu. & expertum. Decoctum galli veteris, pectorale Aug. lac mulieris. Liquor pectoral. Myns. sine aq. cinamomi. flores & lac Fris: margar. ppt. corall. ppt. ocul. ʒss. crudi vel ppt. nitr. perlatum, quod roborat, refrigerat & malignitati resistit. Oleum amygd. dulc. axung. anseris, gallinæ &c. Pilule de cynogloss. laud. opiat. Myns. vel Quercet. Theriaca cœlest. mediò vel uno granò exhibita, Theriaca Venet. per se vel cum alijs mixta ad*

unum

unum vel alterum granum. *Sacchar. candi penidium*, species *diatreos simpl. & Salomon. diatrageanth. calid. & frigid. & ex his factæ Rotulæ.* Syrupi & succi, *liquiritiæ, nicotianæ, de erysimo; capill. & byssopi, de jujub. veron. scabios. tussilag. de prassio, succus raphani cum sacch. Claretum meum pectorale.*

℞. *Aq. card. ben.*

scabios.

veron.

taraxac. an. ʒij

sacch. cand. alb. ʒij plus minus.

Coq. ad consistentiam tenuis syrupi seu clareti, cuiquandoque addo unum vel duo grana *croci*, detur cochleatim.

Tinctura croci, ʒnij ad paucas gutt. exhibita. *Pomum dulce* excavat. & replet. *saccharo* & modico *croco.* *Pulvis contra tussim Infant. Myns.* in cuspidē cultri cum vehiculo exhibitus. *Ceratum* pro prægmate cum *tacamabac. & ol. mastich.* tactum. *Empl. filij Zacchar. Ungv. de alib. pectorale, resumptiv. & Ol. lil. alb. irrbini ana ʒij. croci ʒj. M. pro Ungv. pectorali. Pediluvium* ex herbis *cephal. betton. verben. aneth.* subsequente inunctione plantis pedum cum *pingued. lucij piscis, sero birci vel cervi.* Plura vid. *tif. & cap.* sequenti de Catarrho.

CAPUT XLIX.

De Catarrho, Tussi, & Pectoris oppres- sione,

Catarrhus est humoris excrementitij, potissimum verò lymphæ, cum vel sine sanguine per arterias, vel lymphatica vasa, in certas corporis partes influxio, aut in iisdem facta stagnatio. Hic affectus, cum tussim, difficilem respirationem, vigiliis,

galias, vomitum, herniam, suffocationem, imò & ipsam mortem quandoque inducere possit, negligendus non est.

Tussis, est vehemens, crebra & sonora spiritûs copiosus est pulmonibus efflatio, à veloci & convulsiva contractione pulmonum, musculorum thoracis & diaphragmatis, ab acris humoribus dictas partes vellicantibus, orta. Si enim pituita, vel glutinosa materia acida in ventriculo fluctuet, & ea successivè irriter orificium superius, tunc insensâ & molestâ suâ præsentia vel saltèm halitibus, seu fuliginibus acrioribus, sub expiratione occasione vellicati diaphragmatis, ipsique compatiendum musculorum expirationi inservientium, convulsivi motus & inde tussis (quæ tenella concutitur pectora) excitantur.

Reverà enim ex stomacho cujusque in se ipso coacervatis cruditatibus, Infantum exoritur tussis, subindè tantâ violentiâ repetens, ut non nisi superveniente vomitu, & copiosi muci rejectione, ad tempus cesset; rara autem, (ut vulgus credulum opinatur) Infantibus tussis ex laryngis & asperæ arteriæ irritatione oritur, nisi interdum dum inelementioris aëris afflatus ad hanc disponit. Idem asserendum judico de illa tussi, quæ sub dentitione laboriosiore, frequenter turbat Infantes, quam copiosior subinde salivæ nitroso-acrioris defluxus in stomachum, & imprimis uberior ejus ex membranâ pituitaria transudatio, & inde defectuosa reddita prima digestio, & cruditatum cumulatio infert. Unde nota: talem tussim à modernis Medicis dici *convulsivam* seu *suffocativam*; cujus ratio formalis in duobus consistit. Primo in crebra & vehementi pulmonum irritatione, quâ ferè continuò ad ejiciendum concitantur. Secundo in hoc, quòd partes thoracis motivæ quoties irritantur tussim non regularem, sed hanc convulsivam, id est, ordinario respirationis muneri oppositam excitent, in qua pulmones constringi & thorax coarctari ità videtur, ut & ipsa respiratio libera, & sanguinis per pulmones circulus impediatur, hinc facies eorum intensè rubicunda esse solet.

Ecc

Curatio

Curatio consistit in hoc, ut materia acido-viscosa in ventriculo vel alibi latens, vel intemperies quæ materiam suppeditat, emendetur & evacuetur. Nutrix præprimis optimam dietam, ut suò locò dictum, observet, imò nec oberit eidem remedia convenientia porrigere.

Ad resolvendam materiam, valet præprimis *jusculum decoctionis raparum* cum *sacch.* sæpius Infantibus datum. Ad evacuationem vero. *℞. Pulv. mechoacan. ʒiʒ. bulbi majal. secul. pœon. ana ʒʒ. succin. catarrhal ʒj, M. F.* Pulvis, detur modicum cum lacte vel pulce. Vel *℞. Syrup. mannat. Horst. ʒʒ. plus minus, magist. mechoacan. gr. ij vel iij. plus minus. M.* pro dosi. Vel dari potest *Syrup. rosat. solut. Cass. extract. Manna solut. &c.* Vel injiciatur iteratò *clyster lenis*: vel linguâ compressâ vomitus exciteretur. His præmissis, sequentia plurimum laudantur. *Sperma ceti recens* per se vel cum vehiculo, *Succin. catarrhale. cran. human. Pulvis meus Infant. Pulvis contra tussim Infant. Myns. Spiritus sal. armon. aromatizat. Liqueur C.C. succinat.* qui ambo præstantissimi sunt: *Pomum dulc. e* excavat, impleatur *pulvere sacch. cand. alb.* additis tribus granis croci integri, sicque affetur in ollula, da medullam Pueri tussienti; Sunt qui & *oliban.* addunt, & sic ab infarctu mirè liberant. Ex *ol. amygd. dulc. rec. & sine Δ* express, & *saccharo Penid.* fiat mixtura instar looch, indatur id sæpe Puerulo à tussi vexato; efficacius erit, si *syrupum violar. vel liquirit.* adjicias. Da potui *Aq. hyssop. cum sacch. candi* edulcoratam; aut fiant Rotulæ cum *emulsione sem. papav.* sic enim tussi medeberis & quietem conciliabis: vel *Aqua pulmon. vituli* cum *syrup. de hyssop. vel scabios* frequentius porrigatur, Sequens *Mixtura* valde celebris est.

*℞. Ol. amygd. dulc. rec. ʒj
man. elect. ʒvj
extract. liquirit, ʒij*

la&.

laſt. ꝥis ʒj
cum aq. ſcabios. ʒv
Miſce & detur cochlear parvum.

Vel ꝥ. Syr. flor. acac.
mell. roſat. ſolut. ana ʒvj
mechoacan. alb. ʒʒ
jalapp. reſinos. gr. v
aq. flor. acac. ʒiij
ſœnicul. ʒj.

Miſce doſis: cochlearia duo, ſemel vel bis in die, pro Infante
unius anni. Clyſter ſequens efficax eſt:

ꝥ. Summit. aneth.
flor. chamomill.
ſambuc. ana Pj
ſem. ſœnic. ʒj

coque ex brodio inteſtini vituli vel agni q. ſ.

ꝥ. Huius ʒiv vel v.
adde mell. roſat. colat. ʒj
M. F. Enema pro Pucro.

Laudantur etiam *Rotul. diatragac. frigid.* vel *Rotulæ perlæ*.
ꝥrate. Sorbait dat ad lambendum Syr. mannat. *Horſt.* à ʒvj
ad ʒj vel ſolvit in juſculi carnis ʒvj ol. amygd. dulc. rec. ʒij &
optimè facit. *Looch de paſſulis* cum mucilag. ſem. lini vel cy-
don: vel mixtum, eſt blandum temperans.

Extra capiti imponantur cum lino vel bombace pulv. ma-
ſtich, oliban. ſuccini, vel fiat ex ijs ſuffumigium, addendo gum-
mi juniperi: Vertici apponatur Empl. pro pregmate, vel Empl.
cephal. vel de bethon. Peſtori applicanda Ungv. peſtorale. Empl.
ſlij Zacch. Solex pedum illinantur pingv. lutiſ pifeis, vel le-
poris, vel ſervò hirc. vel cervi. Peſtus, ſpina dorſi, coſtarum
regio, cum Ol. amygd. dulc. violar. lil. alb. vel pingued. capon.

Ecc 2

aquam

aquam non expertâ, inungi potest. Ubi nota: hanc pingued. in jure pisorum, optimo successu epotam à puerulis tussientibus, testatur experientia.

Pedum lotio etiam plurimum juvat, facta ex *decoct. rosar.* addito uno vel altero *papa v. capite*, pedes autem tam post inunctionem quàm lotionem involvendi pannis calidis. Nares obstructas inunge *butyro rec.* vel *ol. amygd. dulc.* vel *amar.* sæpius de die.

Vel ꝑ. *Succ. betæ*

majoran. ana ʒij

albin. ʒß

ol. amygd. dulc. ʒj.

M. & Nares cōsæpius inunge, vel *butyrum rec.* naribus indatur, vel naribus *majoran.* admove ut sternutatio excitetur.

Riverius *obs. 55. cent. 1.* asserit ex Mercato, febres, tussis, & catarrhos in infantibus oriri ex vitio & imbecillitate renum non trahentium serum: unde consulit inungi regionem renum *ol. Scorp. Matth.* ter de die, & sic urina prodibit copiosior, quæ aliàs facta est materia catarrhi: si verò hoc non juvaret, *clysteres & jacula aperientia* ex Mercato *cap. 13.* de suppress. urinæ in Pueris commendat.

Quod si alicui hæcenus dicta & dictata non videantur sufficientia pro evacuatione, revulsione, interceptione, præparatione, coctione, intransatione, attenuatione, edulcoratione, partium roboratione &c. sequentia adhuc generalia huic capiti addere placuit. Valent proinde pro vehiculis: *Aq. card. bened. scabios. veron. taraxic. pæon. caponis, pulmonis vitul. &c. Balsama majoran. rosmarin. lavendul. rut. salvie, succini. Confectio alkerm. compl. & incompl. smaragdina: Theriaca Venet. celest. laud. opiat. Pilule contra tussim Schrö. de cynogloss. C.C. ppt. corall. ppt. margar. ppt. crystall. mont. ppt. flor. & lac æris, succinum catarrhale Michaël. Cucupha A.A. Conserva flor.*

flor. anthos, bethonic. pæon. nymph. rosar. tunic. diacod. montan. butyr. viride. Elixir proprietatis s. a. Essentia vel Tinct. pæon. liquor C.C. Balsam. coelest. Tinctura, corall. ligni sassafr. Myrs. castorei, lunæ, Essentia ambræ, lignor. &c. Unguentum rubrum.

CAPUT L.

De Respirationis interceptione, vulgò von den Heckerl und Verkanchen.

Hic affectus, ad speciem singultus referri potest; est autem spiritus interceptio subitanea, quæ Infantibus plorantibus plerumque accidit, ubi cum insigni sonitu & singultu quasi plorant, ita ut ipsis interdum vox interceptiatur: plerumque accidit ex ira, vel voluprare seu risu: ubi enim fit vehemens passio, vehemens quoque fit cordis agitatio, & sic etiam magnus spiritus imperus & emissio, qui cum confertim exire nequeant, interceptiuntur. Hic affectus proprie singultus non est, quia non accidit in ventriculo primario, sed pulmonibus & diaphragmate, dum nimirum spiritus ex dictis passionibus à corde vicinè ad pulmones & diaphragma ruunt, unde eorum convulsio quædam accidit, à qua eorum motus impeditur, respiratio cessat, & spiritus interceptitur.

Curatur hic affectus à mulierculis, manu dorsum Infantis percutiendo, ut spiritus vel vapor ille dissipetur. Reliqua omnia ea, quæ in Epilepsia & convulsione dicta sunt, hic quoque proderunt.



CAPUT LI.

De Hypochondriorum & Costarum succretione, inflatione, Pectoris angustia & Cardialgia:
vulgo von den Unterwachsen der Rinder Brust-
sichtigkeit / und Herbsgepann.

H*ypochondriorum succretio* est quædam durities seu reñitencia, quandoque inflatio seu intumescencia ventris & hypochondriorum sub costis nothis, cum angustia oris ventriculi, compressione, cardialgia, febricula, pulsus celeritate, læsa respiratione, colore faciei pallido, oculorum & faciei intumescencia & demissione affligens, à cruditatibus, flatibus, vermicibus, acido excessivo vel corrupto, ut *tif.* de torminihus & vomitu diximus, orta, talia enim acida excessiva & glutinosa, hærent in ventriculo posse nemo dubitat, & quò diutius ibidem hærent, faciliè ex acore fermentativo, pastæ instar farinaceæ intumescunt & effervescunt, & impetuoso flatuum provenitu, intumescenciam præcordiorum, hinc diaphragmatis impedito motu, difficilem respirationem, & ex horum flatuum in sinistrum os ventriculi impetu, hujusque pertinaci strictura, præcordiorum anxietates, inquietudines, somni impedimenta & vigilias inferunt. Eadem est origo inflationis hypochondriorum & totius abdominis, tympaniticæ distensionis, locò enim tantum differunt à priori.

Curatio. Præmissis præmittendis universalibus prodest *sem. anisi* cum *aq. botryos.* Vel *ꝛ. Pulv. rad. ireos. sem. anisi ana ʒj fecul. pœon. ʒj. M.* Dosis cuspis cultri. Vel *Pulvis meus Insantum.* Laudatur præterea *pulvis anisi* cum dimidio corallorum, Eleosacchar. anisat. Spiritus sal. armon. anisat. Decoct. Cardiacæ; *aq. flor. acaciæ;* sequentes *Rosulæ* valde recommendantur.

ꝛ. Chalyb.

℞. *Chalyb ppt.*
ocul. ʒ ppt. ana ʒj
tartar. vitriol. ʒ℥
sal. prunell. gr. xvj
spec. aromat. rosat. ʒj
facch. alb. ʒij

M. F. Rotulæ

Efficacissimum & tutum ac simul laxativum remedium est sequens.

℞. *Aq. lupul.*
gramin.
cichor. ana ʒiv
rbabarb. el. ʒj
coq lento igne adde
fir. de cichor. c. rbab. ʒj
facch. parum.

Dosis ʒj. sæpius iteranda ex cochleari. Vel exstingue ter quaterve *chalybem* in decocto *aperiente*, & hujus da ʒj. Puero.

Danda quoque opera est, ut Infanti aliquid à cibis subtrahatur, & parcius nutriatur, neque novus cibus offeratur, priusquam jam assumptus, non concoctus fuerit, nè cruditas augetur.

Chysteres etiam in hoc passu plurimum præstant, qui suo loco videri possunt. Externe prodest *Ungv. Cardiac. Schröd. ol. amygd. dulc. lil. chamomill. Ungv. ad inflationes Prævotij, Ungv. deopillat. Cataplasma ex cherefol. in butyro frigo.*

Vel ℞. *Unguent. alth. comp. ʒj*
de arthanit.
martiat. ana ʒij
ol. lil. alb.
chamom. ana q. ʒ

M. eff

M. Est expertum in contabescencia corporis & intumescencia abdominis, vel *Ungu. Stobelberg.*

℞. *Ol. olivar.*
axung. anatis
sapon.
porci
sapon. Venet. ana ʒi
capar. coct. Num. 12.

Fac de his Unguentum, quo frequenter inungantur costæ spuræ.

Plura si quis desiderat, interna & externa remedia, videat *Cap. de torminibus.*

CAPUT LII.

De Nausea & Vomitu, vulgò von Edel und Brechen.

Nausea est inane vomendi desiderium cum anxietate, quo noxia naturæ conatu expelluntur.

*Vomit*us est materiz visibilis in ventriculo contentæ per superiora cum impetu facta rejectio.

Alius est criticus, alius symptomaticus. Prior ex natura bene operantis instinctu, posterior præter naturæ intentio nem contingit.

Cause: Vel est lactis copia, vel pravitas, ventriculi debilitas, mucus viscidior & tenacior, cui per pylorum transitus negatur, hic mucus ventriculum unâ cum bilis acrimonia occupans, & spasmodicè vellicans & contrahens nervosas partes, prius nauseam, postea vomitum excitat. Si vomitus sit criticus & per essentiam, ac simul nausea urgeat, non sistendus, usque acris latex vel bilis, aut tenax illa saburra eliminata fuerit, quin potius prò movendus cum jusculis pinguibus & oleosis, & postquam

quàm sufficienter horum evacuatio successit, ventriculus restau-
randus, quia sic excrementa illa remover, & graviorum malo-
rum imminentiū Medicus constituitur.

Pro revulsione possunt adhiberi *clysteres*, qui peristalticum
illum perversum intestinorum motum, versùs inferiora corri-
gunt, & ita vomitum cohibent. In omnibus ventriculi affe-
ctibus ab hac vel illa causa prodeuntibus, polychrestum & ex-
pertum remedium, est sequens *Pulvis*,

℞. *Pulv. bezoar.* ʒj
ocul. ʒi ppt.
cinnab. zii ana ʒj
castor. ʒß
theriac. coelest. gr. iv
ol. still. cinam.
menth. ana gutt. j.

Misce. *Dosis* gr. v. ad x.

Pulvis meus Infantum non minoris est efficaciz, licet mi-
noris pretij.

Multum præstat *Spiritus nitri dulc. Theriaca Veneta rec. co-
lestis: laud. opiat. perlat. Myns. vel Quercet.* cautè tamen adhi-
bita: ab his enim sistitur & compescitur confluentium humo-
rum ad ventriculum & intestina, effervescencia. *Syrupus men-
the, cydonior. granat. corall. agrestæ &c.* etiam magnè est effi-
caciz. *Pulvis Ettmülleri,*

℞. *Pulv. N. M.* ʒj
corall. rubr.
caryoph. ana ʒß

Misce, detur parum per vices.

Si à lacte vomitus sit, statim amovenda Nutrix, vel lac emen-
detur.

Nota: ut quis agnoscat utrum vomitus procedat à causa vi-
tiosi lactis, an verò vitio ventriculi, signum hoc est. Si lac
Nutricis vitiosum sit, illud Puer non libenter assumit, sed re-
nuir;

nuit; si verò libenter assumat, & tamen revomat, vitium ventriculi est.

Paulus Sorbait sequens commendat. *Pulv. thuris: sal. absynth. ana ʒss cum Syrup. de rosis siccis q. s. detur ad lambendum.* Laudatur à Rhale *syrupus de mentha*, addendo unum vel alterum granum *gallie moschatæ*. In omni vomitione nullum est præsentius remedium quàm si *caryophylli aromatici ʒss gran. mastich. ʒij. simul concisa in vini rubri ʒvj. ebulliant*, & ejus liquoris cochlear Infanti præbeatur. Vel si absit præternaturalis calor, olei *caryophyll. gutt. j. vel ij. cum pauxillo vini exhibeantur.* In lacte, è quo Puerulis pulmentum conficitur, coquantur flores *consolidæ regal.* Vel *avellane* quantitas *coralli. rubr. pulverisat.* pulmento sæpius inspergatur: Usitatæ quoque sunt *Aq. cinam. cydoniat. vel buglossat. mastichina, plantag. theriac. rosar. bordei.* Item *Confectio de hyacinth. alterm. compl. & incomp. Conserva rosar. antiq. Blata; Theriaca Veneret. rec. & vetus, Theriaca cœlest. laud. opiat. Succolad. Inda; Elixir ppriet. cum vel sine acido; Elixir vitrioli Myns. Tinctur. ppriet. Myns. Essetia absynth. & sulphuris per campan. tacta. Crocus Mart. adstring. corallia, bolus armen. terra sigillat. margarit. specific. stomach. Poterij. Pulv. stomach. Birckman. Sal absynth. spec. diamb. diawoschi dulc. spodium ppt. C. Custum.*

Extra valent sequentia applicanda, quia Infantium stamina nervosa, sunt adhuc valde tenera, & ideo effectum suum melius præstant. *Acetum rosac. acet. zedoar. acet. bezoart. vel theriacale, cataplasma de fermento Grüling. vel de fermento cum pulv. absynth. mastich. menthæ, nucis moschat. rosar. rubr. cum vino rubro & aceto rosaceo; Ceratum Stomach. de crusta panis; Empl. nervin. Zwölff. de tacamahac. panis tostus cum aceto* applicat. *Empl. rubrum Dolci expertum;*

Gum. tacamahac ʒss

myrrh ʒvj

mastich. ʒij

pian

111

pulv.

pulv. santal. rubr. ʒiʒ

rosar. rubr. ʒʒ

ol. N. M. ʒij

maslich.

absinth. ana q. s.

cera parum.

Ad consist. emplastr.

Vel mixtura ejusdem Dolei efficacissima ventriculo applicata, ex Chocolat. confect. alkerm. oleo nuc. moschat. balsamo Peruviano, cinamomo cum vino malvat. parata.

Linimentum Pauli Sorbair,

℞. Ol. nucist. express.

bals. de Peru

ung. stomach. ana ʒij

mosch. ʒʒ Misce.

Emplastrum Joëlis in vomitu bilioso & alvi fluxu bilioso expertum.

℞. Pulv. maslich.

aloes

acatiæ

gallâr.

oliban. ana ʒij

panis tosti & in *to rosac.

macerat. & rursus express. ʒʒ

subigantur cum f. q.

ol. rosac. & addira

Farin. fabar. q. s.

F. Emplastrum.

Valeat etiam Ceratum ex ladano ; Frustum panis vino malvat. imbutum & aliquot guttis ol. macis conspersum & calidè applicatum, Umbilico indatur Theriaca Venet. Sacculus Strobilberg.

Fff 2

℞. Ro-

℞. Rosar.
mentib. crisp.
puleg.
chamom. ana ℞j.

Ponantur in sacculo & bulliant in *vino rubro*, ponatur sacculus calidè supra foveam cordialem, seu scrobiculum cordis, quam mulierculæ das Hergrübl nuncupant: *Amuletum* dicitur *corallium* contra vomitum si è collo appendatur.

CAPUT LIII.

De Ructu & Singultu, vulgò das Hederl und Schluden.

Ructus & Singultus est motus ventriculi pravus, convulsivus & inanis sursum versus à natura irritata, noxia cum sonitu & contorsione elidere tentante, ortus.

Causa, est copia & repletio, vel prava qualitas lactis vel pulricularum; illud nempe coagulum corruptum & acidum, tenax instar mucii & glutinis, superiori ventriculi orificio firmius inhaerens: ex hoc enim mucio acidiores & tenaciore, ejusque fermentativo acore & mucositate, flatus, inde ructus & singultus, tandem etiam vellendo acrimoniâ suâ nervosas partes, ob nervos sensibiles & propter firmissimam diaphragmatis connexionem, non modò singultus, sed & ipse vomitus excitatur. Hoc malum non est exigui meritis, præsertim in naturis tam teneris, quæ violentias sine periculo non sufferunt.

Curatio consistit in ijs quæ flatus discutunt, ructus tollunt, & acidum à quacunque causa ortum corrigunt, ut videre est locis jam supra citatis, maxime autem de lactis & pulricularum vitijs.

Sunt nonnulli Famosi Practici, qui *vomitum* multum laudant, evellendo quantocyus acidas istas fordes ventriculo adhaerent-

hzrentes, hoc autem præstabitur si lingua digito comprimatur, vel pennâ oleo illita fauces inungantur. Valet etiam *Aqua cinam. cydoniat. buglosiat. menthae, mastich. zedoaria. Conserva absynth. mentb. rosar. antiqua. Electuar. diascord. Theriaca Venet. intus & extrâ; Theriaca cœlest. laud. opiat. castoreum, & omnia ex castoreo facta. Elixir ppriet. Elixir vitrioli Myns. Spiritus croci, Tinctura anodyn. Tinctura bezoart. Syrup. corall. de absynth. cinamomi, cort. citri, de menth. de agresta, violar. granator. Bolus armen. ppt. corall. rubr. margar. terra sigillat. Spod. pptum: Specific. Stomach. Poter. Pulvis analept. Mindereri. Pulv. Stomach. Birckman. Pulvis meus Infantum. Pulvis Joëlis contra singultum.*

℞. Pulv. C.C. ussi
corall. rubr. ppt. ana gr. xv.

Misce, & exhibe cum lacte aut syrupo menthae,
Ettmüllerus sic habet.

℞. Pulv. C. C. ussi
corall. ppt. ana ʒj
ol. still. cinamom.
anis. ana gutt. ij

M. F. Pulvis. Dosis cuspiis cultri.
Pulvis in singultu Dolei.

℞. Pulv. N. M. ʒß
ocul. ʒ ppt. ʒj
castor. ʒß
corall. rubr. ppt.
caryoph. ana ʒj
ol. mentb. still. gutt. ij
theriac. cœlest. gr. iij

M. F. Pulvis. Dosis ʒß. Pulvis anisi etiam est expertus.

Extrâ valent sequentia: foveatur ventriculus decocto vel cataplasmate ex mentha, absynth, anetho, rad. cyper. Cataplasmate
Fff 3 contra

contra singultum *Myns. Timæi, de fermento Grüling. vel mastiche & thus cum albumine ovi agitata cum stupa canabina orificio ventriculi imponatur. Vel inungatur oleo menth. mastichin. anethino, carvi, cumin. anis. macis, nuc. moschat. salvia, castor.* In singultu quandoque sterutatio excitanda & narës titillandæ, sterutatio enim teste Joëlio singultum tollit. Contra singultum præbeatür odorandum *sem, anethi* linteo inclusum.

CAPUT LIV.

De Ictero seu morbo Regio, seu Arcquato vulgò die Gelbsucht.

Icterus est color totius corporis flavus vel niger, à bilis flavæ vel nigrae in cutem universam effusione à varijs causis facta, ortus. Duplex est, *flavus & niger.* hoc affectu Infantes non tantum jam nati, sed & in ipso utero existentes, afficiuntur, plerisque tamen mox à partu supervenit: hic morbus facile cognoscitur ex ipso totius corporis vel plurium partium pravo colore, ex urinis flavescenribus & lintea tingentibus, & ex alvi faecibus quæ albicant.

Cause sunt vel ductus bilarij obstructio facta à meconij, vel alterius humoris viscidij præsentia: vel à bile particulis sulphureis in massa sanguinea nimis scatentibus imprægnata, volatili & acri reddita; unde ex Matribus rebus spirituosioribus & volatilibus, id est spiritu vini, vel vino Hispanico &c. indulgentibus, nati, statim à partu utero ictero inficiuntur.

Cura absolvitur oleosis, salibus lixiviosis internè & externè usurpatis; alvus si strictior sit, sollicitetur *Syrupo de spina cervina*, additâ *rasurâ ebor. pulverisatâ* vel *Syrupo de cicbor. cum rhab.* vel *rhab.* aliisque convenientia potui ordinario Nutricis indantur; postea exhibeantur varia *incidentia & aperientia* dum

Etum cholidochum. Dentur quotidie de *Tinctura croci guttæ* aliquot, vel *croci gr. j. in lacte*; vel *bezoart. mineral. gr. j. pro sudore.*

Riverius *cent. 1. obs. 18.* Puerulum recentè natum, à Matre tertiana laborante ictericum factum, bimestrem ætate, hoc *syrupo* restituit:

℞. *Rad. rub. tinctor.*

chelidon. maj. ana ʒij

fol. chelidon. maj.

cent. min.

absynth. pont. ana Mij

cinanom. ʒij

croc. ʒß

coq. in ∇ *fontan. ad ʒj*

in colatura dissolve

sacch. alb. ʒj

Fiat Syrupus de quo capiebat exiguum cochlear manè per 20 dies & perfecte restitutus est.

Grülingius in Puerò icterico hanc *Mixturam* præscripsit cum affectu.

℞. *Syr. de cicbor. c. rhab.*

s. rad.

aq. cusc. ana ʒjß

Misce, detur quotidie manè parvum cochlear, sub vesperam verò de sequenti bolo paxillum.

℞. *Cons. rosar. ʒj*

ʒri vitriol. ʒj

syr. de cicb. c. rhab. q. s.

M. F. Boldis:

Decoctum pro potu ordinario gratum & efficax pro Infantibus;

℞. *Herb. fragar. cum. toto, cusc. ut. ana Mj. passul. min. concis. vel contus. (aliàs enim nihil præstant) ʒij. ʒri crudi albiss. ʒij.*

- 8 2 2

plus

plus vel minus coq. in f. q. decoct. bord. ad remanent, ubi. in qua dissolve syr. berber. vel syr. bizant. simpl. q. s. ad gratum saporem, hoc decoctum etiam valet in febribus Infantum.

CAPUT LV.

De Alvi profluvio, Diarrhæa & Dysenteria, von den Durchbruch/ rothen und weißen Ruhr.

Diarrhæa seu alvi profluvium, est immoderata & frequens ac diuturna alvi dejectio, ab humoribus sinceris, quantitate & qualitate peccantibus, meconio, lacte, & cibis corruptis, catarrhis, affectibus ventriculi & intestinorum dentitione, vigilijs, doloribus &c. ortum duccns.

Dysenteria est intestinorum ulcus, dejectiones crebras, cruentas, purulentas & dolorificas inferens, ab iisdem diarrhææ causis, sed violentioribus, acrioribus & sæpe malignis &c. originem trahens.

Cura utriusque secundum magis & minus & pro varietate causarum differt.

Cura alvi fluxus commodè fit, ut primo *abstergentia* adhibeantur, ex decoct. bord. & syrupo rosato solut. In dysenteria Nutrici statim detur ʒj. rhab, vel ʒss vel ʒj. Infanti, in iusculo vel lacte. Vel adhibeantur *clysteres* primò etiam *abstergentes* ex decoct. bord & syr. rosat. solut. vel

ʒi. Decoct. sem. milii

myrobal. omn. ana ʒij

syr. rosat. simpl. ʒss

Misc. fiat Clyster: hoc semper observando nè clysteres in magna quantitate injiciantur.

Nutrices interim optimam dietam servant, & abstineant à fructibus & crudis ingestionibus.

Secun-

Secundò: his factis, postea adhibenda sunt intus & extrâ *adstringentia balsamica*, qualia sunt *carminativa*, *theriacalia*, *bezoart. opiata*, quæ dolores & intestinorum convulsiones tollendo, acrimoniam delendo, alvi fluxum sedant; inter hæc eminent sequentia:

Magist. corall. cum succo citri fact. corall. ppt. ebur. ppt. nux. moschat. mastix, Theriaca celest. Theriaca Venet. recens, terra Catechû, aq. cinam. buglossat. cydoniat. Syrup. corall. aq. mastich.

℞. *Essent. theriacal. ʒj*

anodyn. ʒß

balsam de Peru ʒj

M. Dentur guttæ aliquot pro ætatis & symptomatum ratione.

℞. *Magist. corall.*

ebur. sn. Δe ppt. ana ʒj

pulv. cort. granat

mastich. ana ʒj

Misc. Sign. Pulvis confortans & stypticus. Stärckendes und anhaltendes Pulver.

Laudatur etiam *Pulvis stypticus Crollij*, *Syrup. cydon. myrtill.* vel *semen oxylapathi* cum vitello ovi super igne subactum & exhibitum. Vel *Pulvis meus Infantum.* vel *Pulv. myrtillorum* cum modico sanguine dracon. optima etiam & tuta remedia sunt *Gelatin. C. C.* cochleatim in iusculis adhibita; vel liquor *C. C. succinat.* guttatim adhibitus. vel *Pulv. sem. plantag.* ʒß adhibitus. Sorbait sequentem *Pulverem* laudat.

℞. *Pulv. sang. dracon.*

corall. rubr. ppt.

gran. kermes

sem. plantag. ana ʒj

M. F. Pulvis, de quo puliculæ aliquid inspergatur, vel in lacte detur.

Si lac est in causa, Nutrix mutanda, aut saltem lac corrigendum. Puerulis egregie alvum sistit, & à comitiali morbo liberat *mumia* cum *sperm. celi* ʒj. pondere exhibita, etiam in eruenta dysenteria, inquit Crato. Præterea lac puerorum sit ustulatum, aut si aquam potent, in ea sit ter extinctum *aurum*. Alij familiariter exhibent *juscula carnis* aut *gallinarum* *lympida*, in quibus *gummi Arab.* drachmæ pondere solvuntur est, hoc enim sine omni periculo est, & Puerulis, valde præ cæteris medicamentis expeditum.

Potus præterea sit *Decoct. crustæ panis inferioris in aq. communi*, duabus vel tribus ebullitionibus factum, vulgò *baß rammel Wasser* dictum.

Valent etiam *coagulum leporis* cum lacte vel *aq. plantag. rhab. tostum. terra sigillata*, *corall. rubr. bolus armen. alb. Græc. spod. pptum*, *ossa human. usta*, *amylum, confect. de byacinth. C. C. ustum, crocus & adstring. Theriaca Venet. & cælest. laud. opiat. Pulv. sperniol. comp. Crollij, pulv. meus anodyn. dysentericus Crolli, bezoart. Sennert. pulv. Joëlis* efficacissimus:

ʒ. Sem. lapatb.

uvær. torrefact. ana ʒij

glandium

sem papav. alb. ana ʒß

oliban. ʒß

Conterantur & fiat Pulvis subtilissimus. Profunt præterea *Aq. sol. quercus, tormentillæ, bursæ pastor. centumnod. plantag. Decoctum prunor. sylvestr. Tinctura bezoart. anodyna, corallor. terræ Catechi, rosar. papav. rhead. Gelatina C. C. simpl. vel cum ebore & viperis fact.* *Juscula ex pimpinella, idyocolla in lacte cocta*, vel *frustulum idyocollæ in lacte coct. & sæpius Infantibus* legendum datum. *Rob myrobalan. syrup. corall. de symphyt. Fernel. pulvicula ex amylo parata.*

Externè valent sequentia: *Ol. mastich. ventriculo inunctum.*

Æum. Ungv. anodyn. rosat. alabastr. Comitiss. Ol. myrru. nucist. ompbacin. bosciam. absynthij. Cataplasma ex varijs adstringentibus, vel sequens: ꝛ. Lini ex alveis fabrorum ferrariorum, in quo ferra candentia extinguuntur, admisce q. l. farina fabar. cum pauxillo aceto fiat Cataplasma. Emplastr. styptic. Mns. de crusta panis. ꝛ. Ungv. Comitiss. ziii. ol. nuc. moschat. ʒj. ol. mastich. q. s. pro inunctione. Vel ꝛ. Empl. diaphœn q. s. malaxetur cum ol. mastich. extende super alutam obducta syndone. Vel venter foveatur Decocto flor. rosar. verbasci, plantag. rad. cypert. mastich. cum vino rubro facto. Vel crusta panis theriacâ obducta, calida applicetur. Vel aqua mentha calida & madida imponatur vel huius loco sacculus ex mentha, rosis, absynth. mastiche, nuce moschat. caryophyll. &c. Multum laudantur etiam omenta animalium calida & applicata.

CAPUT LVI.

De Ventris inflatione & intumescencia,
vulgo das Unterwachsen/ oder harte
Seitthen.

HÆc affectio plerumque à cruditate ortum ducit, hinc flatus elevati, discuti non possunt, & propterea venter intumescit, & tensiones dolorificas Puerulis excitat cum ploratu, insomnijs & inquietudine. Szpissimè ex aquosissimo lacte suas primitias sumit hoc malum, quod visu quidem & tactu cognoscere faciliè est, licet causa non semper in propatulo sit.

Curatio. Liniatur venter cum *Pulv. absynth. cumin. caryophyll. croci*, exceptis cum *butyro rec.* aut novâ porci *axungia*: foveatur venter decocto aut cataplasmate ex *chamomilla*: lin-teum ex *aqua mastichina destillat.* madidum ventri imponatur, aut fiat litus cum *ol. mastich.* vel *Ungv. carminat.* vel *dialth. calendula,* *deopillativo;* *anodyno* &c. Præterea conveniunt ea

quæ in seq. cap. de alvi suppressione & duritie dicentur. Nutrix optimam servet diætam & regimen, & tam Nutrici quam Infanti sæpe adhibeatur sequens *Tragea. v. Sal. absynth. confect. sem. anisi, fenicul. aneth. ana ʒi. confect. cumini Rom. ʒß. facch. parum M. F. Trapæa.* Sæpe etiam expedit Infantem prorsus ab lactare, monente sic Hipp. 5. aph. 64. lactare (inquit) quibus alia sunt suspensa, malum. Proinde consonum erit & proficuum ut Infans expurgetur, idque vel *syrupo florum persic.* vel uno alterove grano *resinæ jalappæ.* In jusculis quoque & potu exhibeatur *herba lingua Cervina* vel *ceterach. Clysters* & *suppositoria* etiam sunt, magni usus.

CAPUT LVII.

De Excrementorum alvi suppressione & duritie, vulgò die Verstopfung des Leibs.

EXcrementorum alvi suppressio, est eorundem naturalis dejectionis defectus, dependens à varijs causis, uti sunt fecum induratio, diuturna pulricularum coctura, bilis in intestinis defectus & absentia, partium caliditas, assiduus decubitus, maximè supinus, somnus longior, & id genus alia. In praxi bene notandum & observandum, quòd ij valde peccent, qui Pueros, quorum substantia per inordinatos motus, & continuam auctiorem dissipatur, vehementi pharmaco evacuant: Infantulis igitur pax sit à tali pharmacia, & à purgationibus aut omninò abstineant, aut certè si necessitas urgeat, pharmacis id agatur benignissimis, alvum lenientibus, tum nutrici tum Infanti adhibendis. Nutrici detur *jusculum* in quo *fol. senn. cum sem. anisi* cocta sint, & pariter utatur alijs humectantibus; Infanti detur *manna* in jusculo, vel *brodium passulat. laxat.* Si adsit materia viscida, in paulò adultioribus addere soleo *pulv. jalapp.* tot granis, quot annos habent, Vel detur *Syrupus de spina Cerv.* solus,

Ius, vel cum *syrupo de fumar.* sæpe cochleatim adhibitus. In ablactatis Ettmüllerus adhibet aliquot grana *Ærij dulc.* qui cum resolvit & vermibus resistit, potestque misceri unum vel alterum granum cum lacte vel pulce. Si Infans ablactatus sit, & aq. coctam bibat, huic adhuc calenti, ad quantitatem ℥iv. impone. in petia ligatæ *rad. gramin. sol. senn. s. st. ana ʒi. pulpæ tamarind. ʒß.* bibat hanc aq. pro potu ordinari, & bene expurgabitur Infans: hoc remedio plures Infantes jam tumidos & hydropticos aut cachecticos curavit Sorbait. Laudatur etiam *Decoct. prassicæ rubræ: Cassia* in lacte dissolut. *passul. laxat. pruna laxat. poma laxat. Syrup. de endiv. de cichor. simpl. vel cum rhab. de prassic: mannat. Florst. flor. persic. rosar. vel violar. simpl. vel solut. jusculum carnis vitul. infusum flor. acaciæ, juscula ex malva, butyrum rec.* instar nucis ante pastum sumptum: *Oleum amygd. dulc. rec. express. cochleatim adhibiturum. Aqua ceras: nigr. cum aq. flor. persic. vel aq. flor. acaciæ. Potio Colennis Dolci.*

℞. Fol. sen. s. st. ʒiß

sem. anis.

scenic. ana ʒj.

acidi tart. ʒß

Infunde per noct. in *aq. malvæ & Mercurial. ana q. s.* manè coq. lento igne. In colatur. ʒiij. solve *manna Calabr. ʒiß.* iterum cola & adde *Syr. de cichor. cum rhab. ʒij. pulv. jalap. ʒß. Misc. vel ℞. Flor. violar. Mj. coq. in jure pisor. & da potui. Vel ℞. flor. cass. mann. elect. ana ʒß. M.* detur Puerulis sæpe quantitas nucis avellanæ, donec durescit alvi solvatur. *Aqua pisorum* una cum siliquis viridibus destillata, si per cochlearia subinde propinetur, in delicijs est.

Sunt nonnulli qui *anisum laxat. Augustan.* recommendant, quod ego non approbo, utpote non tantum nauscam & vomitum, sed etiam lipothymiam & alia periculosa symptomata

nvehens, præsertim ubi res agitur cum Puerulis minoribus.

Quibus à clysteribus metus non est, ijs *bydromel*, *jus carnis gallinæ* cum *ol. amygd. dulc.* vel *cremor bord.* sufficit: alijs *brodium pisor.* cum *sacch. nigro* seu *Thomæo* probatur. Vel fiant *Enemata* ex *lacte dulci* cum *terebintb.* ʒj. in *vitello ovi* soluta.

Vel *℞. Decoct. berb. emoll. ab ʒij ad iv,*
unguent. clysmat. ʒij

M. F. Clyster,

Vel *℞. Ol. rapar.*
lini ana ʒß
unguent. clysm. parum.

Nonnulli *Syrup. violac. laxat. simpl.* sine noxa adhibent: vel loco hujus *℞. Flor. violar. Mj. coq. in jure pisor. & da potui.* Vel *℞. Flor. cass. mann. elect. ana ʒß.* Misce. Detur Puerulis sæpe quantitas nucis avellanæ, donec durities alvi solvatur, Quibusdam in delicijs est *Aq. pisor.* unà cum filiquis viridibus destillat. Si per cochlearia subinde propinetur. Sunt quibus solum *ol. amygd. dulc.* cum *pulte* aut *cerevisia calida* exhibitum satisfacit: juvat etiam linctus *syrup. rosac. & flor. persic.* sufficiunt etiam nonnullis sola *suppositoria* è *sapone Veneto, butyro falso* aut *melle* parata. Vel ex *melle & speciebus hieræ picræ*, si fortiora desideres: vel *ficus* inveria filo alligata intrudatur alvo, Vel ex *sacch.* in debitam formam redacto vel ex *rad. petroselin.*

Quòd si autem hæc omnia respuant petulantes Pueri, externis agendum est Medico, Inter cætera autem palmam refert *balneum aq. dulc.* Præterea illorum umbilico vel abdomini multa applicari possunt, uti sunt *ol. anethi, lini, lil. alb. chamomill. Ungv. clysmat. de arthanita* umbilico inunctum est probatum, *Oleum chamomill.* calidum in quo parum *colocynth. co-*
ctum:

Hum: pinguedo anseris cum cort. nuc. jugl. cocta, est experta
Ol. diacolocynth. Pomum Porsdorff. putridum cum pingued. an-
 seris subact. calidè appositum. *℞. Ungv. de arthanit.* zii fellis
 tauri inspissat ʒj. *ol. diacolocynth.* parum, fiat Unguentum *℞.*
Aloës pulverisat. ʒj fellis bovini ʒij mellis & but. r. saliti ana-
 ʒss Misc. ad formam Linimenti. Butyrum in quo herba mercu-
 rialis & atriplex coctæ sint, multum præstat.

CAPUT LVIII.

De Terminibus Ventris, seu Colica, vulgò
 die Darmsicht und reissen.

Termina dicuntur quasi vermina, à vermibus dicta, unde
 verminare est tormina pati: tormina autem seu Colica est
 dolor seu tristis sensatio intestinorum, præsertim coli, à rebus
 continuum solventibus ortum ducens; Id est à pituita vitrea,
 tartaro, calculo, flatibus, vermibus, tumoribus, cibis erudio-
 ribus, pedum & ventris refrigeratione, bile porracea, lacte fla-
 tulento, frigido, aquoso, acri, falso, acido, corrupto, coagu-
 lato, quod pungit, rodit & lancinat.

Horum signa sunt clamor Puerulorum continuus, nec non
 ventris inflatio, rugitus in abdomine, excrementa alvi viridia,
 citrina, phlegmatica, quem colorem Authores à bile & succo aci-
 do excessivo & corrupto (sive pancreaticus, sive lymphaticus sit)
 deducunt; unde excrementa prodeunt sicut concisa ova, sive ge-
 hæste *Ayer*: de hoc colore & materia vide Graaf de succo pan-
 creat. *thes.* 145. & 147. Ad hæc etiam multum contribuit prava
 diæta Nutricum, ut supra abundè diximus *tit.* de lacte & pulcicu-
 la, potu & cibis &c. Sicut enim teneri arborum flores quavis aurâ
 facilius, quàm jam grandiores marcescunt, ità etiam fœtus tene-
 ri facilius quàm Matres, levissimo in diæta errore offenduntur.

Cura

Curatis: in hoc affectu bilis & alij humores peccantes, omnisque tormium tæx & causa evacuanda, alteranda, corrigenda, status discutiendi, vermes, si adsint, enecandi & expellendi, visceraque confortanda: Pro discutienda, resolvenda, & simul educenda tenaci & viscosa illa pasta (præmissis tamen quibusdam carminantibus) convenit *Syrup de manna, de cichor. cum rhab. flor. persic. rosat. solut. simpl. vel cum fol. senn. addito Pulv. mechoacan. vel jalap. ad aliquot grana.* Quod si ob debilitatem vel teneritudinem, Infantes talia purgantia ferre non possint, ea Nutrici in majori dosi sunt danda, sic vis per lac derivat in Infantem. Loco horum etiam conveniunt & prosunt *chysteres* tam emollientes quam carminativi, præsertim in materia glutinosa & tenaci v. gr. ex *Decoct. hord. veron. malvæ. parietar. ziali, fursuribus, anetho, semine anisi, fenicul. folijs lauri, menthæ, parietariæ, baccis lauri, flor. chamomill. cum sacch. rub. vitellis ovorum & ol. aneth. vel chamomill.*

℞. *Decoct. parietar.*

℥℥. *fl. chamom. ℥iij vel iv*

mell. rosat. ℥℥ vel j.

vitell. ovi dimidium M, F. Clyster.

Vel ℞. *Decoct. hord. ℥iij vel iv.*

ol. aneth. ℥℥ vel j.

vitell. ovi unum.

Si verò excoriatio simul podicis adsit, *Clyisma* simplex fiat ex *la-*
te cum paucis *sacch.* quo acrimonia temperatur, & ani & inte-
stinorum excoriatio præcaveatur.

Inter carminantia magnificat *Aq. carminat Myns. aq. zedoar. menthæ, fenicul.* additâ unâ vel alterâ guttâ *Spirit. anticolicici ex nitro Michaël. vel Spirit. nitri. dulc. vel Spiritus salis armon. volat. vel aromatizat. seu anisatus.*

℞. *Aq. carminat.*

fenicul.

menth.

menth. ana ꝑj
 spir. nitr. dulc. gutt. vi
 tberiac. cœlest. gr. ij
 essent. citr. saccharat. zwölf. q. s.

M. Detur cocheatim.

Oleum amygd. dulc. rec. express. ante cibum datum mitem præstat: sic etiam *semen anisi* contus. & datum cum pulve saccharato, expertum est, cui si addideris pro absorptione acridinis humorum peccantium *corall. rubra ppt. ocul. cancr. ana part. æq.* erit efficacius, præsertim cum lacte datum. Addi quandoque potest *lapis bezoar, sperma ceti, lac sulphuris.* Pulv. meus anodyn. Pulv. somnifer. vel Pulv. meus infantum vel pulv. March. Ut autem hi pulveres efficacius & felicius operentur, addatur modicum *castorei.* *Tberiacæ Venetæ* etiam pili instar multum facit, maxime sub vesperam adhibita, blandam enim quietem sopiendo tormina præstat: dari etiam possunt guttæ aliquot *Elixir ppriet. s. a.* vel una gutta *Tincturæ anodyn.* vel quadrans grani, vel medium *Tberiacæ cœlest.* Laudatur etiam *Pulmentum* pro Infantibus *Hertod.* in Chronologia de colica descriptum. Aliqui recomendant *juscula ex bordeo* perfecte cocto, & si calor jungatur, imprime medium *pomum aurant.* Pro interno usu, certo experimento constat, prodesse *Syrup. de chamomill;* pulti etiam commisceri potest tantillum *Pulveris baccar. lauri;* quandoque aptem causa non est manifesta, tunc lac condatur *radice pæon.* aut detur ꝑj Pulv. granor. pæon.

Sequens Pulvis est specificus & expertus,

gr. Bulbi majal. à ʒʒ ad ʒj
 tberiac. opt. lento igne vaporat:
 gr. j. vel ij. M.

Si adsit fluxus diarrh. symptomaticus ab acido procedens, pro illo absorbendo valent, *creta, corall. margar. ocul. cancr. lap. hæmatit. bolus armena* &c. Multum etiam prodest tam Nutri-

H h h

quàm

quàm Infanti aliquid à cibis subtrahere, & ideo etiam nec mamma crebrò præbeatur, ut sic crudirates faciliùs corrigantur; proinde abs re, non est, causas morbosicas non tantùm in Infante, sed etiam in Nutrice corrigere.

Quòd si autem pertinacius malum fuerit, nec talibus hucusque recensitis & crebrius repetitis remedijs acquiescat, ità ut vel ipsa Epilepsia metuenda sit, suprà dicti Spiritus salini volatiles in cura in genere propositi, sacra erunt anchora; vel sequens fiat *Mixtura*:

℞. Syr. de spina cerv.

seu domest. ʒ℔.

℞. ʒci anisat. ʒ℔.

oc. ʒ. ppt. ʒi vel ʒ℔.

M. diluantur cum pauca *aq. fenicul.* & ità cochleatim propine-
tur: *Aurum fulminans* magnè in hoc casu est efficaciz, mul-
torum experiencià teste: tormina sedando, alvum laxando, &
ab epilepsia præservando: datur Infanti aliquot dierum aut unius
septimanæ *gr. j.* per se solum, vel cum *gr. iij. nitri depurati*
mixtum, qui autem jam sunt aliquòt septimanarum ad *gr. ij.*
vel *ijj.* propinatur in lacte, vel quod melius in vehiculo idoneo.
Aq. destillat. in quibusdam operatur citiùs, in alijs tardius, de-
biliùs vel fortius, prout plus minus ab illo grumo & mucò ir-
retitur.

Suppetias hisce internis ferunt externa fomenta, inunctio-
nes, balnea &c. *Inunctiones* fiant ex *Ol. amygd. dulc. Oleo*
anethi, castor. chamomill. lil. alb. ruta, 7. Flor. Myns. item
adipes varij: pro horum autem majori penetratione addi pos-
sunt, in pauca tamen quantitate (dico pauca, nè horum acri-
monià dolor aut excoriatio inferatur) *olea destillata cumini,*
carvi, anisi, fenicul. chamomill. cort. aurant. *Alfine* trixa in
butyro & ventri Infantis imposita, potenter sedat ejus dolorem;
Zibeth, umbilico inditum est expertum, *℞. Ol. anethi, cha-*
momill.

chamomill. ana ʒiʒ. pulv. cumini ʒj. bulliant parum & colentur, & hoc oleo locus dolens inungatur, eſque efficac. remedium. *Olei juniperi gutt. j.* indatur umbilico. *Omenta animalium* recent. extracta & calidè appoſita, mira præſtant; id quoque efficit *catulus virvus* ventri impoſitus. *Ungv. anodyn. dialth.* magnam etiam opem ferunt: ita etiam *Linimentum* ex *opij gr. iv. & ol. nucif. ʒʒ.* *Inſeſſus, ſotus, ſuffitus, ſacculi. epithema- ta* ex carminantibus prædictis fieri poſſunt. *Empl. de bacci lauri* toti abdomini impoſitum, eſt expertum, maximè cum *ol chamomill.* malaxat.

R. Ol. chamomill. ſtill,
ſenicul.
carv.
anis.
cori. aurant. ana gutt. iv
cocti aneth.
lumbr.
caſtor. ana ʒj

M. pro uſu.

Si tormina ventris ſint contumaciſſima, prodeſt *Balneum ex ſor. chamomill. ſummitat. anethi, rutæ & fol. lauri.*

Quòd ſi tenacior mucus dictorum malorum fuerit author, exterius ſpeciale hoc *Unguentum* conducet, ex *gummi ammoniac.* in *aceto* ſolut. *ʒij. terebinth. aloës ana ʒj. ſervi cervini & butyri non ſaliti q. ſ.* pro conſiſtentia debita: & quoties illiniri debet, modico oleo. *aniſi ſtillat.* irrorandum, & ita dictis locis umbilicalibus toties, quoties opus, applicandum, & ſi opus, aliquali portione *fellis tauri* acueadum.

Noſtratus mulieres coquunt *abſynth. & anagallid.* in *ol. chamomill. anethi, abſynth.* & apponunt. Vel etiam ſomentum ex ijsdem herbis, addendo *mentham, aneth. verbaſcum, puleg. ſem. lini, aniſi* in vino coct. & ſpongiâ applicat. manè & velperi.

Hbb 2

Omen-

Omentum castrati in ol. aneth. frixum & applicatum. Balneum ex cerevisia in qua semen canabis contus. & coctum, multum valet.

CAPUT LIX.

De Puerorum Lumbricis, seu Vermibus, vulgò die Würmer.

EX ijs quæ præternaturam in intestinis Puerulorum retinentur, sunt plerumque Lumbrici seu Vermes. *Vermes* autem sunt animalcula reptilia toto genere præter naturam, præcipuè in intestinis, à materia per putredinem suscitata, functiones intestinorum lædientia.

Alij sunt teretes rotundi & longi, alij lati, alij parvi seu ascarides, priores die *Spulwürm* : medij & postremi, die *Waden* oder *Nestwürmer* dicti.

Causa horum animalculorum potissima & communissima vulgò assignatur, corruptum in ventre inferiore alimentum, cujus nomine potissimum, pituitam dulcem Veteres intelligebant. Recentiores materiam crassam, lentam, acidam, corruptam incusant. Juvant ad hoc, constitutio corporis calida & humida, voracitas cruditarum genitrix, rerum dulcium, fructuum horariorum & lactis nimius usus. Helmont ex alimento semidigesto deducit causam, unde ex melle & pane secalino vermes nasci dicit. Dolæus causam statuit, quod cum alimentis assumantur ova, quæ à muscibus in alimenta deposita sunt, vel jam in ipsis alimentis existunt, quæ in debili ventriculo Infantum non destruuntur, sicque vermes ex his alimentis producuntur, & in intestinis nutriuntur. Etmüllerus causam horum statuit mucum acidum, blandiorem tamen & dulciorem, ex alimentorum quocunque modo digestorum reliquiis in intestinorum canalibus diutius hærentem, occasione loci, caloris, & inchoatz succellivæ

cellivæ putredinis, occultata lumbricorum semina excitantem; foetusque vivos excludentem: Semina scilicet vegetabilium cerealia, in specie secalina & triticea, vel immediatè in pulve farinacea, vel mediatè ex lacte cum pane comesto, ingesta, genito seminali insectorum contagio (quod sub minima etiam mole latere potest) quasi imprægnata, data occasione hæc excludunt. Accedit ut mox dixi, debilitati coci blanda vis digestiva ventriculi debiliior, quâ digerendo non subiguntur dicta animalculorum semina, ob bilis temperatiorem naturam, alias succos Infantum quos attingit, à tam prompta putredine & verminatione defendens, unde & ibi quo fermentum fellis non pertingit, lumbricorum est patria, teste supra citato Helmont. Ex his itaque & similibus causis morbisicis, Infantes ventriculi & intestinorum rosiones, somnos turbulentos, febriculas inordinatas, epilepsiam, syncopen, cardialgiam, quidam caninam appetentiam, quidam nauseam, plures verò corporis contabescentiam perferunt.

Curatio. Maturè igitur hoc vivum excrementi genus expelli debet. In vermium expulsionem autem tria notanda veniunt: *primò* ut vermes ex cavernis suis proleantur, morsusque eorum ac inde proveniens dolor mitigetur: id fit rebus *dulcibus*, præsertim *lacte saccharato* & alijs mox dicendis. *Secundò* ut post prolectionem seu evocationem Vermes necentur, id fit rebus *acidis, acribus, amaris*, ac antipathiâ quâdam intensis, ut *aceto, vino, lupinis, absynth. corallina, Zedoaria, gentian, centauro, semine santonici, hyperici, C. C. usso, antimon, diaphoret. aloë.* Tertiò, ut prolecti & occisi è corpore eliminentur & protrudantur, ad quem scopum maximè conducit *rhabarb. & ex eo ppta remedia.* Riverius ex sola *biera picra, Cataplasma* ventriculo impositum commendat. Vel

*℞. Rad. gentian. 3℔
agar. albis.*

Hbb 3

sem.

sem. zedoar.

tanacet. ana ʒi

C.C. usti

ʒrii dulc. rit. ppt. ana ʒʒ

sacch. in aq. gentian. solut. q. s.

F. Rotulæ, vel Moruli pro usu.

Vel ʒ. Fol. sen. s. st. ʒvi

rhabarb. ʒij

cinamom. ʒj

sem. zedoar.

cina ana ʒij

summit. hyper.

tanacet. ana N. vj

Dentur incisa ad Nodulum cerevisiæ, vel potu ordinario indendum. Rhabarbaro succedit *mechoacanna* aut *rad. jalapp. flor. persic. Elixir ppriet. laxans. ʒ. Pulv. mechoacan. alb. corallin. ana ʒi jalapp. ʒi. M. Dosis* cuspis cultri plus minus. *ʒ. Syrup. flor. persic. aq. hyperic. portulac. ana ʒʒ. pulv. corallin. ʒii Dosis* cochlearj. vel plura,

Infer cætera maximè laudatur *diaturbith*, quod in hoc genere efficacissimum est & valde idoneum: nam rhabarbarum dicit Boëtius, Vermes maximè enecat, & turbith pituitam (Veterum) acidum viscosum (Modernorum) vermium fomitem deturbat, ita ut multi credant, an aliud medicamentum sic vermibus æque noxium, & ab Italis qui maximè vermibus scudent, promptissimè usurpatum. Prostant in officiniis passim multa remedia, potissimum autem pulveres, confectioes, electuaria, & alia id genus contra vermes dicta remedia, quibus & singulis suam laudem relinquo, & in Authoribus fusiùs legi & videri poterunt. Pro nobis sufficiant quædam selectiora & usitiora, inter quæ sunt sequentia:

Hel-

Helmont. laudat *Aq. communem* bullitam cum *argento vivo*; & sic pauco & innoxio potu omnes vermes necari ait. Sylvius extollit *sem. zedoar. saccharo* abduct. ad ʒʒ exhibit. in competentibus vehiculis: exhibet præterea *ʒrium dulc.* ad pauca gr. cum *ʒyr. rosat. solut.* vel alio. Eximius quoque est *Liquor C.C. succinat.* ad aliquot gutt. exhibitus. *ʒ. Elixir Oli Myns.* ʒj. *Essent. absynth.* ʒʒ. *M. Dosis*, gutt. vj. ad x. in vehiculo, præsertim dulci: hoc enim remedium vermes necat, corruptiones humorum impedit, & alvum subducit.

Nursinus quidam Circulator (ut refert Strobelberg.) totam Italiam oberrans, medicamento cuidam, ob insignem in abigendis lumbricis usum, famam & nomen attulit, quod recipit *coralline. sem. santoni. ana ʒj. dictamen alb. tormentill. bistort. ana ʒʒ.* trita subtilissimè & in pollinem redigantur, atque *aceto acerrimo* irrigentur, in umbra tam diu reponantur, quousque siccescant. *Dosis* à ʒj. ad ʒj. ex *vino* aut *aq. portulacæ.*

Gallicæ mulieres sumunt *coralline part. ij. dictamn. alb. part. j.* macerantque aliquandiu in *aceto*, deinde in pulverem redigunt, exhibentque pondere medix aut unius drachmæ, cum *vino, brodio* vel *aq. gramin.*

Notandum, quod ea quæ per os dantur plerumque esse debeant amara, per alvum autem quæ induntur, dulcia; priorum enim propellunt ad intestina, posteriora postmodum eliciunt; neque etiam uni medicamento est insistendum, quia facilè vermes assuescunt. *Chyteres* etiam prosunt tam *enecantes* quam *allicientes*; Enecans Clyster.

ʒ. Summit. absynth.

tanacet. ana Pj

colocynth. in petia ligat ʒʒ

Coq. in Aqua

ʒ. Hujus Decoct. ʒij

adde confect. Flamech.

mell

mell. rofat.

ol. absynth. coct. ana modicum

Clyster alliciens,

℞. Passul. maj. N. x.

caricar. N. vij.

coq. in lacte vel aqua.

℞. Hujus Decoct. ℥iv

solve sacch. ℥j

vel F. Clyster ex lacte & saccharo.

Suppositoria etiam valent maximè dulcia, ex lacte, vel melle, vel saccharo penidio. Qui trialibus uti nolunt, ij accipiant Pulv. gentian. cum C.C. pblice ppto, & admixtâ modicâ myrrbâ, quæ abjuratus est vermium hostis. Sorbait sequens laudat. ℞. Frij vivi purificat. ℥i. infund. in aq. portulac. ℥iv. fortiter agita, & aquam rejecto Frio exhibe, cavendo majorem dosin Fij. Plumbum liquefact. ter in aq. extinct. & exhibit, est infallibile remedium.

Nostrates Mulieres allium in lacte coquant & Infanti exhibent. Idem facit Decoct. abrotani & rad. gramin.

Cæteris nil juvantibus arcanum Timæi contra vermes bis vel ter cum vino exhibeatur.

℞. Sem. santonic. ℥ij

fol. card. ben. tanacet.

rad. filicis ana 3℥

pitriol. calcin. ℥j.

M. F. Pulvis.

Plura simplicia quæ vermium enecationi inserviunt, plurima sunt, inter quæ præcipuum est semen Santonici, seu Santoninæ, seu semen contra vermes, seu semen sanctum dictum, gustu amarum: huic succedunt C.C. ust. absynth. ageratum, tanacet. lupini, corallina, radix dictam alb. semen caulium & nonnulla

nulla alia. Ex his parantur variaz formaz, pulveris, electuarij; extracti; vel porciones sunt cum *syrupo limon. oxymelle squillit.* aut etiam cum *lacte*, quia Pueri eo maximè delectantur: nam licet lac per se materiam vermibus præbeat, tamen cum ejusmodi pulveribus sumptum, vermibus non nutrimentum, sed pestis existit. *Succus limonum* evidens quoque remedium est contra istum tartarum è quo vermes generantur: quin & *aqua hyperici & portulac.* puerulorum lumbricos enecant; nam portulaca refrigerando spissat, & putredini sua proprietate resistit, ideò quovis modo usurpata, tota bona est in profugandis vermibus. Sic & *oleum* quoque vermibus inimicum est, quod glutine suo spiracula lumbricorum, ut & in alijs omnibus insectis ita præcludit, ut calor illorum suæ vitæ etiam imperfectæ opifex, ex toto extinguatur, ob id lumbrici mortui ab eadem olei lumbricandi facultate, e corpore facilè expelluntur. Laudatur etiam inter cætera *Pulv. contra vermes Augustan.* vel *Seneriti*, cujus hæc est descriptio.

R. Sem. santon. ℥iij
corallin.

C.C. usti ana ʒi
rad. pæon. dictamn. alb.
magist. corall. ana ʒj

M. F. Pulvis,

Pro expulsionem enecatorum vermium servient adhuc sequentia: Puer (inquit quidam Author) convulsionibus jamjam moribundus, sumpsit *ʒrium dulc. rit. & rec. ppt. cum resin. jalap. &* duodecim lumbricos excrevit & convaluit. Sequens *Pulvis* miræ etiam est efficaciz,

R. Rhabarb.
agaric.

scord. ana ʒj
musci marin. ℥iij

C. C. usti
sem. portulac. ana ℥ij
aloës illot. ℥iijs.

M. F. Pulvis detur cum jure carniū.

Externa. Externorum quoque remediorum contra vermes magna prostat apud Authores farago, inter quæ tamen selectiora sunt sequentia: *Cataplasma contra vermes Herod. Ol. absynth. ol. amygd. amarar. ol. colocynth. coctum. ol. Scorpion. ol. ad vermes Prævotij. ol. admirabile Melichij. ol. purgator. Querset. ol. Habacucin: quod est sequens,*

℞. Ol. olivar. ℞ijss
absynth. vulgar. M. v.
distamn. alb.

gentian. ana ℥iβ

samarisc.

scolopendr.

amygd. amar.

nucl. persic. ana ℥vj

sem. santon.

corallin. ana ℥ij ℥ij

aloës succotrin. ℥j

C. C. usti ℥β

fell. taur. N. i.

pulv: cort. citr.

aurant. ana ℥β

picis natural. liquid. ℥ij

acet. fortiss.

succ. citr.

absynth. ana ℥ij ℥ij

vin. albi q. s.

F. mactatio per aliquot dies cum ol. supradicto, deinde bulliant in MB. ad consumpt, humiditatis, postmodum addendo
tberiac.

Theriac. Venet. 3v

ol. spice 3vj

petra 3iv

probe dissoluta & mixta serva pro usu.

Ungv. contra vermes Dorncreilij, ungv. contra vermes Augustan: vel R. Ungv. contra vermes A. A. 3ij. fellis tauri inspissat. 3j. ol. stillat. absynth. tanacet. ana gutt. vj. Misc. Vel Ungv. de arthanit. umbilico applicat: Vel R. Ungv. de arthanit. 3ij. fell. tauri inspissat. 3j. ol. diacolocynth. gutt. vj. M. Vel cuminum cum felle taurino mixt. & ventri imposit. Vel R. Theriac. 38. solve in succo absynth. & illinatur ventri. Strobelberg: irā & Crato, os Stomachi, & ventrem puerorum feliciter inungebant Ungv. ex mithridat. aloë, croco, & aceto.

Nec hic omittendum est *secretum Alexij Pedemontani* quod est sequens. Ad lunaticam, inquit, puerorum, sive convulsionem, ex qua tremunt & semimortui apparent, quod nulla alia de causa evenit, quam quod vermis sæpe in ijs generetur, corpus ipsum petens, tremorem nonnunquam & mortem causans:

R. Tanacetum

Hujus ramuli teneri in umbra siccati, in pulv. redigantur, & per cribrum trajecti, ijs addantur pulv. sequentes: scilicet

Pulv. gentian.

peron. ana 3iij

myrrb. 3. 1

M. simul, de quo cape parum, quod impasta seu irrota cum guttulis aliquot *aque*, & os Infantis ac labra inunge ter, quaterque: fieri enim nequit, quin vermes omnes unā cum reliquis excrementis excernantur. Hæc ille,



CAPUT LX.

*De Lienteria seu Cœliaca, vulgò die
weiße Ruhr.*

Lienteria est nimis celer esculentorum & potulentorum, ea
formâ, quâ assumpta sunt, per alvum excretio, vitio reten-
tricis & expultricis Ventriculi & intestinorum; à *causis* refrige-
rantibus, pinguibus & oleosis, acribus & similibus, prout in tit.
de Diarrh. & Dysent. diximus, proveniens, & ideo etiam cura
eadem est, quæ dictorum affectuum; Specialia tamen interna
laudentur: *Syrup. corallor. de menth. de ros. siccis.*

CAPUT LXI.

De Tenesmo, vulgò der Zwang.

Tenesmus est assidua desidendi, seu per alvum excernendi cu-
piditas, cum dolore, tensione, nixu & conatu magno, in
quo parum aut nihil & non nisi mucosum, suberuentum, puru-
lulentum egeritur; ab humoribus salis, acribus, mordacibus, aci-
dis, vermibus, intestinorum affectibus, nimia refrigeratione, or-
tum ducens.

Ejus *Curatio* præmissis universalibus, delicatioribus perfici-
tur tam simplicibus, quàm compositis & magistralibus, ex *Herb.*
linaria, malva, melilot. plantag. chamomill. quercu, verbasco.
Floribus: halsst. chamomill. melilot. ros. rubr. verbasco. Semin.
cydon. hyosciam. lini, pill. Valent præterea *furfures*, præse-
tim *triticeï*, aceto incocti & cum sacculis applicati: *Suffimenta*
ex mastiche, colophon. terebinth. thure, tragacanth. succino:
Vel Suffiment. de verbasco Myns. vel Suffitus conorum abietis,
qui excellens deprædicatur.

Intestinum inungi potest *seruo cervino vel bircino, ungu.*
de linaria, Ol. aneth. cera, chamomill. hyosciam: lumbricor. om-
phacin.

phacin. ovorum, rosac. violac. verbasci. Vel *asserculus quer-
cintus* adipe inunctus & calidè applicatus. Plurimi laudant *va-
porem ex aceto*, lapidi vel lateri ignito affuso, ad corpus admis-
sum: multum etiam præstant *suppositoria & clysteres* ex supra-
dictis, præsertim sequens. *R. Capit. ovill. N. j coq. in f. q. aq.
cum summitat. hyperici Mj. vel ij. radic. tormentill. ʒiij. ex c-
latura fiant Clysteres ad ʒiij. vel plus minus pro ætatis ratione.*

Ad intrâ pauca sunt quæ teneris Infantibus in hoc affectu
præberi possunt & debent, exceptâ *bol. armen.* vel *ʒā sigillat.*
quæ nec lacti nec teneritudini obsunt, quin potius, ut praxis
docet, plurimum prosunt. Sunt nonnulli qui *Tinct. styptic*
Mys. in hoc casu guttatim commendant.

CAPUT LXII.

De Ani procidentia.

Ani procidentia est extremæ intestini recti partis, foras facta
prominentia aut prolapsus, ob causas violentas, sæcum sci-
licet conatum, tenesmum, musculorum & nervorum imbecilli-
tatem, refrigerationem, paralyin, abscessum, fistulam, sphin-
cteris laxitatem, mollitiem, diarrhæam vel dysenteriam &c.

Curatio: in ani repositione & ejus retentione consistit;
quod si tumor adsit, prius *decocto malvæ & alb.* fovendus, &
oleo lil. alb. inungendus. Vel Infans *balneo* ex dictis insidear,
& si alvus reponi nequeat, *decocto emoll.* deinde *adstringente* fo-
veatur.

Repositione factâ, adstringentibus utendum nè denuò ex-
cidat.

*R. Rosar. rubr.
balaust.
nuc. cupress.
cort. granat, ana ʒß*

Iii 3

sumach

*sumach.**tbur.**mafticb. ana ʒij,*

Coq. in vino auctero, & fpongiâ madidâ anus fubcalidè foveatur. Absoluta fomentatione, *Pulvis* fequens goffypio exceptus, ano imponatur;

R. Flor. rofar. rubr.

balauf. ana ʒʒ

*tbur.**mafticb.**myrrb. ana ʒi*

M. F. Pulvis Vel ex hoc pulvere fiat Suffitus, qui linteis exceptus parti affectæ imponatur: abstinendum autem est à balneis, quia valde relaxant; cavendum præterea nè Infantes distortis eruribus, sed potius junctis jacent, nè tam facilè excidat. Valent præterea in hoc affectu *aque & decocta chalybeata, fabrorum*, in quibus incocta sint *folia, quercus, plantag. prunell, burs. pastor. centimod. consolid. jaracen. equiseti, millefol. flor. acaciæ, balauf. &c.* Sorbait applicat *Pulv. cochlear. oftrear. calcinat.* supra bombacem, poterit enim exsiccat. Ex his etiam & similibus fieri possunt *inseffus, sacculi & fotus &c.* talia enim non relaxant, sed potenter adstringunt.

R. Genifta q. p. conscinde & projice in carbones, fumus ano excipiat, & erit magni auxilij: *affer quernus* ad ignem calefactus & *mafticbe* illitus, anòque suppositus multum præstat. Sic pariter laudatur *crocus* & *adstringens. C.C. uftum*; cinis *scarbæor.* ano infusus: *plumbum uftum, pulv. aloë, tormentill, Emplastr. ex opopanace & sagapeno*, ossi sacro post repositionem appositum: item *Empl. nervinum. Oleum ce-a, cydon. ovor, ofar. Ungv. adstring. Fernel. Camitifs. Nervinum.*

CAPUT LXIII.

De Calculo renum & vesicæ, vulgò

Nieren-und Blasen-Stein.

Calculus est substantia seu corpus instar lapidis vel trophi, durum ac solidum, toto genere præter naturam, in renibus vel vesica potissimum factus, è succo crasso lapidescente vel Fro mucilaginoso, particulis salino-nitrosis, lacte vitioso, pulmentis ex farina triticea, voracitate, dispositione hæreditaria, renum & vesicæ intemperie, vi petrifica &c. ortum ducens.

Ad curationem calculi renum & vesicæ multifaria quidem ab Authoribus adferuntur remedia, quæ tamen in tenellis Infantum corpusculis omnia, aut singula locum non habent; consonum proinde duxi generalia, eaque selectissima proponere, ex quibus Prudens Medicus facile ea seliget, quæ ipsius judicio & scopo sunt convenientia.

Inter Herbas laudatur fragaria, lingua Cervina, malva, parietaria, petroselin. : pimpinell. saxifrag. veronica, urtica, scolopendr. tanacet. virga Orea &c. Flores, acaciæ, chamomill. cicchor. consolid. Regal. malv. arbor. ononid. cynosbat. virg. aurea &c. Semina: alkekeng. cynosbat. melon. malva, napi, petroselin. saxifrag. seseleos, sileris mont. violar. purpur. &c. Fructus. amygd. nuc. avellan. rubr. &c. Bacca: alkekeng. cynosbat. junip. Caricæ, bord. passul. limones &c. Radices: acetos. asparag. car. opbyllat. fenicul. bardan. liquirit. ononid. saxifrag. polypod. sesel. Inter Animalia & mineralia ac cætera vegetabilia, laudatur opobalsamum, terebinth. tragacanth. cassia, milleped sanguis birci ppt. corallia, crystall mont. ppt. lap. nephrit. succin. alb. ppt. Cremor Fri, Frus Glatus, arcanum Fri liquid & solid. oculi &c. C. C. nitrum perlat. laud. urinar. Michaël. Sal succini volat. mandibul. lucij piscis, talus leporis &c.

Ex

Ex his varia & multifaria fieri possunt composita, v. gr. aquæ, balnea, cataplasmata, decocta, electuaria, emulsiones, enema, essentia, iuscula, olea, salia, spiritus, syrupi, tinct. unguenta & linimenta. Laudatur præ cæteris *Aq. nepbrit. Paul. Sorbait.* Essent. ononid. liquor crystal. *Tinctura Fri* (quæ mira præstat) *Spirit. ceras. nigr. Spirit. nitri dulc. Circulat. aperit. Spirit. Fri simpl. & comp. Spirit. Oli cordial. urina, terebinth. Terebinth. potabil. Riperij: Essent. camphoræ, nepbrit. Michaëlis. Tinctura znij: Sal junip. stipit. fabar. petrosel. genist. Fri, cent. min. coralli, nitri, ononid. viper. urina volat. absynth. calculi humani. Syrup. byzant. simpl. & comp. capill. & de endivia, de duabus & 5, rad. domesticus, veronica, dialtb. Fernel. Juscula cicer. rubr. & Magist. nepbrit. Michaël 3j. plus minus detur in lacte vel pulve. Vel & Ocul. 3. ppt. succin. alb. ppt. lap. nepbrit. ppt. ana 3ß. M. F. Pulv. pro aliquot dosibus. Juscula quotidie propinentur Nutrici, in quibus *malva, saxifrag. & supradict. herba aut radices* bulliant.*

Si lapis, vesicæ orificium obstruat, quantocyus ex eo amovendus est, quod fiat vel Infante supino posito & cruribus concusso, vel cathetere immisso, postea primò calculus curetur. Plurimum autem valet in hoc affectu *decoct. rad. althææ*, cum melle despumato & sacch. ex intervallis datum. Si Puer remedijs curari non possit; & modicum adultior sit, hypothyria instituenda de qua videantur Authores.

Inter externa plurimum laudantur *balnea* ex supradictis simplicibus concinnata.

Vel 3c. *Herb. malv.*

alth.

parietar.

petrosel.

saxifrag.

virg. aur. ana Mj

flor.

flor. malv.
ononid. ana Mss
rad. alb. ʒij
sem. lini
foenigr. ana ʒi.

M. incisa & contusa pro Balneo.

Post balnea *inunctiones* fiant, vel imponantur *cataplasmata* & *fomenta*. In hoc casu valet *Ungv. dialtb. Agryp. anodyn. neprocatharticum*: *Adeps cuniculi, taxi, hominis. Ungv. cancer.* *Oleum amygd. dulc. hyosciami, lilior. alb. chamomill. Scorpion. simpl. & comp. ʒ. Ol. Scorp. simpl. ʒi. ol. ceræ destillat. gutt. iij.* Misc. & unge inguina & glandem penis. Si sit contumax affectus, applicetur *cataplasma de parietar.* ad pulvem coct. & postea adde parum *ol. Scorp. Matthioli.*

CAPUT LXIV.

De Incontinentia urinæ, seu Diabete.

Incontinentia urinæ, seu mictio involuntaria, est urinæ præter imperij arbitrium ac voluntatem, propter sphincteris vesicæ vel nervorum resolutionem, & vesicæ compressionem, sine acrimoniæ & doloris sensu, intempestiva emissio: in Infantibus, cum rationis & iudicii usu nondum polleant, hoc vitium præcipuè fit, urinâ seu copia gravante, vel acrimoniâ irritante; huic vitio si assuescant Pueri, postea adulti difficulter desuescunt, ideo admonendi, castigandi, & prostituendi sunt; plurimum juvabit, ut antequàm somnus obrepat (cum maximè malum somni tempore contingit) urinam exonerent, & medio somni tempore ad eandem reddendam excitentur, donec naturæ alia consuetudo inducta sit.

Diabetes est celerissima & copiosissima potus non mutati emissio, cum sit intensa & totius colliquatione à facultate con-

Kkk

coctri-

coctrice & retentrice laza, renum verò attractice & expultrice aucta, dependens.

Curatio. Præmissis universalibus in his affectibus valent sequentia: Agrimonia, alchymilla, bugula, burs. pastor. centinod. equiset. millefol. plantag. pyrol. tormentilla. Flores balauft. hyperici, ros. rubr. semin. agni casti, lactuca, plantag. sumach. cort. & rad. bistort. consolid. maj. cypri, pimpinell. tormentill. granator. Opobalsam. terebintb. balsamus Indicus alb. & niger, castor. spec. diplantag. Myns. syrup. corall. myrtin. myrtillor. Rasura dent. apri, ebor. Guttur capon. gallinæ; Pudend. sulcum: tunica ventriculi perdic. vesica capræ, carpion. Alumen, bol. armen. corall. ☐ sigillat. crocus & Pulvis Joëlis valde laudatur.

℞. Testicul. l. por. tostor. ʒj
gutturis gallinæ cremat.
vesicæ porci cremat. ana ʒss
glandium ʒij
sem. rut.
sol. nepet. ana ʒj

Misc. F. Pulvis, Dosis à ʒss ad ʒj, pro ætatis ratione in aq. sol. quercus.

Vel ℞. Pulv. tunic. interior.
ventric. gallin.
ciner. erinacei combustor.
croc. ʒis adstring. ana ʒj

M. Dosis ut prioris.

℞. Spec. diplantag. Mynsicht.
dia ʒis Myns.
pulv. erinacei combust. ana ʒj

M. Detur ut prior, vesperi ituro cubitum.

Si malum à paralyſi muſculi veſicæ contingat, ità ut nec de die nec de nocte detinere queant, exhibe ʒj *vel* ʒʒ *caſtor*, & *myrrb.* part. æq. cum *hydromellite*. Si à lacte malum videatur habere originem, Nutrix amovenda, vel ejus lac corrigendum. Ad extrà peccen Infantis foveatur bis de die, unâ horâ ante paſtum, *Decoſto balauſt. cort. mali puniçi, abſynth. &c.* vel ſiant *balnea* ex ſupradictis ſimplicibus ex ʒre. ʒre, & *alumine*. Valet etiam *Ungv. Comitifs. Martiat. Aregon.* cum *ol. maſtich.* mixtum,

CAPUT LXV.

De Suppreſſione urinæ ſeu Iſchuria.

Iſchuria eſt urinæ ob fruſtrationem facultatis expultricis omnimoda ſuppreſſio, cujuſ *cauſe* ſunt calculi, carunculae, grumus ſanguinis, viarum anguſtia, materia viſcoſa & acida &c.

Curatio hujus affectus perficitur internis & externis remedijs, quæ videri & repeti poſſunt *tit.* de calculo renum & veſicæ; attendum tamen potiffimum eſt in rehellis Infantibus, ad mucaginem illam acidam, quæ ante omnia reſolvenda eſt, & ſi adſint calculi, iidem leniſſimè atterendi & expellendi.

Utiſſimè valet *Pulvis ocul. ʒ, ſuccin. alb. ppt. ana ʒʒ vel* ʒj, pro ætatis ratione, vel ſanguis hirci *pulverifatus*, cum lacte vel *aq. petroſelin.* aut *betulae* porrectus.

In adultioribus prodeſt *decoſt. radic. apij. ononid. aſparag. ſeniculi.* Joël commendat in ablaſtatis, *Ol. Oli gutt. ij* cum vino exhibitum. Tempore Veris optimè conducit bibere ſuccum *betulae* per aliquot dies. Nutricibus eadem ſunt exhibenda, ſed doſi competente: alvus laxetur *clyſterijs & ſuppoſitorijs*: valent præterea *anima balæcis pulverifata*, *millepedes*, *cremor hord. laudan. urinar. Michaël: Syrup. dialth. Fernel. ſuccus rapban. cum ſacch. ʒrus nitrat. Spirit. nitri dulc. tinct ʒri.*

Kkk 2

liquor

liquor crystall. aq. betulae &c. Plura remedia tam particularia quam generalia, videri possunt, cap. de Calculo rerum & vesicæ.

Externè conveniunt *Balnea ex malva. ononid. alth. flor. chamomill. rapis dulcibus.* Post balnea, *inundationes* regionis vesicæ & lumborum, ex *ol. scorp. ol. lil. alb.* Vel imponatur pectini *cataplasma* ex *rad. & fol. petrosel.* contusis & cum *butyro rec. frixis*, ex contusa *parietaria, cheresol.* cum *ol. chamomill.* tum etiam laudatur, *cepam assatam* contundere & pubi imponere. Plura tradentur sequenti capite.

CAPUT LXVI.

De Stranguria, seu stillicidio & difficultate Urinæ.

S*tranguria* est urinæ, guttatim & crebrò, eum, vel sine dolore, ardore & continuo ad mingendum stimulo, tacta excretio, ab assidua partis affectu, nimirum vesicæ irritatione, aut imbecillitate orta, quam plerumque humores acres, acidi, salii, & arena causant & efficiunt.

Curatio. Bonum & expediens primas vias prius eluere, & lenientia præmittere diureticis, nè majores excitentur obstructions; optimè in praxi laudantur: *mel. rosat. flores cassie, terebinth.* in varia forma exhibita. His præmissis *diuretica*, improprie tamen dicta tutius locum habent, inter cætera laudatur *terebinth. in aq. parietar.* lota ad pisi magnitud. Instar omnium deprædicatur *ol. scorp. Magni Matib.* extra & intrà ad aliquot gutt. exhibet. Vel *℞. Sang. v. leporis unius, rad saxifrag. ʒvj* combure in fictili novo, & pulverisa; deat hujus Pulv. ʒj. plus minus in vehiculo, Præstans est *decoct. senecionis*, vel *centinod.* vel *saxifrag.* vel *cicer.* aut *decoct. nephrit.* Forest.
Balnea

Balnea, fomentationes, unctiões & similia externa remedia, videri possunt capite de Calculo renum & vesicæ.

CAPUT LXVII.

De Dysuria, seu Urinæ ardore, &

Mistu cruento

Dysuria est urinæ ardentis, modò pauca modò copiosa, cum cruciatu, sine interruptione redditio. *Mistus cruentus* verò ejusdem urinæ cum sanguine mixtæ, vel solius sanguinis per urethram emissio.

Causæ horum affectuum sunt internæ & externæ, meum urinarium afficientes, & continuum solventes: *Causæ remotæ* vel antecedentes, lac Nutricis biliosæ vel bibulæ justò calidius, renum & hepatis intemperies & discrasia, nimia tegumenta, bilis exsuperantia &c.

Præmissis universalibus, ex simplicibus valent: *Herba acetosæ, altheæ, bet. cichor. endiv. malv. Mercurial. parietar. plantag. violariæ. Flores nymph. malvæ, melilot. papav. rhæad. squinantb. verbasci, violar: Semina acetosæ, alkekeng. cydon. frigid. maj. malv. papav. alb. plantag. psyll. Fructus amygd. dulc. & amar. dactyl. jujub. siliq. passul. sebest. pineæ, pistac. bord. oryza, poma & pruna dulc. tamarind. Radices liquirit. acetos. malv. polyod. lil. alb. alth. Lignum nephrit. santal. rubr. terebinth. tragacanth. album, orvi, Lac asinæ, capræ, vaccæ, serum lac. Aquæ ex simplicibus supradictis, vel ex compositis laudatur Aq. contra ardor. urinæ Myns. vel aq. nephrit. mirandarum virium Pauli de Sorbait. Conservæ acetosell. borrag. bugloss. nymph. rosar. violar. Decocta & juscula ex supradictis simplicibus.*

Laudantur præterea Syrup. dialth. Fernel. de symph. Fernel. granator. corall. papav. alb. violar. Terebinth. potabilis Ri-

per. Crocus & adstring. nitr. ppt. ocul. cancr. corall alb. & rubr. bolus armen.

In nimio autem ardore & dolore, sacra anchora est *laud. opiat.* vel quod magis specificum, *laud. urinar. Michaël.* Inter externa palmam præcipit *balneum aq. dulc. & lactis.* Item *cataplasmata, solum seu fomenta: infusus ex speciebus simplicum.* Inter unguenta laudatur *Ungu. dialtb. popul. refriger. Gal. rosatum, santalinum, Comitiss. cum croco & adstring.*

CAPUT LXVIII.

*De Gibbositate: vulgò von Buckeln
und Auswachsen.*

Quid *Gibbositas* sit cuique notum est, ejusque *cura* rarò magni Medicæ quàm Chirurgicæ, imò (quod absurdum) carnicis subijcitur. Pauca aut exigua requirit interna remedia, Extrà ad gibbositatem Infantulorum, prius factò dehiro thorace, hoc utor *Unguento.*

*℞. Ungu. dialtb. ʒiſſ
alabaſtr.
aregon.
ol. chamomill. ana ʒvj
pingued. anat.
anser.
gallin. ana ʒij
vulp. ʒiſſ*

M. pro Linimento.



CAPUT LXIX.

De Interrigine seu Excoriatione, vulgò
die Frodigkeit oder Wollst.

Intrigo est cutanea exulceratio seu excoriatio, plerumque inter femora, ex acrimonia salina exorta: vel est cuticulæ à vera cute abrasio seu separatio, in varijs corporis locis, collo, claviculis, cervice, juncturis cubiti, axillarum, coxis, femorum plicis, inguinibus, poplite, scroto, ano, perineo, &c. ab urinx & sudoris vel aliorum humorum salina acrimonia, mordacitate, immunditie, vel etiam impedita insensibili transpiratione, vel sensibili transfudatione &c. exorta.

Cura: præmissis universalibus & debitâ dietâ, maxime studendum est munditiei, & evitanda omnia aspera & acria. Prætereà valent *alb. ovi* cum *aq. rosar.* subact. vel *amylum* cum *aq. ead.* subact. vel *aq. plantag. rosar. solani*, parti tepitè applicata. Inspergitur quoque *Pulvis* nibili in nodulo ligatus. Aut si *panis* furno immittitur, impone ei *farinæ tritic.* Mj. Hanc ubi unâ cum pane cocto è furno extraxeris, per cribrum trajice, & locis excoriatis asperge: & sic habebis desiccativum optimum & delicatissimum.

Crato hoc in usu habuit: *℞. alb. ovi. ol. violar. ana ʒi hy-
tharg. ppt. ʒiij* ducantur diligenter in mortar. plumb. ut fiat Un-
guentum. Prodest etiam *pulvis rosar. rubr.* exsiccat. vel im-
ponantur telæ subtilissimæ, vel earundem lanæ cultro derafæ.
Mulierculæ nostræ, *cerussam*, *lap. calamitar. farinam fabar.
bord.* vel *lentium pompholygem, tutiam, farinam* quæ in inferiori
cortice *panis* est, vel *farinam lignorum* à vermibus corroso-
rum. C. C. ust. & similia pulverisatâ vel contusa, immittunt sac-
culo linteo, & itâ parti dolenti aspergant *crocum* ♂; vel *ter-
ram Gli dulcem*, vel *pulv. ex creta*, C. C. & modico *cerusse*.
Optimè facit *aq. calidâ* bis de die inguina lavare. *℞. Pulv. lap. cala-*

calaminar. ʒiij. *ceruss.* ʒiij. M. pro insperſione, ſuperimpoſito linteo.

Ettmüllerus ſummè extollit *crocum* & ex ſolò præcipitato, qui ſine ullo ſenſu, loca excoꝛdata reſtituit. R. *Ung. v. diaphoropholyg. de ceruſs. ana* ʒi. Miſc. pro inunctione. Idem prætat *Ung. v. alb. camphorat. de tutia.* Ol. *amygd. dulc. roſar. ovor,* præ cæteris *pomada.* Emplaſt. *gryſeum Joël. ex ol. roſato, cydon. fact.* Cataplaſma ex mica panis alb. in lacte coct. Charta uſta pulveriſata & inſperſa: *Serum cervin. hircinum.* Balnea & lotiones ex herb. & rad. *alth. malv. parietar. violar. branch. urſin. plantag. roſar. argentina* (quæ eſt ſpecifica) *hordeo* &c. Joël locum attritum & exulceratum, ſedulo aq. tepidâ abluit, in qua incoxerit exſiccatoſ flores *violar. aut hord. excorticat. aut rad. alth.* poſtea lotionem linteis mollibus abſtergit, moxque ulceri inſpergit *pulv.* ſeu *cariem ex jiceis aſſeribus* exeiſis, vel tenuiſſimam *ſarinam hord. vel pulv. rad. ſreos* vel *roſar.* Primitioſus magno cum fructu utitur *pulvere ceruſſæ,* vel *pulv. amyli* cum aq. roſar.

Ubi intertrigo acerbiores excitat dolores, primò mitigandi ſunt *muçilagine ex ſemine cydon.* cum aq. *plantag. extract.* & linteo excepta & paſ. impoſita. Vel R. *album. ovi N. j. ol. violar. ʒʒ lytharg. ʒiij.* utiſſimè terantur in mortar. *plumb.* ad craſſitiem Linimenti p. uſu. Valet etiam *pulmentum ex grûmis avenæ* fact. & impoſitum.

CAPUT LXX.

De Impetigine, Lichene, & Herpete exedente & miliari.

Impetigo ſeu Lichen eſt affectum cutis, ſeu ſunt cutis maculæ vel puſtulæ duræ ac ſiccæ, cum aſperitate & pruritu ad vicina ſerpentes,

pentes, & si profundius procedant, Herpes dicuntur, ortæ à succo vel humore tenui, acri, salso, seroso ac terrestri.

Hæc *Curantur* bonâ dietâ, humorum alteratione, edulcoratione, evacuatione, & topicorum applicatione. In genere quæ in Scabie & de Crusta lactea dicta sunt, etiam hîc locum habent. Præterea laudatur *Experimentum Joëlis de impetigine, Linimentum Prævot. mucilago sem. cydon. & psyll.* Paulus Sorbait hanc *Mixturam* laudat:

℞. Boli armen. ppt.
terr. lem. ana ʒij
aq. rosar.
acet. rosac. ana ʒiij
album. ovi N. 1.

M. omnia in mortario, & panniculos in ea madefactos applica

CAPUT LXXI.

De Umbilici inflammatione, protuberantia, & Hernia umbilicali.

Protuberantia & quandoque inflammatio umbilici, accidit post aliquot à nativitate dies, ob minus rectè factam resectionem, aut sinistrè administratam ejusdem ligaturam.

In inflammatione umbilici statim à principio prodest *Ol. rosat. cum cera mixt. Emplastr. de sperm. ranar. alb. coct. vel gryseum. Ol. rosat. in quo cerussa lota contrita est, & lana molli except. & applicat.* Vel applicetur *Catapl. leniens & repellens. ℞. Farin. bord. ʒß lupinor. sanigr. ana ʒij cum ol. rosat. F. Cataplasma.* Valet etiam *oleum ovor.* quò Infantulum perungas circa umbilicum, toties quoties fascijs eundem imposueris: deinde fiat *magdaleon* instar pileoli ex *cera flava*, quem parti tumore tentatæ, simul cum peria linea & commodo retinaculo applices, vel applicetur umbilico *rob acacie* seu *pruni sylvestr.* Vel *sacculus* ex *spica Celtica* in *vinq rubro* coct. express. & apposit.

CAPUT LXXII.

*De Maculis seu Nevīs Maternis, vulgò
die Muttermaal.*

PROdit sæpe Fœtus ex utero, maculis quibusdam rubris, citrinis, lividis &c. deformatus in parte aliqua corporis, vel ipsa facie, non sine magna præsertim in Virgunculis verecundia: quibusdam media facies rubra &c. sanguinolenta apparet; alijs nasus, genæ, vel labia præternaturali hac rubedine suffunduntur.

Putant Mulierculæ, si sibi gravidis quidquam appetibile denegeretur, quameunque tunc partem corporis manu tangerent, eam in Fœtu hoc rubore deformari: Alij formatrici ac perfectrici facultati in utero, dum hebescit, id vitium adscribunt; alij potius menstruæ materie portioni cuidam, uteri parietibus ex seminis affluxu adhærenti, aut è venis in uterum stillanti, & sic hoc vel illo colore fœtum in hac vel illa parte inficienti: alij archæo turbato aut malè informanti: alij idæis hoc vitium adscribunt: Verùm quidquid sit, felicem certè is se prædicare, qui labem hanc tollere poterit, ad curam enim omnes hæ sententiæ & opiniones, parum imò nihil præstant.

Multa ac diversa arcana & secreta ab Authoribus passim adferuntur, sed plerumque sine scznore; Selectiora proinde, certiora & quandoque experta nobis in medium asserre sufficient.

Strobelbergerus sequens deprædicat: novo hoc sæculo, inquit, innotuit mihi sequens remedium, quod sicut mihi sincerè relatum est, ità quoque amicis communicabo: *pars ea umbilici* quæ Infantulo post umbilici debitum nexum decidit, diligenter asservetur: hanc prius siccata ac deinceps ex *aq. herbe Christophoriana* madentem, maculæ imposito, ter de die, tam diu continuando, donec ea penitus evanescat. Nostræ obstetrices *prima excrementa* quæ ab alvo Puerulis profluunt, hanc quoque

in

in rem in linteolo asservant, quibus maculas illas illinunt, doc nec stercus per se siccatum decidat, idque sæpius reiterant. Consulunt alij, ut *semina sinapi* Puerpera manè vacuo ventriculo probè in ore comminuat & masticet, deinde nævo bene infri- cet & obliniat, hocque faciat singulis manè, donec nævus fue- rit deletus: quidam pro his maculis delendis principatum ha- bere agunt *caryophyllatam*, cujus vis in his maculis extricandis mirabilis judicatur; sumitur cum suis radicibus in fine Maij, quo tempore vigorosior est, atque à terrestreitate emundata destillatur, mox ex aqua destillata, Infantum lituræ sæpius la- vantur, & certè evanescunt.

Alijs litus ex *sanguine menstruo* ipsius Puerperæ in secretis habetur, qui verò modum noverit detrahendæ primogenitæ cu- ticulæ, ei non ità difficile erit delere has maculas, dummodò grandiores non sint aut verrucosæ, malignæ, tumidæ, quæ chi- rurgi manum expostulant, de quibus vid: Patæum in *chirurg. lib. Chirurg. 23. cap. 17.*

CAPUT LXXIII.

*De Purpura seu Rosalia, seu Maculis Pue-
rorum volatilibus, seu Verticatione seu Scabie prurigi-
nosa, quam plebs mulierum den Flug/ oder die
Nesselsucht; Bohemi Spala vocant.*

Rarus prioribus sæculis erat affectus, ac nostro tantum hoc sæculo plurimum se prodens, & jamnum satis frequens tum in Boëmia, Austria, imò totâ Germaniâ, Puerulis maximè familiaris, alijs tamen etiam adultioribus, præsertim intempera- toribus satis frequens.

Maculæ sunt rubræ ac subrubræ, efflorescentiam instar purpuræ, cum rubedine & pruritu totius cutis, & ali- quali subsequente excoriatione efficientes, quæ aliquando etiam

CAPUT LXXIV.

De Paralyſi & Contractura, vulgò von der Lähme und Contractur.

Paralyſis ſive Contractura eſt motûs voluntarij imminutio vel abolitio, à nervorum vel mufculorum læſione, vel materiâ, acrimonia vel acore peccante, eodem vel obſtruente, vel comprimente, vel condenſante, orta.

Cura. Præmiſſis univerſalibus, primum locum obtinent antimoniatæ: præcipuis *Antimon. diaphoret.* Nitrum antimoniat. Tinct. antimon. Arcan. Fri liquid. cranium human. perle, corall. Pulv. March. viperar. analept. Minder. Specific. cephal. Michaël: Aqua betonic. carbunc. arthrit. lavendul. ſimpl & compoſita, lil. convall. ſalviæ. Balnea ex formicis, nitro, cum herbis cephalic. temperatis, vel balneum artificiale Paul. Sorbait. Baſamum angelic. lavendul. ſalviæ, ſpice: apoplect. cephalic. ſuccini, cœleſt. conſect. alkerm. de byacinth. Iberiaca Venet. Cœleſtis. Conſerva ſtorum anthos, betonic. ſtor cheyri, primula vertis &c. Laudatur potiſſimum Decoct chamæpyth. ſtorum perſicor. radic. ſarſeparill. & ligni ſaſſafr. Emplaſtr. de betonic. ſacamabac. diaphoret. Nervin. Oxyroceum. Eſſentia vel Tinctura Caſtorei, lignor. ſaſſafr. chamæpyth. Oleum caſtor. ceræ, cheyri, laurin. coſlin. Philoſophorum roſmarin: rutæ, ſalu: ſpi:æ, ſuccini, terebinth. vulpinum. Species pro cucupha, diambra; diamoſch. dulc. diapleres Archont. ſuccini. Spiritus ceras. nigr. CC. ſimpl. CC. ſuccinat: formicar. fuligin. lil. convall. lumbr. nitri dulc. lavendule: roſmarin. roſar. ſalis. armon. ſimpl. & aromat. ſangu. humari, diatrion. Fri ſimpl. & comp. terebinthinæ.

Tinctura: bezoart. Michaël, Luna, oris, Fri, ppriet. Myns. Ungv. Nervin. Martiat. Ex his & ſimilibus varia formularum genera concinnari poſſunt.

CAPUT LXXV.

De Hernia seu Ramice, seu Ruptura, & in specie de Enterocoele, vulgò von Bruch.

Hernia, in specie Enterocoele, est intestinorum de sede sua in scrotum aut inguina prolapsus. *Cause* hujus potissimum sunt humores serosi, per ductus lymphaticos in totum corpus & abdomen disseminati, vel ex iisdem & alijs de causis, ortis flaribus. His accedunt clamor, casus, ictus, retenta respiratio, fletus, ejulatus, tussis violenta, vomitus, conatus in egerendis fecibus, nimia corporis repletio, crurum divaricatio, alijque motus valentiores, peritonæum laxantes vel rumpentes. Umbilici hernia, seu procidentia seu prominentia, Græce *Omphalocoele*, est umbilici prolapsus, easdem causas quas prior exposcens.

Curatio: ante omnia videndum, ut intestina, sive in inguine, sive in umbilico affectus sit, si exciderunt, reponantur, & imposita postea sedulò retineantur. Danda etiam est opera, ut alvus sit laxa Infantibus, ne vel nimium repleti vel obstruisti, damnum inferant: præterea optimè incumbendum, ut à ploratu & tussi, & omni violentiore motu arceantur, hæc enim partes potenter relaxant.

Remedia tam interna quam externa his affectibus accommodata, sunt sequentia: imprimis prodest *vinum rubrum* in quo coxerint *poma momordica*, vel pars affecta inungatur *oleo phlo-sophorum* & desuper ponatur *Emplarum meum ad Herniam*,

R. Empl. ad ruptur. Felis Würrzij ʒijß

diaphor. Myns. ʒij

oxycrocei ʒi

cera

resin. ana ʒss.

Liquefiant lenro igne continue agitando; dein adde:

pulv.

pulv. mastich.
 myrrh.
 oliban. ana ʒi
 rad. consolid. maj.
 bistort.
 sigill. Salomon. ana ʒjʒ
 gallar.
 flor. balaust.
 fol. querc.
 cort. rad. fraxin ana ʒvʒ
 mumia
 sang. dracon.
 gypsi usti
 Capid. hemat.
 chalyb. ppt. ana ʒʒ
 cum s. q. terebinth.

M. fiat Emplastrum.

Si à flatibus prodeat malum, prodest *Empl. de baccis lauri*, vel sequens *Sacculus*: *ʀ. Chamomill. Mij. fol. lauri, flor. sambuc. ana Mʒ femin. carvi, cumin. ana ʒʒ. Misc. & includantur Sacculo; nec in hoc casu chyteres intermittendi.*

Si verò à serositatē ortum ducat, prodest *Cataplasma de sescore caprillo*; vel applicetur *Cataplasma ex farina fabarum, semine lini, senugr. Floribus chamomill. sambuc. semine cumini.* Si tandem à scæcibus induratis, *emollientia* tam intrā quàm extra, simulque *chyteres emollientes* plurimam proderunt. *Pinguedo urfi* regioni lumborum applicata, est secretum: *decoct. usnea* quæ reperitur in *acacia*, in & extra adhibitum, valde excellit.

Vel *ʀ. Herb. perfoliat. berniar.*

flor. hyperic, ana Mj

sem.

sem. petrosel. ʒiij

rad. symphyt. ʒß

Incis. & contus. dentur ad Sacculum parti applicandum.

Vel ʒ. Empl. de pelle ariet.

ad berniam August.

contra berniam Myns. ana ʒi

croc. ʒis adstr. ʒß

malaxetur cum ol. oʒor.

vel ol. perfoliat. q. s.

M. fiat Emplastrum,

Laudatur etiam *Empl. ad berniam Barbette, Grüling. Joëlis. Timæi; Würzij; Zacuti; Sennerti; Syptic. Crollij.* Dantur etiam *cure magneticæ*; unde quidam adhibent *pulv chalybis* ad intrâ, & exterius medicamenta ex magnete applicant; Alij *transplantationem* in arborem concisam celebrant. In hoc casu plurimum cavendum est à balneis, quia relaxant, & relaxatas partes plurimum emolliunt, malumque plus augent, quàm minuunt. Sequens *Cataplasma* à pluribus laudatur.

ʒ. Arnogloss.

sanicul. ana ʒß

farin. lentium

lupinor.

ʒ. rosar. rubr. ana ʒi

thur. ʒiß

alumin. ʒß

M. F. Pulv. de hoc sume q. pl. & cum alb. ovi conquassat.
Fiat Cataplasma loco affecto imponendum. Idem præstat sequens *Emplastr. ʒ. Fol. virid. perfoliat. rad. consolid. maj. rec. ana q. v. contund. minutim, & addita cere part. tertia F. s. a.*
Emplastrum.

Si quis simplicia ad sui intentum & usum desideret, sequentia (specifica laudantur: *Agrim. alchymill. burs. past. centummod. consolid. Sarac. consolid. maj. seu symphyt. equiset. telephium. geran. Roberti, herniaria, millesol. perfoliat pilosell. plantag. pyrola, quercus, quinqufol. sanguisorb. sanicula, veron. vinca pervinca, virg. aur. flores balaust. hyperic. rosar. verbasci, nuces cupress. poma momord. fructus acacie, mastix, myrrb. pix naval. sangv. dracon. sarcocoll. thus, tragacanth. gummi carrann. hypocistis, malicor. spong. cynosbat. muscus pruni sylvestr. radix acori palustr. aristoloch. rot. bistort. rhapont. symphyt. maj. tormentill. axung. ursi & erinacei. Oleum milleped. lacertar. momord. ovor. Ictiocola, lepus lactans combust. & pulvis intus & extra applicatus. Alumen, bolus Armen. chalybs, corall. gypsum, hemat. Balsam. seu arcanum salis gemma; Ungv. ad herniam *Myns. Weickard. Comitissæ.**

Lubet hic addere in Infantibus, ubi peritonæum tantum extensum & non laceratum: *Ꝟ. magnet. ppt. gr. xj. cort. fraxin. gr. x. M. F.* Pulv. detur Infanti in vehiculo convenienti, per triduum manet; corpus servetur apertum leni clystere, & postquam hæc facta sunt, intestinum reponatur ad suum locum, & postea pars affecta inungatur seqv. unguento. *Ꝟ. Mell. rosat. ʒi terebinth. cum aq. plantag. lotæ ʒij ol. myrtill. pulv. visci quere. ʒß ceræ q. s. M. omnia l. a. F.* Unguentum. Postquam, ut dictum, pars affecta inuncta sit hoc unguento, insperge desuper limatur. ferri satis copiosè, & desuper pone duplicatum vel quadrupl. linteam, & tandem appone ligamen; est cura magnetica & probata.

Sunt nonnulli qui partem glaciei ipsi parti prominenti apponunt, & sic illo frigore intensiore partes relaxatas constringere faciunt, & postmodum demum remedia apponunt.

Quæ diximus de hernia intestinali, eadem servantur in hernia umbilicali, nisi quod hic plura carminativa ob flatuum præsentiam admisceri quandoque soleant. Sorbait sequentem

M m m

Mistu-

Mixturam umbilico inflato applicat: *℞. Pulv. semin. ameos, cumin. ana ʒiʒ alb. ovor. N. ij. Misc. & cum stupa applicetur. Vel fortius adstringens: ℞. Pulv. myrrh. cortic. cupress. nuc. cupress. acacie, mastich. lupinor. semin. ameos ana ʒj alb. ovorum q. s. ad incorporationem: fiat instar Emplastri. In hernia flatulenta sive inguinum sive umbilici valet sequens: *℞. Semin. cymmin. lupinor. baccar. lauri ana part. æq. pulverisata cum vino rubro ad pultis formam decoq. & applica. In hoc casu etiam valet Empl. oxycroc. quod potenter flatus discutit & partes roborat.**

Præter hæc externa, quædam etiam danda sunt interna, quæ consolidant, & specifica quadam proprietate juvant. *℞. Sani- cul. arnogloss. ana Mʒ agrimon. Mj radic. consolid. maj. ʒʒ, coq. in vase duplici in aq. lbj. colatura edulcoretur saccharo, quæ sæpe Infanti prabeatur. Multi laudant Essent. contra berniam Michaël. alij Tinct. mart. adstring. Valet etiam Pulvis auriculæ muris, Mense Majo collect. cum pulmentis & alijs præbendo. Idem præstat Pulv. lunariæ minoris. perfoliatæ, berniar. vel consolid. Sorbait exhibet penes ligaturam, Pulv. rad. valerian. & semin. perfoliat. manè & vesperi iterando. Wedelius inquit: duobus hisce præsidijs potissimum herniosi curantur, nempe Tinct. & aperit. cydoniat. & Arcano duplicato, longo usu continuata. Sequens remedium certissimum ad herniam habetur. *℞. Radic. silic. maj. detrahe fibrillas omnes radicem ambientes cuticulam, quæ superjacet radii exsicca in furno & pulverisa, & da quotidie dosin ætati & naturæ competentem.**

CAPUT LXXVI.

De Pernionibus.

Perniones sunt inflammationis genus, seu tumores in manibus & pedibus Puerorum, subinde etiam in apice nasi, in quibus

bus natura quædam acris inest & rodens, indè ulcus siccum, ex quo nulla vel pauca humiditas emanat, exciatur, quæ neglecta non rarò gangrænam inducere solet.

Curatio: in hoc affectu plurimum laudatur *Empl. diapalm.* *Ungv. de lytharg. de minio, de tutia, dialcaleyib. de nicot.* Inter remedia domestica multum prodest *rapa oleo rosato impleta, & frixa, partique applicata: adeps anserin. porcin. lac dulce, se-vum cerv. vervecin. succus citri cum adipe suillo, & multa* talia, quæ in postillis domesticis anicularum legi possunt.

CAPUT LXXVII.

De Ambustione seu Combustione von
den Verbrennen.

Ambustio seu combustio est continui (potissimum epydermidis & cutis, nonnunquam & carnis musculosæ, venarum, arteriarum, nervorum &c.) vi ignis (potentialis vel actualis) impressa & cum vel sine pustulis exorta solutio.

Curatio: Instituta debita dicitur ad frigidum tendente, ordinetur sequens topicum: *Album: ovor. N. 11. ol. rosat. ʒij aq. rosar. ʒj. Misc. & omnia simul conqussentur, deinde panniculus subtilissimus illo imbutus applicetur, nec citius amoveatur, quousq; æger sit sanatus, sed dum siccatus fuerit, parum plumâ in eadem mixtura intinctâ madesiat, donec omnino sanetur, quod plerumque quarta ambustionis die contingit, & tunc ad magis consolidandum, loco albuminum conqussentur duorum ovorum vitella in dicto linimento, & inunctio, ut antè perficiatur & administretur, donec novæ cutis regeneratio facta fuerit, tunc panniculus forfice paulatim præscindatur, & nec minima quidem apparebit cicatrix. Vel applicetur *Ungv. alb.**

Rhasis, vel atramentum scriptorium: in Italia in frequenti usu est *scolopendrium.*

CAPUT LXXVIII.

• De Furunculis, vulgò von Aßen.

Furunculus est cutis & carnosarum partium sub cute tuberculum in acutum tendens, magnitudine ovum columb. rarò excedens, rubore ac dolore, dum in pus vertitur, conspicuum, originem trahens (ut antiqui) à sanguine crasso & vicioso (vel ut Neoterici) à muco viscido, acido, acri & salso, massæ sanguineæ crassæ depravante, & sanguificationem vitiantē, simulque lymphæ laticem nimio acore & acrimonia inquinante, quod totum idem, sed tantum alijs verbis est dicere: quæ postmodum plus minus intensæ sanguinis & lymphæ labeis, si nutrimentum exinde pro augmentandis & sustentandis partibus subintret, & per partium poros & tubulos distribuatur, nullo modo ipsis perfectè assimilari potest, quin plus acore, antea quidem apparenter occultato, & aliquali simul visciditate ipsis inimica, hinc inde in pustulas congeratur, in quibus acor viscidus denud manifestatus cum vicino rore partium, acrius & violentius effervesceat, hinc altior tumor, intensior rubor, ardor & dolor supervenit, donec mutuâ temperaturâ, nunc in pus (ut in nostro præsentî casu) nunc in saniem, nunc aliud simile liquamen, (ut de tinea dictum) abeant; nunc per cuticulam prius in squamulas & furfures erosam (prout de serpigine & intertrigine diximus) exeant.

Curatio furunculorum peragitur internè sanguinem attemperantibus, edulcorantibus, visciditatem, & acidum corrigentibus, de quibus titulo de scabie, de tinea, & alijs in locis abunde diximus: externè autem maturatione & suppuratione, ad quem scopum faciunt *butyrum recens* sine sale, *caricæ pingues*, *cera virginea*; *Folia malvæ*, *violarie*; *medulla cervina*, *mel commune*, *passule maj. exacinate*. *Pinguedo anseris*, *galli*, *vituli*. *Radix. alth. lil. alb. terebinth. olibanum*, Simplex & vulgare habetur

betur remedium potens & approbatum ex *farina tritic. vel bord. vel filigin. cum melle mixt. in formam Unguenti densioris*, huic si *vitellum ovi* addideris, efficacius reddes euporiston. *Emplastrum de melilot. diachylon simpl. & comp. seu cum gummis. Farina semin. lini per se, vel cum alijs jam dictis in varia forma concinnata & applicata.*

CAPUT LXXIX.

De Rachitide, seu Tabe dorsali, seu pectorea.

PECTOREAM tabem appellamus non quòd intrà pectus sedem habeat, quo pacto, phthisis pulmonica, eo nomine comprehenditur, sed in qua pectoris crasis & figura vitiatur, id quod fit in hoc morbo. Rachitis igitur est medullæ spinalis aphonía, unde ob vitium nervorum laxitas & mollities partibus multis inducitur, & ideò ad motum impotentes fiunt & segnes, ut incedere Pueri non valeant, varias ossium contorsiones & excrescentias patiuntur, multisque gravibus symptomatibus (respirandi difficultate, capitis aquosa suffusione, lenta febre & totius corporis tabe) consumantur. Alij ab effectu sic describunt: *Rachitis* est intemperies frigida, à latice in medullam spinalem, partesque alias derivato, cum spirituum animalium torpore orta, ob cujus defectum vel excessum, partes aliz nutrimento privatz marcescunt, aliz plus solito nutritæ, in molem justò majorem augentur.

Causam hujus mali alij dicunt primas (Veteribus dictas) qualitates; alij per easdem introductam intemperiem, alij occultas qualitates, alij salia corrosiva, alij fermenta heterogenea, alij obstructions spinalis medullæ & nervorum, & inde influxum spiritibus denegatum. Dolæus nutritionem inæqualem & impeditam & Spirituum animalium influxum seu radiationem,

& consequenter humorum circulantium agglutinationem, ad quæ multum contribuit serum seu lymphæ vitiatæ vel stagnans.

Curatio: Cùm ergo affectus hujus causæ, in aliquali, non omnimoda obstructione spinalis medullæ & nervorum inde oritur, à materia viscida & tenaci consistat, videndum, ut obstructions tollantur, & spirituum animalium irradiatio promoveatur. Prior intentio perficitur *purgantibus*, *aperientibus*, *diureticis* & *diaphoreticis*. Secundæ intentioni satisfiet *specificis*, & *restaurantibus*. Curatio semper à catharsi incipienda suadetur, ut materia illa tenax evacuetur; & sic plures curati sunt. Sydenham sequentem præscribit *Potionem*.

℞. *Tamarind.* ʒ℥

fol. sen. s. sʒij

rhobarb. el. ʒ℥

coq. in f. q. aq. comm. in colat. ʒijj dissolve

mannæ el.

syr. rosat. sol. ana ʒj

Misc. dosis cochlear. j. vel ij. plus minus pro ætatis ratione, maneat per 9. dies, uno vel altero die intermisso; præterea ita moderari debet purgatio, dosim augendo vel minuendo, ut ultra 5. vel 6. sedes singulis diebus non procedat. Deinde post hanc catharsin sequens *Ingv. aperitiv.* ad totum ventrem inungendum & continuandum suadet.

℞. *Ol. lil. alb.*

tamarisc. ana ʒij

succ. rad. bryon.

apij ana ʒj

bulliant ad succorum consumptionem, adde:

ungv. dialtb.

bulgr. insuls. ana ʒj

gum. ammon. in acet. solut. ʒ℥

cere flav. q. s.

M. F. Lin mentum.

Dolzus

Doleus hac Sydenhamiana methodo multos feliciter curavit, & paulò provectionioribus, *pulv. jalap. à gr. j ad viij.* cuidam *syruo* adjecit, sic feliciter per vices purgavit, deinde dedit *ungv. suum de osmunda* (de quo pag. sequenti) quod extra dorso & artubus inunxit, & etiam iatus usurpandum porrexit; sicque multos restituit. Quòd si autem Rachitis, ut malum pertinax, his non cessit, sequentia adjecit: nimirum *clysteres*. Sequentem laudant Angli. *℞. Milleped. cum vino lotor. N. xx. vel xxx.* quibus contulis affund. *seri lact. ex vino alb. parati ℥iv. vel v.* in express. solve facieb. rubri; vulgo *Thoma dicti ℥iv.* Misc. Ad mucum acidum & vitendum in intestinis hærentem resolvendum, conducit *clyster ex sale ℥vi*; aliòve lixiviali acuatus. Inter alterantia specifica ab Anglis & alijs habentur *lipna*, & eorum *cortices*: imprimis *herba & radix osmunda regal.* Flores *spica* & omnes *radices aperientes*, herbaque omnes *cephalica sale volatili præpollentes*, imprimis *tbee*; omniaque *antiscorbutica*, eodem sale volatili imprægnata, ut sunt *millepedes, lumbrici terrest.* &c.

Inter *Chymica* celebratissimum est illud *Boyle*, cui nomen est *Ens Veneris* quod conficitur è *sale ammoniaco & colchotare*, id est, vitriolo calcinato edulcorato, & bis aut ter simul sublimatis. *dosis à gr. iij. ad iv. vel vj.* cum appropriato liquore tempore somni.

Præterea omnia hic conducunt *armoniacalia*, utpote quæ ob summam partium suarum tenuitatem, ad obstructions, affectum hunc efficientes, tollendas, maxime valent. Hinc conveniunt. *Spirit. sal. armon. simpl. & aromat.* seu etiam *volat.* Flores *sal. armon. simpl. & stis.* Sequens *sal artificiale* indolis atmoniacalis magnificat Doct. Mayhov.

℞. *Sal. volat. C. C.*

sang. human.

vel urin. q. s.

Quibus

Quibus phiolæ oblongæ immisiss, *spirit. salis* rectificat, aut etiam *spirit. sulph. per campan* tact, guttatim affundatur, quousque ebullitio non ampliùs excitabitur, sal hic resolutus per filtrum trajiciatur, & leni calore ad siccitatem abstrahatur.

Dosis à gr. iiii. ad vj mane vel tempore somni in vehiculo conveniente exhibenda,

In paulo adultioribus *chalybeata*, *Glata*, *Fata*, *castorina*, *cinnabarina*, omnem sæpe paginam implent, sic & omnia *cephalica* & *antepileptica* convèniunt, quatenus obstructions tollunt, humores circulantes perficiunt, spiritus animales eliciunt & restaurant: unde prolunt *spiritus sangv. humani simpl. vel comp.* vulgò *Spiritus celestis* vel *Balsamus Samaritanus dicitur*, cujus hæc est descriptio:

R. Sangv. human. q. v.

Destilla per organa vitrea in MB. tam diu, donec sal valet, alembico adhæreat, caput mortuum calcinetur, & extrahetur cum *aq. præon.* sal fixum, liquorem ex sanguine prædictum rectifica, & hic dicitur *Celestis simplex*,

Compositus sic fit:

R. Rad. præon.

acori

bistort. ana ʒß

st. lavend.

papav. errat.

rosar. rubr.

nymph. ana Mß

visc. quercin. ʒß

sem. præon. ʒiii

camph. ʒi

pulv. santal. rubr. ʒß

aq. vit. pro balsamo ʒiv,

essent. ʒis ʒij

balsam.

balsam. cœlest. simp. supra dict. ʒvij
extract. castor. ʒij
essent. opij ʒij.

Incis. & contus. Misc. & infund. diebus aliquot, stent in loco calido, postea colerur, filtretur & usui servetur. *Aque vite pro Balsamo* sequens est descriptio:

℞. *Herb. beton.*

salv.

majoran.

rosmarin.

fl. lil. convall. ana Mj

4 cordial. ana Mʒ

stœchad. Arab. Pj

spic. Ind. ʒj.

Misc. destillentur per MB.

Vires hujus Balsami præstantissimæ sunt, in epilepticis & convulsivis motibus, affectibus soporosis, & nervosum systema. divexantibus. *Dosis* à gutt. j. ad x. in *aq. flor. tilia*, vel *ceras nigr.* vel *Epilept. pueror.*

Valet etiam *Spiritus C. C. simpl. vel comp. seu liquor C. C. succinatus* dictus, à Michaële & Hoffmanno descriptus hoc modo. ℞. *Sal. volat. succini, C. C. optimè depurat. ana q. pl.* dissolve in *Spiritu C. C. rectificato*. Hæc si destillentur, sal volat. cum Spiritu ascendent, & liquorum hunc constituent.

Schöfferus laudat suum *Balsamum nervinum*. Ex his & similibus sunt composita, & varij generis formulæ. ℞. *Radic. osmund. regal. ʒiʒ rad. pæon. maris, ligni santal. citrin. semin. nasturt. aquat. ana ʒj flavedin. aurant. condit. ʒij.* pulverisatis add. *sacch. q. s.* seu ʒv plus minus in *aq. osmund. regal. solut. F. l. a.* Rotulæ vel Tabulæ, pondere ʒj. accipiat Infans mediam vel integram, bis in die superbibendo *Aquam* sequent. Doct. Mayow.

x. Rad. ari

pæon. mar.

osmund. regal.

(seu rad. filicis maris) ana ʒij

fol. salu.

beton.

nasturt. aquat.

beccabung.

veron.

bepat.

summit. abiet. ana Mij

jugland. virid. ʒß

milleped. lotor. ʒij

castor. ʒj

Incis. & contus. affund. feri lact. ex vino alb. parat. ʒvj destil-
lentur l. 2. Dosis ab ʒß ad ʒij. pro ætatis ratione bis in die.

Unguentum de Osmunda Dolei cujus mox mentionem feci-
mus intus & extra usurpandum, & expertissimum, est hoc:

x. Fol. osmund. regal. querne virentis Mvj

salu. rubr. anagallid. ana recent. Mj

laur. majoran.

rosmar. ana virid. Miß

succ. berb. cardiac.

beccabung.

nasturt. aq.

trifol. fibrin. ana ʒij.

bacc. juniper. ʒj.

Concisa omnia minutim contund. opt. in mortar. lign. vel mar-
moreo, cum ʒvj butyri majal non saliti, deinde maccerentur per
14. dies, tum paulatim liquecant in MB. & cum fermentesce-
re incipit, fiat expressio & Unguentum pro usu.

Potus

Potus sit decoct. rad. osmund. regal. vel potus thee, vel decoct. flor. salviae. vel sol. betonic. &c. in aq. ferventissima & saccharo modico edulcoretur; vel decoct. chinae, vel ligni sassafr. aut cortic. pini.

Remedia chirurgica sunt *venesection* quam Angli admittunt in plethora: *scarificationem* quoque suadent fact. in concha aurium, sanguinemque parva quantitate detrahere solent, quam operationem cultello obrusore peragunt, idque bis aut ter interpositis semper septem diebus repetunt; laudant quoque *hirudines*, *fonticulos*, *setacea*, *vesicatoria*, *cucurbitulas*, huc etiam valent *frictiones* pannis lincis calidis, praesertim in spina & partibus musculosis, ossiumque concavis (prominentes autem non fricentur) tactæ: Si vires ferant, obambulatio crebra in usu sit, ut spiritus concitentur ad musculosas partes. Hic etiam in debilitatis convenit gestatio ex ulnis nutricum, & cunarum jactatio: conrectentur hypochondria, instituuntur quandoque ligaturæ, ut sanguinis aliqua portio, versùs partes extenuatas deducatur. Ut spina erecta teneatur, & ossa prominentia reprimantur, confici possunt ex ossibus ceti, vel melius, ex ferro thoraces, qui Infantibus adaptentur.

Neque hic omittenda est artificialis corporis suspensio, ope instrumenti cujusdam penduli ex fascijs ita formati, ut pectus sub axillis complectatur, & caput sub mento aliâ fasciâ circumdatur, manusque binis ansis excipiat, quò ita corporis onus succindatur, donec in decentem restituatur formam. *Fomentationes* etiam præ alijs conducunt, institutæ vel cum vino vel aq. vitæ, vel alijs spiritibus, spinæ & alijs debilitatis partibus: Pro fomento laudatur sequens *Decoctum*.

℞. Rad. osmund. regal. ℥iij

sol. beton.

salv.

rorismar.

majoran.

nasturt. aquat. ana Mj

flor.

flor. chamom.

melilot.

samb. ana ꝑj

bacc. laur.

junip. ana Ꝟß

Coq. in *aq. font. q. s.* ad *Wij* add. *vini alb. generosi*, vel *aq. vitæ*
Wj. colatura fervetur usui.

Sequens *Unguentum* pro partibus debilitatis est expertum :

ꝛ. Fol. samb.

laur.

majoran.

salv.

rosmarin.

beton.

summit. lavendul. ana Mij

bacc. laur. junip. ana Ꝟj

M. incisa & contusa vasi idoneo indantur, cum *butyri majal.*
 vel *rec. non saliti Wij aq. vitæ Wß.* coq. lentè ad *aq. vitæ* con-
 sumptionem : express. adhuc calidæ add. *ol. nucist. express. Ꝟß.*
balsami de Perù Ꝟj. Misc. F. *Unguentum* pro usu.

Hiscæ nihil juvantibus ad *balneum naturale thermarum*, vel
artificiale ex herbis cephal. Pro *ꝙ* & *ꝑlo* parat. confugiendum.

Symptomatum quoque habenda est ratio : uti est alvi fluxus,
 qui optimè curatur *levioricus catharticus*, *infusione* nempe *rhab.*
 & adhibitis varijs *stomachicis* parum adstringentibus, de quibus
 jam alibi.

Ad sudores colliquativos discutiendos, conveniunt varia
aperientia & digestiones juvantia de quibus etiam suis locis.

Ad asthma & difficilem anhelitum conveniunt *pectoralia bal-*
samica, præprimis *balsam. ꝙris ad gutt. iij.* in appropriato vehi-
 culo : extrâ pectus inungatur sequenti *Ungv. ꝛ. Ungv.*
pectoral. Ꝟj. ol. nucist. express. Ꝟj. Misc.

CAPUT LXXX.

*De ambulandi Impotentia, & Crurum
distorfione.*

Pueri sæpe in ætate duorum annorum, cùm gradi incipiunt, inepti & ad eundem rari esse consueverunt, de quo matres sollicitæ auxilium quærunt à chirurgis, qui plerumque varijs machinis crura & tibiae erigere conantur, sed frustra, quia sponte à natura ut plurimum circa ætatem trium aut quatuor annorum tibiæ & musculi firmanantur, & partes ad statum naturalem redeunt, & certè natura firmandorum articulorum optima est architectrix. Contingit etiam sæpius in Pueris, quibus abdomen insigniter ab obstructionibus tumet, quòd illi anatum more incedant, ad dextrum & sinistram latus inclinantes, qui obstructionibus solutis liberè incedunt.

Sequens *Unguentum*, pro ambulatione tarda ab articulorum debilitate, ut ossa firmentur, multum servit.

℞. *Herb. salu.*

majoran.

ebul. ana part. æq.

Extrahe succos ex contulis, postea inde eos in cucurbitulam vitream bene lutatam, ut paulò plùs quàm medium compleat, coq. in forno tam diu, sicut panes smilagineos, cùm frige factum fuerit, videbis fracto vitro mixturam instar Unguenti: de hac sume q. pl. add. *medulle crurum bovis q. s.* inunge calidè crura & coxas infantis.

CAPUT Ultimum.

De Lue venerea.

Lues venerea est morbus malignus contagione inductus, massam sanguineam, humores & partes corporis corrumpens,

N n n 3

pens,

pens, maculis rubris, tuberculis, ulceribus contumacibus & cruciatibus in manibus, alijsque plurimis symptomatibus, nocturno præsertim tempore se prodens. Nomina habet varia, *primò* dicitur, *Lues venerea*, (quia plerumque vel per concubitum vel contactum, vel suæ ab infecta persona lacte, oritur) *secundo Morbus Gallicus* (quia apud Neapolim à Gallorum Exercitu infecto prodijt) *tertio Neapolitanus* (à Civitate Neapoli, quia ibidem primò innotuit) *quarto Italicus* (quòd plurimùm ibidem vigeat) *quinto Hispanicus* (ab Insulis quibusdam Amerieis) *sexto Indicus* (pariter ab Insulis quibusdam in quibus populariter hic affectus grassatur) *septimo Syphilis* (à Fracastorio magis Poëtice quàm Medicè sic dicta) *octavo Pudendagra* (quòd easdem partes potissimùm & læpius occupet,) *nono Variola magna* (quia tubercula in hoc affectu longè sunt majora, quàm in ordinarijs puerorum variolis.

Lue venerea, Infantes, in & extra uterum corripì, experientià & exemplis constat.

Causa hujus affectus, est acrimonia humorum salina, lixiva & acida, quando nimirum duo pugiles nostræ naturæ, bilis & succus pancreaticus, ut & lymphæ glandulosæ, luxurians, communicato à matre vel nutrice infecta (idque vel in utero per circulum sanguinis, vel extra uterum per suctum lactis) contagio, à constitutione naturali recedunt, atque vitium hoc virulentum contrahunt: exempla enim sunt in patulo, Infantes plurimos suæ lactis, aspersione salivæ, exosculatione, lecto communi, usu vestium infectarum &c. accedente molli & rarâ corpusculorum puerilium texturâ, hoc malum contraxisse.

Affectus hic gravis & difficilis est, præsertim in tenellis his corpusculis, remedia generosa huic affectui competentia, minimè sufferentibus.

Curatio, duplex est; *universalis*, quæ causas; *particularis* quæ singula symptomata respicit.

Riverius, puerum ætate 30. mensium, lue & fœda scabie affectum,

ſum, ſequentibus remedijs curavit. *℞. Rafur. ligni Guajac.* ʒij aq. font. ʒiij infund. per 24. horas, deinde bulliant ad tertiæ partis conſumpt. Colaturæ capiat ʒij vel ij ſingulo manè, duabus horis ante paſtum, corpus tegendo paulò plus ſoliſo, & continuando per 20. dies.

℞. Diagryd. ꝯrati gr. vj. Calometan. gr. v. M. F. Pulvis tenuiſſimus, detur cum cochl. j. vel altero panatellæ ſaccharatæ, ſuperbibendo parum juſculi: continuetur hoc remedium quinto quoquo die, augendo doſin utriuſque medicamenti juxta operationem: *℞. Reſidentiam prædicti decocti, aq. font.* ʒiij. fiat buccetum pro potu ordinario, addendo ſacch. & liquirit. q. ſ. ad ſaporis gratiam; hiſ remedijs per unum Menſem continuatis, probè convaluit.

Curatio alia, Pueri duorum annòrum à nutrice infecti lue venerea, quæ ſe prædixit primùm puſtulis latis & rubris in perinzo, ijsque ſucceſſerunt ulcera in natibus juxta podicem, mox puſtulæ in facie, ac tandem exulcarationes in faucibus ac labiis, accedente corporis conſumptione indies progrediente. *℞. Senn. mund. ʒiſ. rhab. elect. agaric. trochiſc. ana ʒij cinamomi ʒſ* infund. in aq. card. bened. Diſſolve in expreſs. *ſyr. roſat. ſolut.* ʒj. F. Potio manè danda, & ſemel in ſeptimana repetenda. Diebus intermedijs uſus eſt ſeqv. *Decocto: ℞. Ligni Guaj. ʒj. cort. ejusd. ʒſ, aq. font. ʒiij.* infund. & decoq. ad tertiæ, colaturæ capiat ʒiij manè ſine ſudore ob metum nimix conſumptionis & ſiccationis in corpore tenello, quare victum etiam analepticum concedendum, conſonum erat, eodem decocto utebatur pro potu ordinario, ſed diluto æquali portioe aquæ. Cùm hæc remedia continuâſſet per 20. dies, omnia ſymptomata diſparuerunt, & æger in ipſo remediorum uſu reſectus & impinguatus fuit. Recruduerunt tamen poſt aliquot menſes ſymptomata, idèò iterata ſunt remedia, ſed Decoctum efficacius efficiendo, ac ſtragulis cooperiendo, ut ſaltèm leviter ſudaret. Hac curâ iterum reſtitutus fuit, intra dies 20, quam diutiùs continuâſſet mern recidivæ,

divæ, nisi hyems rigida obstitisset. Intermisso itaque remediorum usu per dies circiter 20, ulcera renovata sunt: Cùm tunc cælum esset temperatius, curam, sed efficaciorē aggressus est.

Primum dedi *Mercur. dulc. gr. viij. cum diagryd. gr. iv.* in iusculo, quò calidè per vomitum & secessum purgatus est, quarto quoque die medicamentum exhibebatur. Intermedijs verò diebus sumebat *decoctum*, hoc modò paratum. Supradicta *Gua-jaci* & ejus *cortic.* quantitas, ponebatur in alembico cum aq. *thibis* infundebatur per diem naturalem, ac postea destillabatur ad medias. Liqueor superstes colatus miscebatur cum aq. destillata, quæ erat acidula. Hujus mixti dabantur ζ iv. manè calidè, corpus tegendo, & sudores copiosiores effluebant. Per 20. dies continuata fuit postrema hæc curatio, ex qua morbus omnino sublatus.

Ulcerberus natiū admovebatur *Ungv. ex melle rosat. vikell. ovor. & terebinth.* Faucium verò ulcera brevi curantur *melle rosaceo; spiritu Oli acido* reddito.

Hæc est itaque series omnium & singulorum morborum & effectuum præter naturam, qui Infantibus vel solis competunt, vel magis familiares sunt, quos *Hipp.* tanquàm in compendio tribus *Aphorismis, sect. 3. aph. 24. 25. 26.* plerumque complexus est, & nos in hoc tenui opusculo compendiosissimè pro utilitate publica medentium & medendorum concessimus: velint Superi, ut quæ in paucitate verborum fideliter diximus, in eventu, multarum felicissimarum curationum, cum sænore assequamur, sitque optatissima Sanitas omnium & singulorum.

F I N I S.



INDEX.

INDEX SPECIALIS

Rerum & Remediorum.

A.

Ablactatio Infantis, 288 tractatio post ablactationem 289

Abscessus mammarum, 308
Achores. 383. causæ, 384. curatio. 385. seqq.

Acrimonia triplex juxta Neotericos. 213. qualis peccet in Variolis. *ibid*. curatio. *ibid*.

Aër Variolantibus qualis eligendus. 167

Alvi constipatio in Variolantibus unde? 78

Alvi profluvium *vid.* Diarrhoea.

Ambustio. 459. cura. *ibid*.

Angina. 396. curatio. 397. seqq.

Anhelitus compressio in Variolantibus unde? 71

Ani procidentia. 437. causa. *ibid*. curatio. *ibid*. seqq.

Animi perturbatio in Variolantibus unde? 73. Deliquium. 75

Aphorismi *Hipp.* 50. *sect.* 2. explicatio. 178. seqq.

Aphthæ, 370. curatio *ibid*. seqq.

Aqua confortativa nobis ab initio Variolarum usitata. 147. destillata. 157. expulsiva *Dolai.* 160. *ophthalmica Grüllingii.* 187 *Dolai.* 189. *Timai.* *ibid.* *Maximiliani Imperat.* 190. vitæ pro balsamo. 465. *D. Majow.* 466

Ardoris sensus in Variolantibus unde? 71

Arquatus. *vid.* Icterus

Asthma. 398. curatio *ibid*. seqq.

Atrophia Puerorum. 325

Aurium affectus ut curandi. 192.

tumor. 330. humiditas. 392.

causa. *ibid*. curatio. *ibid*. seqq.

inflammatio. 393. dolor. *ibid*.

cura *ibid*. seqq.

B.

BAlneum aquæ dulcis an conveniat. 139. ad Calculum

Renum & Vesicæ. 440

Balsamus Samaritanus simpl. & comp. 464

Bolus expellens. 162. *Primiroffi.*

164. adstringens. 210. ad Jct-

rum. 415

O o o

Calcu-

C

- C**Alculus Renum & Vesicæ. 439.
curatio. *ibid.* seqq.
- Calor variolantium unde oriatur. 68
- Capillorum morbi. 228
- Capitis dolor in variolantibus unde. 69. 394. causæ. *ibid.* curatio. 99
- tumores recens natorum 313.
- Cardiacis quando utendum. 81.
cur. & quali in casu mortem accelerent. *ibid.*
- Cardialgia in Variolantibus unde? 75 406
- Cataplasmata balsamica *Dolei*. 204. ad inflammationem mammarum. 309. ad dolorem inflammatorium. *Riverii*. 324. *nostrum*. 325. ad herniam. 456
- Cataracta. 378. cura. *ibid.* seqq.
- Catarrhus. 400. curatio. 402. seqq.
- Catharsis quando locum habet in Variolis. 84
- Causarum divisio quomodo & quotupliciter à Medicis fiat. 33
- Cephalæa. *vid.* Capitis dolor.
- Cephalalgia. *vid.* Capitis dolor.
- Cibus qualis in variolantibus porrigendus. 168. qui vitandus. *ibid.* ejus ratio in statu morbi. 169. in declinatione. *ibid.* Infantis ejusque vitia & cura. 280 seqq.
- Cicatrices post Variolas unde. 302
- Claretum nostrum pectorale. 205.
- Clysteres in principio Variolarum & Morbillorum usurpandi. 135. abstergens. 207. alius. *ibid.* adstringens. 208. alius. *ibid.* *noster* expertissimus. *ibid.* in Variolantibus dysentericis *Raverii*. 210. in epilepsia. 360. catarrhalis. 403. ad diarrhæam. 416 ad Colicam. 424. lumbricos enecans. 431
- Coagulatio Lactis quomodo impedienda. 303
- Cœliaca. 436. causa. *ibid.* curatio. *ibid.*
- Colica. 423. signa. *ibid.* curatio. 424. seqq.
- Colli vitia. 195
- Collyrium nostrum ad oculorum inflammationes. 188. *Grülingii* ad nebulas abigendas. *ibid.* ad Cataractam completam *nostrum*. 378
- Comatis curatio 186.
- Comedones. 334. differentia. 335 causæ. 336. curatio. *ibid.*
- Compositio. 459 cura *ibid.*
- Confortantia Cor & alia viscerum. 200. seqq.
- Contractura. 453. cura. *ibid.*
- Contusiones Infantum. 313. seqq.
- Convulsio in Variolantibus unde? 73. 229
- Convulsio Puerorum. 345. causæ. *ibid.* curatio. 346. seqq.

Cor-

INDEX.

Cordiale in malignis Variolis *no-*
bis usitatum. 154
Cordis palpitatio in Variolanti-
bus unde? 71. tremor. *ibid.*
Cosmeticum 227
Costarum succretio. 406
Cranium depresso. 378
Cremor ad sœdum cutis colorem
à Variolis *Mercurialis*. 227
Crisiones. 334. differentiz. 335.
causæ. 336. curatio. *ibid.*
Crisis perfecta unde dignoscatur.
132. imperfectæ signa *ibid.*
Crurum distortio. 462. cura. *ibid.*
Cruſta lactea. 383. causæ. 384.
curatio. 385. *ſeqq.*
Crustarum viscosarum in Variolis
causa. 84. earum fiendi modus
ſecundum *nos*. 85
Cura Infantis recens in lucem e-
diti. 259. *ſeqq.* à tempore den-
titionis usque ad tempus abla-
tationis. 287. *ſeqq.*
Custodia Infantis recens in lu-
cem editi 259. *ſeqq.*
Cutis asperitas in toto corpore.

excoriationem. *Ejusd.* 189. ad
colli defensionem. *Dolci.* 199.
ad faciem prurientem. *Riverii.*
213. aliud 215. pro gregariis.
249. ad pediculos *Primiroſi.*
383. in tinea. 387. ad Rachiti-
dem. 467

Delirium in Variolantibus unde?

73
Dentitio Puerorum. 361. indicia.
362. curatio. *ibid.* *ſeqq.*

Destillatum in pulmone affecto
efficax *Dolci.* 205

Diabetes. 441. curatio. 442

Dixta Infantis à tempore den-
titionis, usque ad tempus abla-
tationis. 287

Diaphoretica quando in Variolis
propinanda. 137

Diarrhoea in variolantibus unde?

77. 416. cura. *ibid.*
Dolor capitis. *vid.* Capitis dolor.
Dolor ingens in toto corpore à
Variolis & Morbilib. 213. cura-
tio juxta *nos*. 214. aliorum.
ibid.

Dorsi dolor cur in variolantibus
percipiatur. 69. Neotericorum
ſententia. *ibid.* 200

Dracunculi. 334. differentiz. 335.
ratio. *ibid.*

Dulcia in Variolis an profint?

171

Dyscrasia Infantulorum. 218

Dysenteria in Variolantibus un-
de? 77. 416. cura. *ibid.*

Dysuria. 445. causæ. *ibid.* curatio.
ibid.

O o o 2

Ebul.

D.
Debilitas Infantum recenter
natorum. 311
Decoctum Antifebrile *noſtrum.*
Ectimaticum *Franchimond.* 156
expulſivum. 158. lentium *Ri-*
verii. 173. *noſter* modus idem
parandi. 174. *Avicenna.* 176.
Thiermager. 177. ad coalitum
Narium *Grœling.* 194. ad gulæ

E.

Ebullitio quotuplex. 56. causæ
mediatæ internæ. 61

Effervescentia sanguinis & musti
quomodo differant. 43. *seqq.*

Electuarium puerile purgans *Ma-
mageta*. 136. confortans *Grü-
ling*. 201. ant-epilepticum. *Sor-
bait*. 349

Elephantiasis, ut distinguatur à
variolis. 26. cur non sic sanabi-
lis. *ibid.*

Emphysema. 375. causæ *ibid.* cu-
ratio. *ibid.*

Emplastrum ad mammas *nostrum*.
309. ad elevandum os cranii.
374. ad sternutationem. 396.
stomachale rubrum *Dolai*. 410.
in vomitu bilioso *Jelis*. 411.
ad herniam *meum*. 454. aliud.
455

Emulsio in Variolis & Morbillis.
160. alia *Dolai*. 161. alia *Jun-
cken*. *ibid.* in mîstu cruento *Ti-
mai*. 206. ectymatica. 249

Enteroccele. 454. causæ. *ibid.* cu-
ra. *ibid.* *seqq.*

Epilepsia in Variolantibus unde?
74. Puerorum. 345. 348. cura-
tio. *ibid.* *seqq.*

Erysipelas mammarum. 310. In-
fantis. *ibid.*

Excrementorum alvi suppressio &
durities. 420

Excrementum in sanguine du-
plex reperitur. 60. viridia in
infantibus unde. 78

F.

Faciei morbi. 217. præservatio
& curatio juxta *Timeum*. *ib.*

Fascinatio Puerorum. 325. 331.
signa. *ibid.* curatio. 332

Faucium asperitas in variolanti-
bus unde? 72. ariditas. *ibid.* al-
bedo. *ibid.* exsiccatio *ibid.* in-
flammati. *ibid.*

Favi. 383. causæ. 384. curatio.
385. *seqq.*

Febres Infantulorum continuæ,
intermittentes, catarrhales &c.
318. *seqq.*

Febris diversa in variolantibus.
15. sui generis, naturâ qualis
sit. 18. unde derivetur. 106.
post Variolas. 229. unde co-
gnoscatur. *ibid.* quid tunc a-
gendum. *ibid.*

Fermentatio unde derivetur. 106.
definitio. *ibid.* modus. *ibid.*

Filetum sub lingua in Pueris. 366.
curatio. *ibid.*

Fissurarum & rimarum in papil-
lis curatio. 307. labiorum cura-
tio. 369. *seqq.*

Fœtus non nutritur impuro san-
guine. 46. *seqq.*

Fomentum ad procidentiam ani.
437

Fontanella capitis. 317. *seqq.*

Formula Remediorum simplici-
um. 143. *seqq.* compositorum.
148. *seqq.*

Foveæ à Variolis in facie ut evi-
tandæ. 218. *Digbei* modus. 219
aliorum opiniones. 220. *seqq.*

Frigus

Frigus variolantibus summe nocivum [167](#)

Fumus ad tumorem post aures [230](#)

Furunculi [460](#), cura, ibid,
G.

Galenus locus Aph. 9. Lib. 6, quomodo intelligendus, 71

Gargarismus ad oris & faucium mala [195](#) *Grüling*. ibid. *Timai* [196](#). ad gulæ excoriationem *Grüling*. [198](#) in salivatione nimis viscida *Ejusd.* [199](#). alius, ibid.

Gelatina *nostra* pretiosa [170](#)

Germanorum mos tardior in Venesectione incusatur [122](#). nostra consensio ibid.

Gibbositas [446](#). cura ibid.

Glaucoma. [380](#). curatio ibid.

Gravitas variolantium [unde? 70](#)

H.

Hæmorrhagia ante & in eruptione Variolarum bona, post illam mala [99](#)

Hæctica Puerorum [325](#)

Hemicrania *vid.* Capitis dolor.

Hernia umbilicalis [449](#).

Herpes [448](#). cura [482](#)

Herula [14](#) prope annorum *Observatio*. IV. [245](#)

Hydrocephalus. [376](#). curatio. ibid seq.

Hypochondriorum succretio. [406](#) curatio. ibid. seqq.

I.

Icterus [414](#). causæ ibid, curatio. ibid. seqq.

Impetigo. [448](#). cura [449](#):

Impotentia ambulandi, [469](#).

Incontinentia urinæ. [441](#). curatio. [442](#).

Incubus Puerorum [342](#). causæ ibid. curatio [343](#). seqq.

Infantis recens in lucem editorum

Providentia, Custodia, Cura,

&c. [259](#). Lac & Potus ejusque

vitæ & cura [271](#). seqq. Punctula

& Cibus, eorumque vitia

& cura. [280](#). seqq. Diata, Cura,

Tractatio à tempore den-

tionis usque ad tempus abla-

ctionis. [287](#). seqq. post abla-

ctionis. [289](#). Morbi, eorumque cau-

sæ in genere [290](#). seqq. curatio.

[297](#). seqq. Erysipelas. [310](#). In-

fantum recens natorum Debili-

tas [310](#). seqq. Contusiones &

tumores Capitis, aliarumque

partium [318](#). seqq. Fontanella

capitis & futuræ nimis blan-

tes [317](#). seq. Calida intempe-

ries, Febres continuæ, inter-

mittentes, catarrhales. &c.

[318](#). seqq. Macilentia, Tabes,

Phthisis, Atrophia, Hæctica &

Falcinatio [325](#). seqq. Comedo-

nes, Dracunculi, Crinones [334](#).

seqq. Prunella [338](#) Vigiliæ, In-

somnia, Pervigilium [339](#). seqq.

Incubus, Pavores. [342](#). seqq.

Convulsio & Epilepsia [345](#).

seqq. Dentitio [361](#). seqq. File-

tum sub lingua [366](#). Ranulæ

sub lingua. [367](#). seq. Labium le-

porinum [368](#). seq. Rhagades,

O o o 3

Fistu-

Fissuræ, Rimæ, Scissuræ labio-
rum 369. seq. Aphthæ, Paru-
lis & Fœtor oris 370. seqq. U-
vulæ relaxatio & Syriasis 373.
seq. Emphysema & inflatio pal-
pebrarum 375. Trachoma, Pso-
rophthalmia & alteratio pal-
pebrarum ibid. Ptosis 376.
Hydrocephalus ibid. seq. Cra-
nium depressum 378. Ophthal-
mia & Cataracta. ibid. seq.
Strabismus, 379. Lachrymæ &
Fletus 380. Glaucoma. ibid.
Phehriasis 381. seqq. Crusta
lactea, Favi, Achores, Psydra-
cia, & Tinea 383. seqq. Aurium
humiditas 392. seq. Inflamma-
tio, dolor & Parotis 393. seq.
Capitis dolor, Cephalalgia,
Cephalæa, Hemisrania 394. seq.
Sternutatio 395. seq. Angina,
Tonsillarum inflammatio, Pa-
rithmia, 396. seqq. Asthma
398. seqq. Catarrhus, Tussis
& Pectoris oppressio 400. seqq.
Respirationis interceptio 405.
Hypochondriorum & Costa-
rum succretio, inflatio, pecto-
ris angustia & Cardialgia 406.
seqq. Nausea & Vomitus 408.
seqq. Ructus & Singultus 412.
Icterus 414. seqq. Alvi proflu-
vium, Diarrhæa & Dysenteria
416. seqq. Ventris inflatio &
incumescencia 419. seq. Excre-
mentorum alvi suppressio &
durities 420. seqq. Colica 423.
seqq. Lumbri 428. seqq. Lien-

teria 436. Tenelismus, ibid. Ani
procidencia 437. Calculus Re-
num & Vesicæ 439. seqq. Dia-
betes 441. seqq. Icturia 443.
Stranguria 444. Dysuria 445.
Gibbositas 446. Intertrigo 447.
seq. Impetigo, Lichen, & Her-
pes 448. seq. Umbilici inflam-
matio, protuberantia & Hern-
ia umbilicalis 449. Nævi ma-
terni 450. seq. Purpura, Rosa-
lia, Verticatio, Scabies. 451.
seq. Paralysis & Contractura
453. Hernia 454. seqq. Pernio-
nes 458. seq. Ambulatio 459.
Furunculi 460. seq. Rachitis
461. seqq. ambulandi Impoten-
cia & crurum distortio 468.
Lues Venerea ibid. seqq.
Inflammatiō mammarum 308.
Inquietudines in variolantibus
unde 71.
Insomnia Puerorum 339. causæ
ibid. curatio ibid. seqq.
Intemperies calida Infantulorum
318.
Interruptiones in somno vario-
lantium unde? 71.
Intertrigo 447. cura ibid. seqq.
Intestinorum morbi 207.
Icturia 443. curatio ibid.
Jalapum in Variolis & Morbillis
162. Timæi pro potu 176. Ri-
verii. 211. ad immoderatum
lochiorum fluxum. 232.
Jusculum Timæi 169.
Juvenis viginti annorum vario-
lans Observatio III, 237. Kir-

INDEX.

K.

Kircheri, Athanas. admonitio-
nes quædam, circa novam sen-
tentiam Variolarum 58.

L.

Labia fissa & arida 200.
Labium leporinum 368. cura-
tio ibid. seq.

Lachrymæ involuntariæ in vario-
lantibus unde? 71

Lactis vicia & cura 271, 284.
seqq. defectus & coagulatio
302. seqq. redundantia. 305.
seqq.

Lassitudo variolantium unde? 70.
Lentes utrum in variolis condu-
cant 171

Lienteria 436. causa ibid. curatio
ibid.

Lingux asperitas in variolanti-
bus unde? 72. albedo ibid. ex-
siccatio ibid. inflammatio ibid.

Linimentum oculos defendens
Thiermayr 187. *Plempis* 190.
ad Narium coallitum *Grüling.*

194. ad scædas faciei cicatrices
Parai. 220. *Sorbait.* 223 *Timæi*
225. aliud. ibid. *Claudii.* 226.
nostrum 227. ectymaticum 248

250. in vesiculis gingivarum
371. *Sorbait.* ibid. *Dolai.* icid.
in tinea *Fuhrmanni* 391. *Sto-*

machale Sorbait. 411. ad rash-
sidem *Sydenham.* 462

Lotio capitis in tinea 389

Lues Venerea 469. causa 470.
curatio seq.

Lumborum dolor, 200

Lumbrici 428. causa ibid. curatio
429. seqq.

M.

Macilentia Puerorum 324

Magisterium epilepticum 356

Mammarum inflammatio, aposte-
ma & abscessus 308. seq. erysi-
pelas. 310.

Medico necesse est qualitatem hu-
morum & motum judicare
120. quæ agenda dum natura
bene operatur 138

Medicus nihil præstare potest,
absque accurata pulsus cogni-
tione. 80

ejus officium in variolanti-
bus 185.

Mixtura excellens ad defensio-
nem oculorum 187. restau-
rans *Grüling.* 202. ventricum
robórans *Ejusdem* 203. alia ibid.

adstringens ejusd. 211. ad pru-
ritum *Piens.* 215. diaphoretica
243. epileptica. 284. absorbens

Dolai 428. adtussim ejusd. 329
catarrhalis 402 *Merici Grülin-*

gii. 415. ad colicam. 426
Morbi Infantum eorumque causæ
in genere 290. seqq.

Morbili, cujus moris morbus sine
r. eorum etymologia, s. subje-
ctum, 11. definitio 19. differen-
tiæ ibid. seqq. circa eas quædam
notæ.

I N D E X.

notanda 21. cur tam cito proveniant. 30. quomodo culicum morsus ab ijs distinguatur. *ibid.* subiectum adæquatum primum 31. subiectum causæ *ibid.* Causæ variæ ab Authoribus varijs. 32. si à malignitate aëris producantur, non fiunt per fermentationem naturalem 42. causa, quod nunc morbilli, jam variolæ grassentur 45. quando sint contagiosi & epidemii *ibid.* de causa morbillorum sententia Helmontii 53. 64. Sylvii. *ibid.* Michaelis 54. Cartesii. *ibid.* Mercurialis *ibid.* Kircheri. *ibid.* Lindani. *ibid.* Digbæi *ibid.* Ettmülleri & Dolæi *ibid.* convenientia Veterum & Neotericorum in causis morbillorum 55. signa diagnostica 67. seqq. cur in ijs non fiant rigores 71. præsentium Morbillorum signa 86. seq. signa differentiarum 87. causarum *ibid.* locorum *ibid.* signa quibus dignoscatur utrum aliquis nunquam amplius Morbillis sit corripiendus *ibid.* signa prognostica 88. seqq. cur in Italia Morbilli periculosi 89. Morbillorum tempus quoduplex 90. eorum eadem fere estratio cum Variolis 103. indicationes 104. seqq. curatio prophylactica 107. seqq. curatio practica 113. seqq. remedia 134. diætæ 167. correctio symptomatum occurrentium 185.

Morborum hæreditariorum requisita 4.
Morbus Regius *vid.* Icterus.
Motus criticus quoduplex. 90
Motus epileptici sunt signum futurarum variolarum 75
Mulier Bononiensis, septies variolas passa 34

N.

Nævi materni 450. curæ *ibid.* seq.
Narcoticis quando utendum 81
Narium affectarum curatio 293
Nasi pruritus in variolantibus unde? 70. incurvatio 71
Naturæ non bene agentis expellentibus succurrendum 138
Nausea in variolantibus unde? 26
Nausea 408. causæ *ibid.* curatio 409. seqq.
Nodus præservans in Variolis & Morbillis 112. pro potu in delicatis 174. alius Michaelis. *ibid.* alius Dolæi 175. ad nares affectas 193. pro aqua opthalmica 247. ad lumbricos 429
Nutricis electio & ejus diætæ 271. seqq. papillæ earum lateentes & imperforatæ 306. quid in vigiliis Infantum ipsi agendum 341

O.

Observationes rariores IV. 231. seqq.
Obstetrix Gallica 260. earum functiones, *ibid.* seqq.

Oculi

INDEX.

Oculi quomodo à Variolis defendantur 187
 Oculorum dolor in variolantibus unde? 69. pruritus? 70. rubor. 71
 Oleum ad faciem in Variolis ungendam. 221. ad Colicam. 427
 Habacucinum 434.
 Ophthalmia 378. cura. ibid. seq.
 Oris vitia 84. 195. nostra curandi ratio. 196. fœtor. 370
 Oscitatio immoderata in variolantibus unde? 72

P.

PAlpebrarum inflatio. 375. ulceratio ibid.
 Pandiculatio variolantium unde? 71
 Pannus ruber an in Variolis conveniat, variæ authorum sententiæ 142. nostra de iis copio. ibid.
 Papillæ Nutricum latentes & imperforatæ, quomodo emendandæ. 306 earum fissuræ, rimæ, & rhagades. 307. seq.
 Paralysis. 453. cura ibid.
 Paristhmia. 396. seqq.
 Parotis. 393. cura. ibid. seq.
 Parulis. 370. ibid. seqq.
 Pavores Puerorum 342. causæ ibid. curatio 343. seqq.
 Pectoris dolor in Variolantibus unde? 72. oppressio. 400. curatio. 402. seqq. angustia 406
 Pediculi *vid.* Phthiriasis,

Pedum tumor. 230
 Perniones 458. cura 459
 Pervigilium Puerorum 339. causa ibid. curatio ibid. seqq.
 Phrenitis 73. quomodo curetur à Sydenham 186. nostra opinio. ibid.
 Phthiriasis. 38. causa ibid. curatio. ibid. seqq.
 Phthisis Puerorum 325
 Potio præservatoria in Variolis & Morbillis *Grülingii.* 111. 159 sudorifera 192. 243. *Riverii.* ad Variolas pressas 163. potenter expellens 164. grata expellens *Binningeri.* 202. sudorifera. 246 solennis *Dolai.* 421. ad Rachitidem, *Sydenham.* 262
 Potus Infantis 271. seqq. qualis in Variolis conveniat. 171
 Præceptum generale Medico in Variolis observandum 67
 Præcordiorum æstus in variolantibus unde? 72
 Prædictiones morborum acutorum cur incertæ 95
 Providentia Infantis recenter in licem editi. 259. seqq.
 Prunella Infantulorum 338. causa ibid. curatio. ibid. 397. seqq.
 Pruritus ingens in toto corpore à Variolis & Morbillis. 213 curatio juxta *nos.* 214. aliorum ibid.
 Psorophthalmia. 375
 Psyracria. 383. causa 384. curatio 385. seqq.

INDEX.

Ptilosis. [376](#). curatio, *ibid*.
Ptilismus [195](#). *Dolai*, de eodif-
 cursus [198](#). quibus sistatur. [199](#)

Puer *vide*, Infans

Puer trium annorum variolans.
Observatio. II. [233](#)

Puerpera variolans cum im-
 moderato lochiorum fluxu. *Obser-*
vatio. I. [231](#)

Pulmonum affectus. [204](#).

Pulsus est mensura caloris febrilis. [79](#). vehemens quid deno-
 tet? *ibid*. celer & parvus *ibid*.
 debilis [80](#). quali in pulsu liceat
 evacuationem celebrare [81](#). in-
 æqualis & intermittens. *ibid*.

Puliculæ vitia & cura [280](#). seqq.

Pulvis præservatorius *meus* in Va-
 riolis & Morbillis [111](#). *Grülin-*
gii. [112](#). pro adjuvanda matu-
 ratione *Dolai*, pro plebeis *Ti-*
mai. [145](#). panonicus ruber
Augustan. [149](#). correctus. *ibid*.
 Bezoarticus *luavis* & excellens
Chobelii. [150](#). *Sabaudicus*. *ibid*.
Joëlis. [151](#). *Höfferi*. [152](#).
Grembsii. *ibid*. *Ettmülleri* *ibid*.
Juncken. *ibid*. cephalicus *Lu-*
dovici [153](#). *Dalai* *ibid*. *Jun-*
cken. [154](#). *Franchimond*. [202](#)
 adstringens. [209](#). alius. [210](#)
 alius *ibid*. ad faciem in vario-
 lis inspergendam [221](#). ad im-
 moderatum lochiorum fluxum
[232](#). diaphoreticus. [243](#). alte-
 rans & confortans. [244](#). cor-

rigens *Dolai* [283](#). pro corrigendo
 lacte Nutricis. [286](#). in In-
 fantibus [287](#). *Dolai* [304](#). cache-
 cticus *Felic*. *Plateri* [323](#). som-
 niferus *nofter*. [340](#). epilepticus
Sorbait. [349](#). *Dolai*. [352](#). præ-
 servans in epilepsia *Sennert*.
ibid. *Misloskianus Pragensis*.
ibid. de *Gutteta* [353](#). epilept.
 niger. *ibid*. *Marchionis* [356](#).
Maroldi [359](#). ad ranulam sub
 lingua [367](#). in tinea [388](#). ad
 asthma [399](#). stomachalis. [409](#)
Ettmülleri *ibid*. ad singultum
Joëlis. [413](#) *Ettmülleri*. *ibid*.
Dolai *ibid*. confortans & styp-
 ticus [417](#). ad diarrhæam *Sor-*
bait. *ibid*. *Joëlis* [418](#). ad coli-
 cam. [425](#). ad vermes [432](#).
Sennerti. [433](#). ad procidentiam
 Ani. [438](#). ad diabetem *Joëlis*.
[442](#)

Punctionis sensus in variolanti-
 bus unde? [71](#)

Purgatio in Variolis & Morbillis
 à multis Authoribus vitupera-
 tur [127](#). confirmatur ex Hip-
 pocrate [128](#). *levior* in principio
 convenit *ibid*. quare apparen-
 tibus Variolis non liceat pur-
 gare [129](#) in declinatione uti-
 lis. [131](#). tempus ordinarium
ibid.

Purpura [451](#). causæ [452](#). cura-
 tio *ibid*.

Pustulæ parvæ granorum milii
 similes. [86](#)

R.Ra-

R.

R Achitis 461. causa ibid. curatio 462. seqq.
 Ramex. *vid.* Ruptura
 Ranula sub lingua 367. causa ibid. cura. ibid. seqq.
 Ratio cur modo Variolæ nunc Morbilli grassentur 60. 64.
 Raucedo variolantium unde? 72 204.
 Recidiva quoduplex. 133. quando contingere solet. ibid.
 Renum morbi. 206
 Respiratio gravis. 206. ejusdem Interceptio. 405. cura. ibid.
 Rhagadum in papillis curatio. 307. labiorum curatio 369. seqq.
 Rimæ labiorum 369. curatio ibid. seqq.
 Rosaliæ definitio 26. curatio. ibid. periculosum aliquando malum 27. Observatio *Sennerii* ibid.
 Rotulæ præservantes in Variolis & Morbillis 112. hypochondriacæ 407
 Ructus 412. causa ibid. curatio ibid. seqq.
 Ruptura 454. causa ibid. curatio ibid. seqq.

S.

S Acculi vertici capitis imponendi. 199

Sal artificiale in Rachitide D. *Mayhew.* 463
 Salivatio. 195.
Salmuth Philipp. Observatio de Variolarum abcessibus ad articulos. 140
 Scabies pruriginosa 451. causæ 452. cura. ibid.
 Scissuræ labiorum 369. curatio. ibid. seqq.
 Scroti affectus 216. quomodo à Variolis præmuniendum. ibid. seqq.
 Secretum ad vermes. *Alexii Pedemontani* 435
 Singultus 412. causa ibid. curatio ibid. seqq.
 Sitis in variolantibus unde? 72
Sclavata, Comitibus junioris observatio 14
 Specificum cephalicum *Michaelis.* 356
 Spirandi difficultas in variolantibus unde? 71
 Spiritus G. C. *Grülingii* 159. celestis sive sanguinis humani simpl. & comp. 464
 Spiritus effervescens quomodo producat. 40
 Sputum crassum in variolantibus unde? 72
 Sternutatio cur in variolantibus frequens. 71
 Sternutatio. 395. curatio. 396
 Strabismus. 379. curatio. ibid.
 Stranguria. 444. curatio. ibid.
 Sudor cur quandoque non debite succedat. 216. colligativus 231
 P p p 2 Suf-

Suffusio. [378](#) cura. [379](#)
 Suppositoria qualia in Variolis &
 Morbilibus esse debeant. [135](#)
 Sutura nimis hiantes in Infantibus. [317](#). seq.
 Syncope in Variolantibus unde? [75](#)
 Synochus fit in plethora sola. [16](#)
 Syriasis. [373](#). curatio. ibid. seq.
 Syrupus ad Ictherum Riverii. [415](#)

T.

TAbes Puerorum. [325](#). dorsalis. [461](#). causa. ibid. curatio. [462](#). seqq.
 Tenefmus. [436](#). curatio. ibid. seq.
 Tensio frequens in Variolantibus unde? [71](#)
 Terrores Variolantium unde? [71](#)
Thiermayer, Franc. Ignat. ad interrogationem Fœminæ illustris, docta responsio [24](#)
 Timores Variolantium unde? [71](#)
 Tinea. [383](#). causæ. [384](#). curatio. [385](#). seqq.
 Tonsillarum inflammatio. [396](#). seqq.
 Tormina ventris in Variolantibus unde? [77](#)
 Trachoma. [375](#). curatio. ibid. seq.
 Tremor manuum & pedum in Variolantibus unde? [79](#)
 Tumores in acutum vergentes, magis pruriunt, in latum extensis. [22](#)
 Tussis. [204](#). [400](#). curatio. [402](#). seqq.

Tussis sicca variolantium unde?

V.

[72](#)

Variolæ, cujus moris morbus sint. [1](#). quæ salubres. [2](#). à Græcis quomodo vocantur. ib. quare maxima hominum pars iis afficiatur. ibid. quid in illis Ly hæreditarium. [3](#). earum e-tymologia. [5](#). definitio. [7](#). explicatio ejusdem. ibid. seqq. in Græcia & apud Indos Medicorum curam non merentur. [9](#). quare potissimum erumpant in facie. [10](#). subjectum. [11](#). an possint esse sine febre. [12](#). negatur. ibid. quæ sequuntur febrem, salubriores sunt iis, quæ eam antecedunt. [14](#). differentia. [19](#). seqq. circa eas quædam notanda. [21](#). cur sint sanabiles. [26](#). à Petechiis quomodo differant. [28](#). cur tam cito ad statum perveniant. [30](#) subjectum causæ. ibid. causæ variæ ab Authoribus variis. [32](#). omnes omnino homines corripiunt. [33](#). causa communis earum quid. [34](#). quæ & quotuplex. ibid. *Fernelii* opinio [35](#). *refutatur* ibid. hoc non est. [36](#). nec semen. ibid. sed Sanguis menstruus. [37](#) quid fermentum variolarum. [38](#). quomodo in actum deducatur. [39](#). quare quidam citius & benignius, alii tardius & gravius his afficiantur. ibid. cur quidam

quidam sæpius iis corripiantur. 40. causa commovens est spiritus effervescent. *ibid.* modus fiendi, *ibid.* seqq. cur aliqui in tota vita eas non experiantur. 42. si à malignitate aëris producantur, non sunt per fermentationem naturalem, *ibid.* miasma variolarum quomodo se habeat. 44. causa quod nunc Variolæ jam Morbilli grassentur. 45. quando sint contagiosi & epidemii. *ibid.* cur foetus potius quam mater hoc malo corripiatur. 48. seqq. de causa variolarum sententia Helmontii. 53. 64. seqq. Sylvii *ibid.* Michaelis. 54. Cartesii *ibid.* Mercurialis, *ibid.* Kircheri *ib.* Lindani *ibid.* Digbæi, *ibid.* Ettmüllerii & Dolæi. *ibid.* convenientia Veterum & Neotericorum in causis Variolarum, 55. eas esse animatas. 56. cura Authoris anonymi. 57. præservativo. *ibid.* causæ mediata internæ 61. iis uterque sexus afficitur. *ibid.* causæ externæ. 62. quare autumnales sint periculosiores vernalibus. 63. causa quod idem homo his sæpius corripiatur. *ibid.* signa diagnostica 67. seqq. præsentium Variolarum signa. 86. seq. signa differentiarum. 87. causarum *ibid.* locorum *ib.* signa quibus dignoscatur, utrum aliquis nunquam amplius Variolis sit corripiendus. *ibid.*

signa prognostica. 88. seqq. cur in Germania periculosiores. 89. earum tempus quotuplex. 90. quas partes aggrediantur. 91. Variolæ confluentes. 92. seqq. dignotio inter salutare & lethales. 97. seqq. indicationes. 104. seqq. curatio prophylactica. 107. seqq. modi præservationis. 108. seq. curatio practica. 113. seqq. retrocessus quando timendus & quando non. 117. remedia. 134. diata. 167. correctio symptomatum occurrentium 185.

Venæsectio in Variolis & Morbillis an conveciat? 115. Helmontii assertum. 116. ejus præsidium confirmatur. 118. exempla feliciū & infeliciū ejus successuum. *ibid.* impedimenta. 119. signa. 120. Galeni confirmatio. *ibid.* qua ætate possit celebrari. *ibid.* nostra opinio. *ibid.* quo tempore. 121. commendatur à variis Authoribus. 123. seqq.

Ventris inflatio, intumescencia, 459. curatio. *ibid.*

Vermes *vid.* Lumbrici.

Vermiculorum descriptio 57.

Verticatio 451. causa 452. cura *ibid.*

Victus ratio in variolantibus debet esse tenuis 168.

Vigilæ quomodo curentur à *Ti-
mo.* 186. Vigi-

INDEX.

- Vigiliz Puerorum 339, causæ
ibid. curatio ibid. seqq;
- Vino an ut liceat variolatis 77
quo tempore & quali ibid. qui-
bus in casibus ibid. rubrum an
tuto exhiberi possit.
- Vinum Medicatum pro Nutrici-
bus 114
- Umbilici inflammatio & protu-
berantia. 449
- Unguentum ad Narium coalitum
Grüling. 194. ad maculas fa-
ciei à Variolis 219. ad explen-
das foveas *Grüling*. ib. *Montag-
nana* 224. contra Epilepsiam.
in Variolis 329. ectymaticum
248. ad labium leporinum 369
ad pediculos 382. in tinea. 387
Grülingii 390. *Fuhrmanni*. 392
hypochondriacum *Strobelber-
geri* 408. de osmunda *Dolai*.
466. ad Rachitidem 468. ad
ambulendi impotentiam 469
- Vomitiorum in Variolis &
Morbillis disquisitio. 134. non
nisi in principio locum habent
ibid.
- Vomitus 203. 408. causæ ibid.
curatio 409. seqq.
- Vomitus immanis in Variolanti-
bus unde? 76
- Urinarum inspectio in Variolis
maximi momenti 82. quid in
ea præcipue attendendum. ibid.
color rubicundus quid indicet.
ibid. Urina summe tincta &
minime tincta quid portendat.
ibid. alba cum sedimento fur-
furaceo. 83. spissa unde ibid.
unde tenuior. ibid. signa con-
coctionis in Urinis unde defu-
mantur ibid. contenta pauca &
multa unde perveniant ibid.
earum bona prognosis ibid.
quæ malæ 84. incontinentia
441. suppressio 443. stillici-
dium & difficultas 444. ardor.
445
- Uvulæ relaxatio. 173. curatio
ibid. seq.

FINIS.



1.52

Gov. G. P. ... 1971

...

PEBC 19A

1971

